

~~M. J. 26.~~

~~64/26~~

C4.28

R41167

—

ds /





COPIES  
OF THE  
STATUTES

OF THE  
PARLIAMENTS

OF GREAT  
BRITAIN

FROM  
THE FIRST  
SESSION OF THE  
FIRST PARLIAMENT  
OF THE FIRST  
PARLIAMENT

TO THE  
LAST SESSION OF  
THE LAST PARLIAMENT

OF THE  
PARLIAMENTS

OF GREAT  
BRITAIN

C O D E X  
M E D I C A M E N T A R I U S  
E U R O P A E U S.

---

S E C T I O   S E X T A.

---

P H A R M A C O P O E A M  
H I S P A N I C A M  
E T  
L U S I T Á N I C A M  
C O N T I N E N S.

---

T O M U S   I.  
P H A R M A C O P O E A   H I S P A N I C A.

---

L I P S I A E   E T   S O R A V I A E  
A P U D   F R .   F L E I S C H E R .  
1 8 2 2.

C O D E X  
M E D I C A M E N T A R I U S  
S E U  
P H A R M A C O P O E A  
H I S P A N I C A

---



---

L I P S I A E E T S O R A V I A E  
A P U D F R . F L E I S C H E R .  
1 8 2 2 .


GOVERNMENT

OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

1871

REPORT OF THE

COMMISSIONER



PRINTED BY THE

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

FERDINANDO VII  
AUGUSTO PIO FELICI

E CAPTIVITATE VIX REDUCI  
INTER INNUMERAS INGENTESQUE CURAS  
DISPERSA CONGREGANDI AMISSA RECUPERANDI  
CONTRACTA IN UNUM VELUTI CORPUS  
SOLIDANDI BONARUM ARTIUM  
SALUTARIUMQUE DISCIPLINARUM  
MINIME OBLITO  
PHARMACEUTICAE SCIENTIAE  
IMPRIMIS CURAM IMPENDENTI MAXIMAM  
UT HUIUS SPLENDORI  
TRADENDAE AC AMPLIFICANDAE COMMODIS  
CIVIUM SALUTI CONSULAT  
NOVISSIMAM HANC PHARMACOPOEAE  
HISPANIENSIS EDITIONEM A MULTIS JAM  
EXOPTATAM OMNIBUS VERO NON  
CONTEMNENDAS ALLATURAM UTILITATES  
REGIS OPTIMI AC MUNIFICENTISSIMI  
SUMPTIBUS RECUSAM CONSILIUM SUPREMUM  
SALUBERRIMAE HUIC DISCIPLINAE  
PRAEPOSITUM  
IN GRATI ANIMI TESTIMONIUM

D. O. C.

THE HISTORY OF THE  
CITY OF NEW YORK

FROM THE FIRST SETTLEMENT  
TO THE PRESENT TIME

BY  
J. C. COOPER

IN TWO VOLUMES.

VOLUME I.

NEW YORK:  
PUBLISHED BY  
J. C. COOPER,

1852.

---

## PRAEFATIO.

Omnia ut vitentur incommoda, quae maximo forent incolumitati publicae detrimento, nisi una eademque operandi, elaborandique servaretur ratio, quae quidem minimè animadvertitur in rei Pharmaceuticae, cum nostratum, tum etiam exterorum parum accurata methodo; aequis est cautum legibus, huiusce salutaris disciplinae magistros sub regulis fixis, hisque constantibus medicamenta conficere. At cum naturales scientiae suam adipiscantur amplitudinem, ac perfectionem ex ipsis iteratis rerum experimentis, quae in dies majora à viris naturae arcana perscrutantibus fieri videmus, idcirco Hispanam Pharmacopoeam plus minusve corrigi aut emendari, augeri aut minui necesse est, quò magis vel minus effectus percipiantur salutare. Hinc naturae ipsius secreta pervestigantes bene multi, eiusdemque naturae peritissimi, haud parum interesse apud se statuerunt, novos formare tractatus, aut veteres corrigere, eos praesertim, qui de medicamentis agunt, et de quorum emendatione curam adhibuit, ad-



hibetque magistratus quàm diligentissimam, exactam methodum formamque praescribens omnibus rei Pharmaceuticae praeceptoribus, quas sequantur tam ipsi, quam ipsorum auditores, atque ab eis ne transversum, ut ajunt, unguem omnes desciscant. Ea propter Regium Consilium rei ipsius amplissimae gubernationi praepositum ad unguem itidem servari jussit Hispanae Pharmacopoeae editionis tertiae Matritensis praescriptiones, cuius exemplaria cum sint omnia consumpta, maximeque et à praeceptoribus, et à candidatis desiderentur, idem Supremum Consilium iterum recudi, et à nonnullis, qui irreperant, erroribus, quamvis parvi essent momenti purgari, emendarique curavit; cumque ad id obtinendum nihil reliquerit intentatum, nullam fieri in opere commutationem ad eiusdem naturam, seu essentiam pertinentem, est sibi gratulatum.

Nihilominus quatuor haec statuere operae pretium duximus, qui nunc in eodem Consilio Supremo rei praesumus Pharmaceuticae, ut, majore, quàm possit, haec quarta Hispaniensis Pharmacopoeae editio perfectione fruatur.

Primum amplectimur libentèr, usurpamusque sibi invicem cohaerentia artis medi-

cae, vel potius Pharmaceuticae verba cum XIII editione, eaque novissima systematis naturae viri clarissimi Caroli Linnaei, operis sanè in rebus ad naturam spectantibus omnium commendatissimi, utpote amplio rerum triplicis naturae regni, ut loquimur, numerum complectentis.

Deinde capita locare reliqua statuimus, non eodem, quem obtinent, loco in editione postrema, sed juxta eorundem arctiorem nexum, necessitudinem.

Tertio loco quasdam simplicium, quas vocant, praeparationum rationes semel atque iterum appositas suppressere, vel ab opere expungere decrevimus: at nonnullas tamen servavimus rerum species, quae, etsi generatim apud nos in desuetudinem abiire; nihilo minus bene multas adornant confectiones, quae à totidem adhuc praescribuntur professoribus.

Denique tabellas auximus duas alphabetico ordine digestas, unam è vetustis medicamentorum nominibus, alteram ex admissis novissimè à chymicis, in anteacta editione apposis, usitatisque respondentibus; quae quidem servata sunt, cum minimè in noxios possint errores inducere, quos omnes, quoad fieri

licuit, juxta eamdem synopsis emendandos curavimus.

Neque in vöcum chymicarum censum quaedam recentia retulimus nomina, diversis medicamentorum generibus respondentia, novitatem, sive potius confusionem vitare cupientes, quas secum adferunt ipsorum vicissitudo nominum, et varietas. Quae quidem instauratio, aliaeque quamplurimae, ab inventis eisdem, quibus Physice-Chymica sunt, Naturalisque Historia ditatae, pendentes, aptiorem occupabunt locum, cum rei Pharmaceuticae lumina sint magis usquequaque diffusa: quod erit absque dubio nobis sperandum, FERDINANDO VII exoptatissimo imperante, qui postquam eamdem ipsam caeteris facultatibus contendentem summâ et patri, et avi, et parentis, Augustorum Decessorum, beneficentiâ reperisset, non eo contentus, altioribus sub fundamentis, nullique aevo cessuris Pharmaciae doctrinam locare, atque constabilire percupit.

Quae omnia ut optatum sortiantur effectum, Collegia aliqua, sive mavis Academias, Rex de disciplina nostra benemeritissimus (qui beneficia beneficiis accumulando, hanc etiam Pharmacopoeae editionem suo pracclarissimo Nomini inscriptam publici juris fieri

annuit peramanter) erexit, in quibus Historia - Naturalis, Physice - Chymica, Materies - Pharmaceutica, Pharmacia - Experimentalis, quas appellant, quaeque sunt tot copiosa veluti flumina praeclarissimae scientiae campum latè patentem iugiter irrigantia, atque amoenitatem unà cum ubertate coniungentia, ab probitatis notae magistris traduntur. Alumni verò, qui horum studiorum metam attingere, fructusque saluberrimos, aequè ac uberrimos, non delibare modo, sed; ut ita loquamur, vorare, ac aliis vorandos praebere exoptant; praeter literarum latinarum, et Dialectices cognitionem, atquè nonnullam Matheseos notitiam, et prolusiones quasdam, ad eandem pertinentes nostram disciplinam, de quibusque antequam in Collegia cooptentur ista, specimen aliquod erit ipsis exhibendum; Pharmaceuticum tractantes, exercentesque postea negotium per duos continenter annos, ita sibi nomen comparare contendunt, ut Doctoribus suppare esse possint, et in eorum numerum referri. Namque in tota, quam latè patet, Hispana dominatione, neminem Licenciatus, ut dici solet, tituli expertem, salutarem hanc posse exercere, aut profiteri facultatem, providentissimè est decretum.

---



LA REAL JUNTA SUPERIOR GUBERNATIVA  
DE LA FACULTAD DE FARMACIA:

*Por cuanto, en desempeño de las atribuciones que la competen por las leyes, y para cuyo egercicio fué restablecida en virtud del Soberano decreto de once de Setiembre de mil ochocientos catorce con las mismas facultades y prerogativas que tenia antes de la invasion enemiga, ha determinado reimprimir la Farmacopéa Española de la tercera edicion con las correcciones que ha estimado convenientes segun el estado de progresos y adelantamientos que han recibido las Ciencias naturales; y estando prevenido por las leyes del Reyno que los Farmacéuticos se arreglen en la elaboracion de las medicinas á un sistema y orden uniformes, manda que todos los Farmacéuticos, en el preciso término de seis meses contados desde la fecha de este despacho, tengan un eemplar de esta cuarta edicion de la Farmacopéa Española, firmada de su Secretario Don Manuel de Granda y Rivero, y que en la elaboracion de medicinas se arreglen exactamente á ella. Y de parte del REY exorta y encarga á las Justicias de S. M. en todos sus Reynos y Señorios la hagan guardar, cumplir y egecutar segun y como en ella se contiene, por convenir así al Real Servicio y al interes de la salud pública. Dado en Madrid a diez y seis de Diciembre de mil ochocientos diez y siete. = Dr. Don Augustin José Mestre, Boticario mayor de S. M., Presidente. = Dr. Don. Patricio Ortiz. = Dr. Don Matias Velasco. = Dr. Don Gerónimo Lorenzo. = Dr. Don Policarpo Antonio Martinez. = Manuel de Granda y Rivero, Secretario.*

---

# INDEX CAPIT.

CAP. I.....	Materiae Medicae Sylloge.	PAG.	9
II.....	Pondera et Mensurae	.	69
III.....	Praeparationes Simplicior.	.	72
IV.....	Pulveres	.	81
V.....	Succi	.	85
VI.....	Inspissamenta	.	87
VII.....	Emulsiones	.	88
VIII.....	Infusiones	.	89
IX.....	Juscula	.	90
X.....	Decoctiones	.	91
XI.....	Extracta	.	100
XII.. .....	Gelatinae	.	106
XIII.....	Mella	.	107
XIV.....	Syrupi	.	109
XV.....	Conservae	.	117
XVI.....	Electuaria et Confectiones	.	119
XVII.....	Suppositoria	.	128
XVIII.....	Tabellae	.	129
XIX.....	Pilulae	.	130
XX.....	Trochisci	.	134
XXI.....	Olea Expressa	.	138
XXII.....	Olea Cocta	.	140
XXIII.....	Olea Distillata	.	149
XXIV.....	Unguenta	.	153
XXV.....	Emplastra	.	165
XXVI.....	Cataplasmata	.	182
XXVII...	Vina	.	184
XXVIII..	Aceta	.	186
XXIX.....	Alkoholica	.	188
XXX.....	Tincturae	.	195
XXXI....	Aquae	.	203
XXXII...	Mixturae	.	209
XXXIII..	Injectiones	.	211
XXXIV..	Acida	.	214
XXXV...	Alcalia et Terrae	.	219
XXXVI..	Sapones	.	221
XXXVII..	Salia	.	223
XXXVIII	Praeparata ex Zinco	.	232
XXXIX..	Praeparato ex Ferro	.	233
XL.....	Praeparata ex Antimonio	.	236
XLI.....	Praeparata ex Cupro	.	239
XLII.....	Praeparata ex Plumbo	.	240
XLIII...	Praeparata ex Hydrarg.	.	241
XLIV.....	Praeparata ex Argento	.	244

# INDEX

## MEDICAMENTORUM.

A.		Pag.		Pag.
Acetas Ammoniaci Liquidus	-	229	Alkohol Camphorae Sapo-	
— Cupri Crystallisatus	-	239	naceum - - -	192
— Ferri Liquidus	-	234	— Cinnamomi - - -	190
— Potassae - - -	-	229	— Cochleariae - - -	189
— Plumbi Crystallisatus	-	240	— Corticum Aurantiorum	191
— Plumbi Liquidus - -	-	240	— Corticum Citrei - -	191
Acetum Camphorae Antise-			— Helenii Compositum	188
pticum - - -	-	186	— Melissae Compositum	190
— Colchici - - -	-	188	— Muriaticum Aethereum	193
— Cyperi Longi Aromaticum		187	— Nitricum Aethereum	193
— Distillatum - - -	-	217	— Rorismarini - - -	189
— ex Floribus - - -	-	187	— Salviae Vulnerarium	196
— ex Herbis - - -	-	187	— Sulphuricum - - -	192
— ex Summitatibus Herbarum		187	— Sulphuricum Aethereum	192
— Rosarum - - -	-	187	— Vini - - -	191
— Scyllae - - -	-	187	— Vini Camphoratum	192
Acidi Sulphurici Communis			— Vini Commune - -	191
Purificatio - - -	-	215	Amalgama Stanni - -	241
Acidum Aceticum - - -	-	217	Ammoniacum Liquidum	219
— Benzoicum - - -	-	218	Anguim Praeparatio	75
— Boracicum - - -	-	214	Antimonii Crudi Laevigatio	78
— Muriaticum - - -	-	216	Antimonium Purum - -	236
— Muriaticum Oxygenatum			Aqua Acetatis Plumbi	208
ad Contagia - - -	-	217	— Acidi Carbonici - -	205
— Nitricum - - -	-	215	— Acidi Carbonici Cam-	
— Oxalicum - - -	-	217	phorata - - -	205
— Succinicum Crystallisatum		218	— Calcis - - -	208
— Succinicum Liquidum -	-	218	— Carbonatis Potassae Aci-	
— Sulphuricum Aquosum		216	dula - - -	206
Adipis Praeparatio - -	-	72	— Cinnamomi Lacticinosa	204
Aether Aceticus - - -	-	194	— Corticum Aurantiorum	204
— Sulphuricus - - -	-	193	— Cort. Aurantiorum Lacti-	
Aloes Purificatio - - -	-	75	cinosa. - - -	205



	Pag.		Pag.
Aqua Corticum Citrei	- 203	Carbonas Potassae Liquidus	223
— Cort. Citrei Lacticinosa	204	— Potassae Tartari	- 223
— Cupri Ammoniacalis	- 207	— Sodae	- - - 224
— Florum Aurantiorum	- 204	Carbonatis Plumbi Purifi-	
— Florum Sambuci	- - 204	catio	- - - 79
— Muriatico - Mercurialis		Cataplasma Althaeae Emol-	
Rubra	- - - 208	liens	- - - 183
— Rosarum	- - - 204	— Crustae Panis Acetosum	188
— Semin. Anisi Lacticinosa	205	— Farinae Hordei	- 183
— Seminum Foeniculi La-		— Fermenti Panis Theria-	
cticinosa	- - - 205	cale	- - - 185
— Succorum Vegetabilium		— Micae Panis Anodynum	182
Vulneraria	- - 206	— Nidi Hirundinis	- 184
— Sulphatis Aluminae	- 207	— Sinapis Discutiens	- 184
— Sulphatis Ferri [et Ma-		Ceratum Anodynum	- - 166
gnesiae Antimonialis	207	Cinnabaris Nativae Laevi-	
— Sulph. Zinci Aluminosa	208	gatio	- - - 79
Argillae Purificatio	- - 79	Clyster Amyli Anodynus	- 244
Asellorum Praeparatio	- 72	— Corticum Granatorum	- 213
Axungiae Praeparatio	- 72	— Foliorum Malvarum E-	
		molliens	- - - 214
<b>B.</b>		— Vini Antimonialis Irritans	214
Bdellii Purificatio	- - 76	Confectio Hyacinthor. Com-	
Boli Armenicae Purificatio	78	posita	- - - 126
Boratis Sodae Purificatio	- 78	— Margaritarum Kermesina	126
		— Quinae Antiepileptica	127
<b>C.</b>		— Quinae Antimonialis	- 126
Calx Pura	- - - 220	— Quinae Astringens	- 127
Carbonas Ammoniaci Cry-		— Rosarum Rubrarum A-	
stallisatus	- - 224	stringens	- - - 127
— Ammoniaci Cornu Cervi		— Santalorum Cordialis	- 125
Crystallisatus	- - 225	Conserva Capilli Veneris	118
— Ammoniaci Cornu Cervi		— Cochleariae	- - - 118
Liquidus	- - - 225	— Hederae Terrestris	- 188
— Ammoniaci Lumbricorum	225	— Lepidii	- - - 199
— Ammoniaci Viperarum	- 225	— Prunorum	- - - 117
— Ferri	- - - 235	— Rosarum Rubrarum	- 118
— Magnesiae	- - - 226	— Scordii	- - - 119
— Potassae Absinthii	- 224	— Violarum	- - - 188
— Potassae Cardui Benedicti	224	Coralliorum Laevigatio	- 75
— Potassae Centauri Minoris	224	Cornu Cervi Pulveratio	- 72
— Potassae et Ferri Liquidus	234	— Cervi Ustio	- - - 72

	Pag.		Pag.
<b>D.</b>		<b>Electuarium Theriacale Ma-</b>	
Decoctum Carbonatis Po-		gnum - - -	122
tassae Absinthii -	96	Emplastrum Assaefoetidae	
— Chamaedryos Amarum -	93	Matricale - - -	178
— Cornu Cervi cum Mica		— Cantharidum - - -	180
Panis - - -	92	— Carbonatis Plumbi Ustum	166
— Cornu Cervi Gummosum	91	— Cicutae - - -	167
— Cornu Cervi Gummo Te-		— Collae ad Herniam -	174
nuius - - -	92	— Galbani Crocatum -	179
— Fructuum Juniperi Car-		— Galbani Roborans -	181
minativum - - -	98	— Galbani Simplex - -	170
— Graminis Compositum	95	— Meliloti Compositum -	180
— Hordei Compositum -	95	— Meliloti Simplex - -	189
— Jujubarum Pectorale -	96	— Oxydi Plumbi Diabota-	
— Ligni Campechiani -	96	num - - -	173
— Ligni Guajaci Compos.	96	— Oxydi Plumbi Diabotan.	
— Malvarum Carminativum	99	cum Hydrargyro -	174
— Mannae Carminativum -	100	— Oxydi Plumbi Epuloticum	172
— Mannae Laxativum -	99	— Oxydi Plumbi Gummatum	170
— Mannae Purgans - - -	99	— Oxydi Plumbi Mucilagi-	
— Poligatae - - -	96	neum - - -	169
— Quinae Atisepticum -	93	— Oxydi Plumbi Mucilagi-	
— Quinae Atisepticum Pur-		neum Compositum	169
gans - - -	94	— Oxydi Plumbi Rubrum	168
— Radicis Althaeae Emol-		— Oxydi Plumbi Sapon-	
liens - - -	99	ceum - - -	171
— Rhabarbari - - -	100	— Picis Nigrae Regium -	177
— Sarsaeaparrillae Edulcorans	98	— Ranarum cum Hydrargyro	171
— Sarsaeaparrillae ex Callac	97	— Ranarum Simplex - -	170
— Scorzonerae Bezoardicum	94	— Resinarum Glutinans -	178
— Scorzonerae Bezoardicum		— Resinosum Sulphuratum	165
Solutivum - - -	95	— Sibi Anodynum - - -	166
— Verbasci Anodynum -	93	— Siliquarum - - -	175
<b>E.</b>		— Siliquarum Imperiale	176
Eboris Ustio - - -	74	— Spermatis Cei - - -	179
Electuarium Cassiae Tama-		— Syracis Sthomachicum	176
rindarum - - -	120	— Syrac. Sthomach. Pharm.	
— Hyoscyami Opiatum -	124	Matrit. - - -	176
— Scordii Opiatum - - -	120	Emulsio Communis - -	88
— Sennae Compositum -	119	— cum Gummi Arabico -	88
— Theriacale - - -	121	— cum Manna - - -	89

	Pag.
Emulsio Gummi Ammoniaci	89
— Purgans - - -	89
Extractum Absinthii - -	101
— Agarici - - -	105
— Agarici Aloeticum -	105
— Boraginis - - -	101
— Cardui Benedict. -	101
— Centaurii Minoris -	101
— Cichorii - - -	100
— Colocynthis - - -	105
— Corticis Peruviani -	101
— Croci - - -	102
— Fructuum Juniperi -	101
— Glycyrrhizae - - -	102
— Hellebori Nigri - -	105
— Ligni Guajaci - - -	104
— Opii Aquosum - - -	103
— Opii Cinnabarinum -	104
— Opii Crocatum - - -	103
— Opii Glycyrrhizatum -	102
— Radicis Bistortae - -	105
— Radicis Gentianae -	105
— Radicis Helenii - -	105
— Radicis Tormentillae -	105
— Radicis Valerianae -	105
— Ratanhiae - - -	102
— Rhabarbari - - -	102
— Sarsaeparrillae - -	104
— Sennae - - -	102
— Siliquarum - - -	101
— Taraxaci - - -	101

F.

Fellis Praeparatio - -	73
------------------------	----

G.

Galbani Purificatio - -	76
Gargarisma Nasturtii Compositum - - -	213
Gelatina Cornu Cervi -	106
— Fructuum Cydoniorum	107
— Fructuum Fragariae -	107

	Pag.
Gelatina Fructuum Grossulariae - - -	106
— Rubi Idaei - - -	107
Globuli Ferri Tartarisati	234
Gummi Ammoniaci Purificatio	76

H.

Hydrargyri Extractio -	241
— Purificatio - - -	241

I.

Infusum Mali Persici -	90
— Paeoniae - - -	90
— Rosarum Pallidarum -	89
— Rosarum Rubrarum -	90
— Rosarum cum Acido -	90
Injectio Lactis Opiata -	212
— Muriat. Hydrargyri Camphorata - - -	212
— Quinae Antiputridae -	212
— Sulphatis Zinci - -	212
Inspissamentum Aconiti -	87
— Chelidonii - - -	87
— Cichorii - - -	87
— Cicutae - - -	87
— Cucumeris Agrestis -	87
— Glycyrrhizae - - -	87
— Pulsatillae - - -	87
— Taraxaci - - -	87
— Urticarum - - -	87

J.

Jusculum Pulli Gallinacei Lientericum - - -	90
— Viperarum - - -	91

L.

Ladani Purificatio - -	76
Lapidis Calaminaris Laevigatio - - -	79
— Haematites Laevigatio -	79
— Judaici Laevigatio -	75
— Magnetici Laevigatio -	79

M.	Pag.	O.	Pag.
Magnesia Pura - - -	-	Oesypi Purificatio - -	73
Medullae Praeparatio -	72	Oleum Coctum Althaeae -	143
Mel Aceti - - -	108	— Coctum Aparitii - -	140
— Aceti Colchici - -	108	— Coctum Arthanitae Com-	
— Aceti Scyllae - -	108	positum - - -	145
— Depuratum - - -	108	— Coctum Bryoniae Com-	
— Fructuum Mororum -	107	positum - - -	143
— Fructuum Sambuci -	107	— Coctum Capparum -	141
— Rosarum Rubrarum -	107	— Coctum Castorei - -	143
Mixtura Camphorata .	210	— Coctum Chamomillae -	143
— Carbonatis Potassae Ab-		— Coctum Conyzae Com-	
sinthii - - -	209	positum - - -	147
— Carbon. Potass. Absinth.	211	— Coctum Croci - - -	143
— Stomachica . - -	211	— Coctum Cucurbitae Pleu-	
— Gummi Ammoniaci -	210	riticum - - -	141
— Moschata - - -	209	— Coctum Euphorbii -	142
— Opii Astringens Sylvii	209	— Coctum Hyperici - -	142
— Resinae Copaybae D.		— Coctum Inulae Compo-	
Fuller - - -	209	situm - - -	146
— Sulphatis Ferri Gummosa	211	— Coctum Irium - - -	148
Murias Calcis - - -	228	— Coct. Liliorum Alborum	143
— Barytae - - -	229	— Coctum Lumbricorum	142
— Hydrargyri Sublimatus	244	— Coctum Myrti - - -	143
— Hydrargyri Praeparatus	243	— Coct. Oxydi Cupri Viride	148
— Oxygenatus Antimonii	236	— Coctum Rorismarini -	142
— Oxygenatus Hydrargyri		— Coctum Rosarum - -	142
Sublimatus - - -	243	— Coctum Rutae - - -	143
— Potassae - - -	228	— Coctum Sambuci - -	143
— Sodae - - -	229	— Coctum Scorpionum -	148
Muriatis Ammoniaci Purifi-		— Coctum Solani - - -	143
catio - - -	78	— Coctum Stramonii Com-	
— Sodae Exsiccatio - -	79	positum - - -	144
Myrobalanorum Torrefactio	77	— Coctum Thapsiae Anti-	
Myrrha Liquida - - -	223	rheumaticum - - -	145
N.		— Distillatum Absinthii	149
Nitras Argenti Fusus - -	244	— Distill. Anisi - - -	150
— Potassae cum Sulphure		— Distill. Anisi Sulphuratum	153
Fusus - - -	226	— Distill. Caryophyllorum	149
Nitratis Potassae Purificatio	80	— Distill. Cerae - - -	150
Nitrum Stibiatum - - -	239	— Distill. Cinnamomi -	150



	Pag.		Pag.
Oleum Distillatum Cornu		Oleum Expressum Seminis	
Cervi - - -	151	Foeniculi - - -	140
— Distill. Florum Chamomillae - - -	149	— Express. Seminum Can-	
— Distill. Flor. Lavendulae	149	nabis - - -	139
— Distill. Fructuum Juniperi	150	— Express. Seminum Hyo-	
— Distill. Fructuum Lauri	149	scyami - - -	139
— Distill. Galbani Compositum - - -	152	— Express. Seminum Lini	139
— Distill. Herbae Menthae	149	— Express. Seminum Papa-	
— Distill. Limonum - - -	156	veris Albi - - -	139
— Distill. Lumbricorum - - -	151	— Express. Seminum Ricini	139
— Distill. Nucis Moschatae	150	— Express. Seminum Sesa-	
— Distill. Nucum Juglandium Sulphuratum - - -	155	mi Orientalis - - -	139
— Distill. Olivarum Empyreumaticum - - -	152	Omphacium - - -	84
— Distill. Pinguedinis - - -	151	Opoponacis Purificatio - - -	76
— Distill. Saponis - - -	151	Oxydum Antimonii Album	238
— Distill. Seminis Carvi - - -	150	— Antimonii Semivitrificatum - - -	237
— Distill. Seminis Cymini	150	— Antimonii Sulphuratum	
— Distill. Seminis Foeniculi	150	Rubrum - - -	237
— Distill. Succini - - -	151	— Ferri Nigrum - - -	235
— Distill. Succini Sulphuratum - - -	153	— Ferri Rubrum - - -	233
— Distill. Terebinthinae - - -	150	— Hydrargyri Nitratum Rubrum - - -	242
— Distill. Terebinth. Sulphurarum - - -	152	— Hydrargyri Saccharatum	
— Distill. Viperarum - - -	151	— Zinci Sublimatum - - -	232
— Expressum Amygdalarum Amararum - - -	139		
— Express. Amygdalar. Dulcium - - -	138		
— Express. Avellanarum - - -	139		
— Express. ex Vitellis Ovorum - - -	146		
— Express. Fructus Cacao	139		
— Express. Fructuum Lauri	140		
— Express. Nucis Moschatae	139		
— Express. Nucum Juglandium - - -	139		
— Express. Seminis Anisi - - -	140		

P.

Pilulae Aloes Compositae - - -	133
— Aloes Martiales - - -	152
— Cynoglossi Opiatae - - -	130
— Gummi Ammoniaci Balsamicae - - -	133
— Hydrargyri Edimburgenses - - -	131
— Hydrarg. Glycyrrhizatae	131
— Seyllae Ammoniacales - - -	131
— Sulpharis Potassae Aloeticae - - -	132
Potassae Caustica - - -	220
— Pura - - -	220
Pulvis Cachecticus - - -	83
— Cupressi Restrictivus - - -	82

	Pag.		Pag.
Pulvis à Kelis Cancrorum	83	Succus Fructuum Aurantio-	
— Epilepticus	83	rum	85
— Hypecacuanhae Opiatus	81	— Fructuum Citreorum	85
— Imperialis	83	— Fructuum Granatorum	85
— Jalappae Compositus	81	— Fumariae	86
— Lapidis Cordialis de Goa	83	— Grossulariae	85
— Marchionis	83	— Limonum	82
— Paeoniae Compositus	83	— Mororum	85
— Quinae Antisepticus	83	— Pomorum	86
— Sanguinis Draconis Dentifricus	81	— Radicis Bryoniae	86
— Scammonii Antimonialis	82	— Radicis Cucumeris Agrestis	86
— Scammonii Catholicus	82	— Rosarum	86
		— Rubi Idaei	85
		— Violarum	86
<b>R.</b>		Sulphas Aluminae Acetatus	
Rhabbarbari Torrefactio	76	— Cupri Aluminosus Camphoratus	
		— Ferri	
<b>S.</b>		— Potassae	
Saccharum Clarificatum	109	— Zinci	
Sagapeni Purificatio	76	Sulphatis Aluminae Exsiccatio	77
Sapo Ammonialis	222	— Aluminae Purificatio	78
— Potassae	222	— Cupri Purificatio	78
— Potassae Therebinthinaeus	221	— Ferri Exsiccatio	
— Sodae Medicinalis	221	— Magnesiae Exsiccatio	77
Scyllae Exsiccatio	77	— Magnesiae Purificatio	78
Sebi Praeparatio	72	— Sodae Purificatio	78
Seri Lactis Clarificatio	73	— Zinci Purificatio	78
— Lactis Praeparatio	73	Sulphuretum Hydrargyri Nigrum	
Spodii Ustio	74	— Hydrargyri Sublimatum	
Spongiae Praeparatio	74	— Plumbi Factitium	
— Ustio	74	Sulphuris Purificatio	80
Succinas Ammoniaci Liquidus	231	Suppositorium Mellis Commune	128
Succini Laevigatio	75	— Mellis Irritans	128
Succus Agrestae	84	Syrupus Aceti	109
— Cichorii	89	— Althaeae	115
— Cynodiorum Immaturo- rum	86	— Apii Compositus	117
— ex Caulibus et Foliis	85	— Artemisiae	112
— ex Floribus	86		
— ex Fructibus et Radicibus Carnosis	86		

Syrupus Boraginis	-	-	113
— Capilli Veneris	-	-	112
— Carthami Solutivus	-	-	113
— Chinae Compositus	-	-	116
— Cichorii Simplex	-	-	113
— Cichorii cum Rhabarbaro	-	-	113
— Cochleariae	-	-	110
— Corallii Rubri	-	-	113
— Corticum Aurantiorum	-	-	110
— Corticum Citrei	-	-	110
— Corticum Citrei Amarum	-	-	110
— Erysimi Compositus	-	-	111
— Extracti Opii	-	-	114
— Florum Caryophylli Hor-	-	-	111
— Florum Nymphaeae	-	-	111
— Papaveris Rhoeados	-	-	111
— Fumariae	-	-	113
— Granatorum	-	-	109
— Grossulariae	-	-	100
— Hederae Terrestris	-	-	112
— Hyssopi	-	-	112
— Limonum	-	-	110
— Marrubii	-	-	112
— Menthae	-	-	112
— Myrtilli	-	-	110
— Paeoniae	-	-	116
— Papaveris Albi	-	-	114
— Petalorum Violarum	-	-	110
— Plantaginis	-	-	113
— Prassii Albi	-	-	112
— Quinae	-	-	116
— Rosarum Pallidarum	-	-	112
— Rosarum Rubrarum	-	-	112
— Scordii	-	-	112
— Simplex	-	-	109
— Succii Agrestae	-	-	109
— Succii Cydoniorum	-	-	109
— Succii Pomorum Redo-	-	-	109
— lentium	-	-	109

	Pag.
Syrupus Symphyti -	- 116
— Urticarum -	- 113
— Violarum Communis	111

## T.

Tabellae Althaeae Gumma-				
tae	-	-	-	129
— Hypecacuanhae Saccha-				
ratae	-	-	-	130
Tartras Acidulus Potassae				239
— Potassae	-	-	-	230
— Potassae Antimonialis				208
— Potassae et Sodae				231
— Ferruginosus				231
Tela Emplastrica Eculotica				181
— Ichthyocollae Glutinans				181
Terebinthinae Coctio				77
Terrae Lemniae Purificatio				79
Testarum Perlarum Laevi-				
gatio	-	-	-	74
Tinctura Alkoholica Aloes				199
— Alkoholica Aloes Com-				
posita	-	-	-	195
— Alkoholica Assaefoetidae				199
— Alkoholica Benzoini				199
— Alkoholica Cantharidum				200
— Alkoholica Castorei				199
— Alkoholica Corticum Au-				
rantiorum Whit				203
— Alkoholica Hyperici Vul-				
neraria	-	-	-	201
— Alkoholica Kermes				199
— Alkoholica Laccae				197
— Alkoholica Ligni Aloes				199
— Alkoholica Myrrhae				199
— Alkoholica Myrrhae Ute				
rina	-	-	-	292
— Alkoholica Opii				197
— Alkoholica Opii Sapo-				
nacea	-	-	-	198
— Alkoholica Picis Graecae				
Composita	-	-	-	203



	Pag.		Pag.
Tinctura Alkoholica Ouinae		Unguentum Cicutae Deopii-	
Composita - - -	201	lativum - - -	161
— Alkoholica Succini -	199	— Colophoniae Pallidum	158
— Alkohol-Sulphurica Gen-		— Conyzae Aregonis -	162
tianae Composita -	196	— Gemmarum Populi Com-	
— Aquosa Laccae - -	196	positum - - -	163
— Aquosa Rhabbarbari -	198	— Hydrargyri - - -	155
— Corticum Aurantiorum		— Inulae Martiatonis -	161
Composita - - -	198	— Lumbricorum Nervinum	169
— Radicis Pyrethri Odon-		— Malorum Insanorum -	163
talgica - - -	200	— Medullae Mucilagineum	158
— Vinosa Extracti Absin-		— Medullae Vaccinae -	158
thii Composita - -	202	— Muriatis Hydrargyri -	153
— Vinosa Ferri Tartarisata	195	— Muriatis Oxygenati Hy-	
— Vinosa Opii Anticolica	199	drargyri - - -	154
— Vinosa Opii Sydenhami	197	— Myrtinum Compositum	164
Trochisci Agarici - -	136	— Nitratis Hydrargyri -	155
— Calami Aromatici Hedy-		— Oxydi Cupri Melleum	165
croi - - -	137	— Oxydi Plumbi Acetatum	156
— Carbonatis Plumbi Cam-		— Oxydi Plumbi Fuscum	157
phorati - - -	134	— Oxydi Plumbi Rubrum	157
— Ferri Tartarisati - -	137	— Oxygenatum - - -	165
— Fructuum Colocynthidis	136	— Picis Nigrum - - -	158
— Fructuum Cupressi ex Ra-		— Plumbi Nigrum - - -	156
mich - - -	135	— Rosarum - - -	159
— Muriatis Oxygenati Hy-		— Rutae - - -	163
drargyri - - -	134	— Sambuci - - -	159
— Myrrhae Compositi -	135	— Sebi Arcaeii - - -	159
— Scyllitici - - -	137	— Sulphureti Hydrargyri Su-	
— Viperarum - - -	137	blimati - - -	154

## U.

Unguentum Acetatis Plumbi	157
— Althaeae - - -	158
— Arthanitae Compositum	160
— Bryoniae Agrippae -	162
— Cantharidum - - -	164
— Carbonatis Plumbi -	155

## V.

Vinum Absinthii - -	184
— Antimoniale - - -	185
— Fructuum Cupressi Com-	
positum - - -	185
— Oxydi Antimonii -	186
— Viperarum Praeparatio	75

# INDEX NOMINUM ANTIQUORUM.

A.		B.	
	Pag.		Pag.
Acetum Hispalense . . . . .	187	Balsamum Anodynum . . . . .	198
— Plumbi . . . . .	240	— Aparitii . . . . .	140
— Quatuor Latronum . . . . .	186	— Arcaei . . . . .	159
— Rădicalē . . . . .	217	— Catholicum . . . . .	201
— Saturni . . . . .	240	— de Salazar . . . . .	203
Aethiops Martialis . . . . .	235	— Pleuriticum . . . . .	141
— Mineralis . . . . .	242	— Sulphuris Anisatum . . . . .	153
Alcali Volatile Concret. . . . .	224	— Sulphuris Rulandi . . . . .	153
— Volatile Fluidum . . . . .	219	— Sulphur. Succinatum . . . . .	153
Aloes Lotio . . . . .	75	— Sulphur. Therebinth. . . . .	152
Alumen Calcinatum . . . . .	77	— Tranquillans . . . . .	144
— Purificatum . . . . .	78	— Viride . . . . .	148
Amalgama Jovis . . . . .	241	Boracis Purificatio . . . . .	78
Anima Rhabarbari . . . . .	100	Butyrum Antimonii . . . . .	236
Antimonium Diaphoreticum Usuale . . . . .	238	— Rutae . . . . .	163
Aqua Aluminosa . . . . .	207	— Saturni . . . . .	157
— Caelestis . . . . .	207	C.	
— Carmelitana . . . . .	190	Cataplasma ad Singultum . . . . .	183
— Cinnamomi Spirituosa . . . . .	190	— Anodynum . . . . .	182
— Essentialis Corticum . . . . .		— Crustae Panis . . . . .	182
Aurantiorum . . . . .	205	— Emolliens . . . . .	183
— Essent. Cortic. Citrei . . . . .	205	Cataplasma Farinaceum . . . . .	183
— Essentialis Spirituosa . . . . .		Caerussa Praeparata . . . . .	79
Corticum Citrei . . . . .	191	Chaloitis . . . . .	233
— ex Bañares . . . . .	206	Cinnabaris Factitia . . . . .	242
— Lithontriptica . . . . .	206	Clyster Astringens . . . . .	213
— Phagedaenica . . . . .	208	— Emolliens . . . . .	214
— Pontificalis . . . . .	206	Colcothar . . . . .	233
— Reginae Hungariae . . . . .	189	Collyrium ex Fernandez . . . . .	212
— Spirituosum Corticum . . . . .		Confectio Alkermes . . . . .	126
Aurantiorum . . . . .	191	— Hyacynthorum cum . . . . .	
— Styptica . . . . .	208	Acido . . . . .	126
— Vegeto-Mineralis . . . . .	208	Cornu Cervi Calcinatio . . . . .	72
— Vitae Rectificata . . . . .	191	Cremor Tartari . . . . .	230
— Vitae Rectific. Camphorata . . . . .	192	Crocus Martis Aperiens . . . . .	235
— Vulneraria Spirituosa . . . . .	190	Crystalli Veneris . . . . .	239
Arcanum Duplicatum . . . . .	227	D.	
		Decoctum Album . . . . .	91
		— Album Sydenhami . . . . .	92

	Pag.		Pag.
Decoct. Album Tenuius	92	Emplastrum Contra Ru-	
— Amarum . . . .	93	pturam de Pelle .	174
— Antisepticum . .	93	— Diachylum Gummat.	170
— Antiseptic. Purgans	94	— Diachyl. Magnum	160
— Aperiens . . . .	95	— Diachyl. Simplex	160
— Bezoardic. Curvi Com-		— Diapalmae . . .	172
pletum . . . .	95	— Epispasticum . .	180
— Bezoardic. Curvi In-		— Guillermi Servitoris	165
completum . . . .	94	— Matricale . . . .	178
— Bezoar. Curvi Purgans	95	— Resolutivum . .	173
— Carminativo-Emolliens	99	— Saponis Camphorat.	171
— Emolliens . . . .	99	— Vesicatorium . .	180
— Febrifugum Salsum	96	Emulsio Brunneri . .	89
— Lignorum . . . .	97	— Cathartica . . .	88
— Pectorale . . . .	95	— Purgans . . . .	89
Dentifricum Siccum .	81	Essentia Antihisterica	202
Diamorum Commune	107	Extractum Catholicum	105
Diaclysma Odontalgicum	200	— Kinae Kinae . .	102
Diascordium . . . .	120		
E.		F.	
Elaterium . . . . .	87	Flores Benzoini . .	218
Electuarium Astringens		— Sulphuris . . . .	80
Fuller . . . . .	127	— Zinci . . . . .	232
— Catholic. Commune	119	Folus Anodynus . .	93
— Cordiale . . . . .	125	— Carminativus . .	98
— Febrifugum . . . .	125	Fumigatio Acidi Muriati-	
— Lenitivum . . . .	120	ci Oxygenati . . .	217
— Peruvianum Antiepi-		G.	
lepticum Fuller . .	127	Galbanetum . . . .	152
— Peruvianum Astrin-		Gargarisma Antiscorbuti-	
gens Fuller . . . .	127	cum . . . . .	213
Elixir Balsamicum Tem-		Globuli Martiales . .	137
peratum Hoffmanni	202	H.	
— Proprietatis . . .	195	Hepar Antimonii . .	237
— Stomachicum . . .	198	I.	
— Vitrioli Dulcis . .	196	Infusio Florum Persicar.	90
Emplastrum Andreae à		— Rosarum Alexandrin.	90
Cruce . . . . .	178	Injectio Anodyna . .	212
— Anodynum . . . .	166	— Astringens . . .	212
— Benedictum . . . .	166	J.	
— Confortativ. Vigonis	167	Julapium Camphoratum	210
— Contra Rupturam .	178	— Moschatum . . .	210

	Pag.		Pag.
Julapium Sthomachicum	211	Oxymel Colchicum	108
Jusculum Valentinum	211	— Scylliticum . . .	108
K.		— Simplex . . .	108
Kermes Minerale . . .	237	P.	
L.		Pasta Jovis . . .	241
Lac Terrae . . .	226	Philonium Romanum	124
Lapis Causticus . . .	220	Pilulae Balsamicae . .	133
— Divinus . . .	228	— Benedictae ex Fuller	132
— Infernalis . . .	244	— Cochiae . . .	133
— Medicamentosus . .	227	— de Cynoglosso . .	130
— Ophthalmicus . . .	228	— Mercuriales . . .	131
Laudanum Cinnabarinum	104	— Scylliticae . . .	131
— Liquidum . . .	197	— Tartareae Bontii . .	132
— Opiatum . . .	103	Plumbum Ustum . . .	239
— Simplex . . .	197	Potio Angelica . . .	99
— Urinarium . . .	197	— Laxativa . . .	99
Linimentum Saponaceum	192	Ptisana Anticolica . .	100
Liquor Anodyn. Mineralis	192	— ex Callac . . .	97
M.		Pulvis Bezoardicus Curvi	83
Magnesia Calcinata . .	220	— Catholicus . . .	82
Matris Perlarum Praepar.	74	— Cornachinus . . .	82
Mercurius Dulcis . . .	244	— de Cuteta . . .	83
— Mitis . . .	244	— Doveri . . .	81
— Praecipitatus Albus	243	— Restrictivus . . .	82
— Praecipitatus Ruber	242	Pyri Martiales . . .	234
— Sublimat. Corrosivus	244	R.	
Mixtura ad Vomitum San-		Regulus Antimonii . .	236
guinis . . .	209	Rhomel . . .	107
— Antiemetico . . .	209	Rhodosaccharum . . .	112
— Balsamica . . .	209	Rob Mororum . . .	107
N.		— Sambuci . . .	107
Nitrum Purificatum . .	88	S.	
— Stibiatum . . .	239	Saccharum Saturni. . .	140
O.		— Vermifugum . . .	241
Oleum Coctum Agrippae	143	Sal Absinthii . . .	224
— Coctum Aregonis . .	147	— Cardui Benedicti . .	224
— Coctum del Fraile . .	145	— Centaurii Minoris . .	224
— Coctum Martiatonis	146	— Digestivum . . .	228
— Distillatum Laterum	152	— Febrifugum Sylvii . .	228
— Myrrhae per deliquium	223	— Maximum . . .	228
— Tartari per deliquium	223	— Martis . . .	233
— Vitrioli . . .	215	— Polychrestus . . .	227



	Pag.		Pag.
Sal Prunella . . . . .	226	Syrupus Cichorii cum du-	
— Saturni . . . . .	240	plicato Rhabbarbaro	113
— Sedativus Homberg	214	— Comititis . . . . .	113
— Sodae . . . . .	224	— Corticum Citrei Es-	
— Tartari . . . . .	223	sentialis . . . . .	110
— Volatilis Ammoniaci	224	— de Erysimi Lobelii	111
— Volatilis Cornu Cervi	225	— de quinque Radicibus	117
— Volat. Lumbricorum	225	— Diacodionis . . . . .	114
— Volatilis Succini . . .	218	— Florum Tunicae . . .	111
— Viperarum . . . . .	225	— Meconii . . . . .	114
Salis Ammon. Purificatio	68	— Scelotyrbicus . . . . .	110
— Cathartici Calcinatio	77	— Violarum Simplex U-	
— Carthartici Purificatio	78	sualis . . . . .	111
— Commun. Decrepitatio	79	T.	
— Glauberi Purificatio	78	Tartarus Chalybeatus So-	
Sapo Tartareus Starkei	221	lubilis . . . . .	23
— Venetus . . . . .	221	— Emeticus . . . . .	238
Scutum pro Umbilico	181	— Solubilis . . . . .	230
Sinapismus ad plantas		— Solubilis de Seignete	231
pedum . . . . .	184	— Vitriolatus . . . . .	227
Sparadrapus Pallidus	181	Terra Foliata Tartari	229
Spiritus Carminativus	188	Theriaca Magna . . . .	122
— Cochleariae . . . . .	189	Tinctura Alexipharmaca	
— Cervi . . . . .	225	Huxham . . . . .	201
— Cornu Cervi Succinat.	231	— Anticolica ex Palacios	199
— Mindereri . . . . .	220	— Aquosa Rosarum Ru-	
— Nitri Acidus . . . . .	215	brarum . . . . .	90
— Nitri Dulcis . . . . .	193	— Elastica . . . . .	234
— Salis Ammoniaci . . .	219	— Gummi Laccae Spirit.	197
— Salis Communis . . . .	216	— Martis Apertiva Tart.	195
— Marini . . . . .	216	— Odontalgica . . . . .	100
— Succini . . . . .	218	— Paregorica . . . . .	197
— Vini Rectificatissimus	191	— Roborans Whit . . . .	203
— Vitrioli Acidus . . . .	216	Trochisci Albi ex Rhasis	134
— Vitrioli Dulcis . . . .	192	— Alhandal . . . . .	136
Sulphuretum Mercurii		— Escharotici . . . . .	134
Praeparatum . . . . .	79	— Hedycroi . . . . .	137
Syrupus Acetosus Sim-		— Ramich . . . . .	135
plex . . . . .	109	— Viperini . . . . .	137
— Antirheumaticus . . .	116	U.	
— Aureus Solutivus	112	Unguentum ad Herpetes	153
— Caeruleus . . . . .	110	— ad Scabiem ex Alderete	154

	Pag.		Pag.
Unguentum Aegyptiac.	165	Unguentum Martiaton,	161
— Agrippae . . . .	162	— Mercurii . . . .	153
— Album ex Rhasis	155	— Nervinum . . . .	160
— Aregon . . . .	162	— Nutritum . . . .	156
— Basilicum . . . .	158	— Plumbi . . . .	156
— Basilicum Nigrum	158	— Populeum . . . .	173
— Cinnabarinum . .	154	V.	
— Citrinum . . . .	155	Vinum Emeticum . .	185
— Comitissae . . . .	164	— Emeticum Turbidum.	186
— de la Mere . . . .	157	— Stypticum . . . .	185
— de Minio . . . .	157	Vitrioli Albi Purificatio	78
— Deopilativum . .	161	— Caerulei Purificatio .	78
— Epispasticum . . .	164	— Martis-Calcinatio .	283
— Filii Zachariae . .	158	Vitriolum Album . .	232
— Lithargyri . . . .	156	— Liquidum Martis .	234
— Magistrale . . . .	157	— Martis . . . .	233

INDEX NOMINA A CHIMICIS RECENS  
ADOPTATA COMPLECTENS,  
*in hoc opere usurpatis respondentia.*

	Pag.		Pag.
Acidum boricum.		Acidum Boracicum . .	214
Acidum hydrochloricum.		Acidum Muriaticum . .	216
Aqua deuto-ammoniatas Cupri.		Aqua Cupri Ammoniacalis .	207
Chlorum.		Acidum Muriaticum Oxygen.	
Chloruretum Antimonii.		ad contagia . . . .	217
Chloruretum Calcii.		Murias Oxygenatus Antimonii	230
Chloruretum Sodii.		Murias Calcis . . . .	228
Deuto-acetas Cupri.		Murias Sodae Exsiccatus .	79
Deuto-acetas Potassii.		Acetas Cupri Crystallisatus	239
Deuto-antimonias Potassii, seu		Acetas Potassae . . . .	229
Per-oxydum Antimonii.		Oxydum Antimonii Album	238
Deuto-chloruretum Hydrargyri.		Murias Oxygenatus Hydrar-	
Deuto-hydras Potassii.		gyri Sublimatus . . . .	244
Deuto-hydro-chloras Potassii.		Potassa Pura seu Caustica	220
Deuto-hydro-chloras Sodii.		Murias Potassae . . . .	228
Deuto-nitras Argenti fusus.		Murias Sodae . . . .	66
Deuto-nitras Potassii.		Nitras Argenti Fusus . .	244
Deuto-nitras Potassii fusus.		Nitras Potassae . . . .	65
Deuto-oxydum Hydrargyri.		Nitras Potassae cum Sulphu-	
Deuto oxydum Plumbi.		re Fusus . . . .	226
Deuto-oxydum Zinci.		Oxydum Hydrargyri Nitratum	
		Rubrum . . . .	242
		Oxydum Plumbi Rubrum .	65
		Oxydum Zinci Sublimatum	232

	Pag.
Deuto-sulphas Potassii.	Sulphas Potassae . . . . 227
Deuto-sulphas Sodii.	Sulphas Sodae . . . . 66 78
Deuto-sulphas Zinci.	Sulphas Zinci . . . . 67 232
Deuto-tartras Potassii.	Tartras Potassae . . . . 230
Deuto-tartras Potassii et Antimonii.	Tartras Potassae Antimonialis . . . . 248
Deuto-tartras Potassii et Ferri.	Tartras Potassae Ferruginosus 231
Deuto-tartras Potassii et Sodii.	Tartras Potassae et Sodae . 231
Hydro-chloras Ammoniaci.	Murias Ammoniaci . . 66 78
Per-carburetum Ferri.	Plumbago, Graphites . . 66
Per-oxydum Antimonii seu Deuto-antimonias Potassii.	Oxydum Antimonii Album 248
Per oxydum Magnesii.	Manganesium. . . . . 65
Per-sulphuretum Hydrargyri.	Sulphuretum Hydrargyri Sublimatum . . . . 234
Proto-acetas Ferri liquidus.	Acetas Ferri Liquidus . . 234
Proto-acetas Plumbi.	Acetas Plumbi Crystallisatus et Liquidus . . . . 240
Proto-carbonas Calcii.	Carbonas Calcis . . . 65 65
Proto-carbonas Plumbi.	Carbonas Plumbi . . . 63 76
Proto-chloruretum Hydrargyri praecipitatum.	Murias Hydrargyri Praecipitatus . . . . 243
Proto-chloruretum Hydrargyri sublimatum.	Murias Hydrargyri Sublimatus . . . . 243
Proto-oxydum Arsenici.	Oxydum Arsenici . . . . 62
Proto-oxydum Calcii.	Calx Pura . . . . . 220
Proto-oxydum Ferri.	Oxydum Ferri Nigrum . . 235
Proto-oxydum Magnesii.	Magnesia Pura . . . . . 220
Proto-oxydum Plumbi fusum.	Oxydum Plumbi Semivitrificatum . . . . . 65
Proto sulphas Calcii.	Gypsum, Sulphas Calcis . 74
Proto-sulphas Ferri.	Sulphas Ferri . . . . . 233
Proto-sulphas Magnesii.	Sulphas Magnesiae . . 66 77
Sub-carbonas Ammoniaci.	Carbonas Ammoniaci Crystallisatus . . . . . 225
Sub-deuto-acetas Cupri.	Oxydum Cupri Acetatatum . 68
Sub-deuto-boras Sodii.	Boras Sodae . . . . , 63 78
Sub-deuto-carbonas Potassii.	Carbonas Potassae . . 223 224
Sub-deuto-carbonas Sodii.	Carbonas Sodae . . . . . 224
Sub-deuto-hydro-sulphas Antimonii.	Oxydum Antimonii Sulpurat. Rubrum . . . . . 237
Sub-deuto-sulphas Ferri.	Oxydum Ferri Rubrum . . 233
Sub-deuto-sulphuretum Antimonii.	Oxydum Antimonii Semivitrificatum . . . . . 237
Sub-proto-carbonas Ferri.	Carbonas Ferri . . . . . 235
Sub-proto-carbonas Magnesii.	Carbonas Magnesiae . . . 226
Sulphuretum Hydrargyri.	Sulphuretum Hydrargyri Nigrum . . . . . 24
Super-deuto-sulphas Cupri.	Sulphas Cupri . . . . . 68 78
Super-deuto-tartras Potassii.	Tartras Acidulus Potassae . 230
Super-proto-sulphas Aluminii et deuto-oxydi Potassii.	Sulphas Aluminiae . . 61 78



# CAPUT I.

## MATERIAE MEDICAE SYLLOGE

### IN TRES SECTIONES

SECUNDUM TRIA REGNA NATURAE DIGESTAE.

## SECTIO I.

### ZOOLOGIA.

#### A

ALBUM GRAECUM. *Stercus exsiccatum (ex ossium nutritione)*

Canis Familiaris LINN. *Hispanic.* CANINA.

AMBRA GRISEA. *Substantia concreta sui generis inventa, ut ajunt, in stomacho et intestinis.*

Physeteris Macrocephali LINN. . . . . Indic. . . . . AMBAR GRIS.

ANGUILLA. . . . . Pellis, Axungia, et Viscera.

Muraena Anguilla LINN. *Hispanic.* ANGUILLA.

ANGUIS. *Animal vivum pelle expoliatum, Axungia, Exuviae.*

Coluber Natrix LINN. *Hispanic.* . . . CULEBRA.

ANSER. . . . . Axungia.

Anas Anser LINN. *Hispanic.* . . . GANSO.

ARANEAE. . . . . Integrae et recentes, Tela.

Aranea Domestica LINN. *Hispanic.* . . . ARAÑAS.

A

ARIES. *Pellis, Pedes, Lana, OEsypus, Sebum, Omentum ex Animali vivo recenter detractum.*

Ovis Aries LINN. *Hispanic.* . . . . CARNERO.

ASELLVS. Vide MILLEPEDES.

AXUNGIA SUILLA. . . . . *ex*

Sue Scrofa, Variet. Domestico LINN. *Hispanie,* . . . . MANTECA DE PUERCO.

## B

BEZOAR OCCIDENTALE. }

BEZOAR OCCID. Alter. } Vide LAPIS.

BEZOAR ORIENTALE. }

BEZOARDICUM ANIMALE. *Cor et Hepar Viperæ.*

BUFONES. . . . *Integri, exsiccati et recentes.*

Rana Bufo LINN. *Hispanic.* . . . . SAPOS.

BUTYRUM MAJAL. seu VACCIN. *Pinguedo lactis Faeminae.*

Bovis Tauri LINN. *Hispanic.* MANTECA DE VACA.

## C

CANCRI. . . . *Integri, Calculi.*

Cancer Astacus LINN. *Hispanic.* CANGREJOS.

CANTHARIDES. . . . *Integrae et pulveratæ.*

Lytta Vesicatoria LINN. . . . *Hispanic. Italic,* . . . . CANTARIDAS.

CASTOREUM. *Folliculi prope genitalia et anum adnati.*

Castoris Fibri LINN. *Russic.* . . . CASTOREOS.

CATELLI. . . . *Animalia recens nata*

Canis Familiaris LINN. *Hispanic.* CACHORROS.

**CERA ALBA.** *Cera citrina sole, aëre et aquâ dealbata.* . . . . . **CERA BLANCA.**

**CERA CITRINA.** *Substantia concreta sui generis elaborata ab*

*Api Mellifica* LINN. *Hispanic.* **CERA AMARILLA.**

**CERVUS.** *Cornua, Sebum, Ossa Cordis.*

*Cervus Elaphus* LINN. *Hispanic.* . . . **CIERVO.**

**COCCINELLA.** . . . . *Insecta integra.*

*Coccus Cacti* LINN. *Americ.* . . . **COCHINILLA.**

**COCHLEAE COMMUNES.** *Testae, Vermes pistati recentes.*

*Helix Pomatia* LINN. . . . *Hispanic. vulgare.* . . . . **CARACOLAS COMUNES.**

**COLLA.** . . . *Substantia gelatinosa exsiccata è pelle*

*Bovis Tauri* LINN. *Hispanic.* . . . . **COLA.**

**COLLA PISCIS.** *Vid. ICHTHYOCOLLA.*

**COLUBER.** *Vide ANGUIS.*

**CORALLINA.** . . . . *Zoophytum.*

*Corallina Officinalis* LINN. *è Mari Mediterræneo.* . . . . **CORALINA.**

**CORALLIUM ALBUM.** . . . . *Stirps*

*Madreporae Oculatae* LINN. *è Mari Adriatico.* . . . . **CORAL BLANCO.**

**CORALLIUM RUBRUM.** . . . . *Stirps*

*Gorgoniae Nobilis* LINN. *è Mari Mediterræneo.* . . . . **CORAL RUBRO**

**CRANIUM HUMANUM.** . . . . *Ossa inhumata partis superioris capitis hominis.* . . . . **CRANEO HUMANO.**

## D

DENTES APRI. . . . . *Dentes laniarii*  
 Suis Scrofae, Variet. Feri LINN. . . . . *His-*  
*panic.* . . . . . JABALÍ.

## E

EBUR. . . . . *Dentes laniarii*  
 Elephantis Maximi LINN. *Asiatic.* . . . . MARFIL.  
 ERINACEUS, sive ECHINUS. *Integer, Caro,*  
*Axungia.*  
 Erinaceus Europaeus LINN. *Hispanic.* ERIZO.

## F

FORMICAE. . . . . *Integrae.*  
 Formica Rufa LINN. *Hispanic.* . . . . FORMIGAS.

## G

GALLAE. Vide PHYTOLOGIA.  
 GALLINA. *Axungia, Pulli, Ova, eorumque*  
*Testae.*  
 Phasianus Gallus LINN. *Hispanic.* . . . . GALLINA.

## H

HIRUNDO. . . . . *Sanguis recens, Nidus.*  
 Hirundo Rustica LINN. *Hispanic.* GOLONDRINA.

## I

ICHTHYOCOLLA. *Gluten vesicae aëreae*  
*ex speciebus.*  
 Acipenseris LINN. . . . . *Asiatic. Eu-*  
*rop.* . . . . . COLA DE PESCADO.

## K

KELAE CANCRORUM. . . . . *Apices pedum ex*

Cancro Paguro LINN. . . . . *In Ocean. Europ.*  
 . . . . . UÑAS DE CANGREJOS  
 KERMES. Vide PHYTOLOGIA.

## L

LAC ASINAE. . . . . *ex Faemina*

Equi Asini LINN. *Hispanic.* LECHE DE BURRA.

LAC CAPRINUM . . . . . *ex Faemina*

Caprae AEGagri, Variet. Hirci LINN. *Hispanic.*  
 . . . . . LECHE DE CABRA.

LACERTUS. *Integer, ejusque excrementum.*

Lacerta Agilis LINN. *Hispanic.* . . . LAGARTO.

LAPIS BEZOAR OCCIDENTALIS. . . . *Calculus, ex*

Antilope Gazella LINN. . . . . *Americ.*  
 . . . . . PIEDRA BEZOAR OCCIDENTAL.

LAPIS BEZOAR OCCIDENT. *Alter. Calculus, ex*

Antilope Oryge LINN. . . . . *Americ.*  
 . . . . . PIEDRA BEZOAR OCCIDENTAL.

LAPIS BEZOAR ORIENTALIS. *Calculus, ex*

Antilope Gazella, et Cervicapra LINN. *Asiatic.*  
 . . . . . PIEDRA BEZOAR ORIENTAL.

LAPIS PORCINUS. *Calculus fells vesicae, ex*

Hystrice Cristata LINN. . . . . *Asiatic. Europ.*  
 . . . . . PIEDRA PORCINA.

LUMBRICI. . . . . *Integri et recentes.*

Lumbricus Terrestris LINN. . . . . *Hispanic.*  
 . . . . . LOMBRICES.

LUPUS. . . . . *Intestina condita.*

Canis Lupus LINN. *Hispanic.* . . . . LOBO.



## M

## MANDIBULAE PISCIS LUCII.

Exossis Lucii LINN. . . . . *Europ.* . . . . MANDIBULAS DEL PEZ LUCIO.

## MARGARITAE. Vide UNIONES.

MATER PERLARUM. . . . . *Testae*

Mytili Margaritiferi LINN. . . . . *Asiatic. Americ.* . . . . MADRE DE PERLAS, NACAR.

MEL, *Substantia Saccharina aromatica ex nectariis florum collecta, et elaborata ab*

Apibus Mellificis LINN. *Hispanic.* . . . MIEL.

MELOE PROSCARABAEUS LINN. *Integri et recentes. Hispanic,* CARRALEJAS, ABADEJOS.

MILLEPEDES. . . . . *Integri.*

Oniscus Asellus LINN. *Hispanic.* . . . MILPIES.

MOSCHUS, *Substantia fragrans, concreta, unctuosa folliculi excretorii, ex*

Moscho Moschifero LINN. . . . . *Indic. Oriental,* . . . . . ALMIZCLE.

MUMIA, *Substantia fragrans, dura et nigra ab humanis cadaveribus aromatibus conditis proveniens.* . . . . MUMIA,

MURES. . . . . *Integri,*

Mus Musculus LINN. *Hispanic* . . . RATONES,

## O

OCULI CANCRORUM, *Calculi in stomachi Cancrorum lateribus contenti.* Vide CAN-  
CRI. . . . . OJOS DE CANGREJOS.

OESYPUS, *Substantia oleaginoso-extractiva, lanae ovinae lotionem extracta; et inspissata.*

- Vide ARIES. . . . HISOPO HUMEDO.  
 OSSA è CORDE CERVI. . . . *Arteriarum  
 in basi cordis concursus, qui cum aetate in-  
 durescit ossis instar, ex*  
 Cervo Elapho LINN. . . . *Hispanic. vul-  
 gare.* . . . HUESOS DEL CORAZON DE CIERVO.  
 OSSA SEPIAE . . . . . *ex*  
 Sepia Officinali LINN. . . . *Hispa-  
 nic.* . . . . HUESOS DE NIBIA.  
 OSTREAE. . . . . *Testae.*  
 Ostrea Edulis LINN. *Hispanic.* . . . . OSTRAS  
 OVUM . . . . . *Notissimum.*  
 Vide GALLINA. . . . . HUEVO.

## P

- PAVO. . . . . *Excrementum.*  
 Pavo Cristatus LINN. . . . . *Hispa-  
 nic.* . . . . PAVO REAL, PAVON.  
 PAVO GALLUS. *Axungia, Ovum, ejus Te-  
 sta, Excrementum.*  
 Meleagris Gallo pavo LINN. . . . *Hispa-  
 nic.* . . . . PAVO DOMESTICO.  
 PERLAE. Vide UNIONES.  
 PULLUS GALLINACEUS. . . . Vide GALLI-  
 NA. . . . . POLLO.

## R

- RANAE. *Viventes, Exenteratae, capite prae-  
 ciso, pelleque expoliatae.*  
 Rana Temporaria LINN. *Hispanic.* . . . . RANAS.  
 RHINOCEROS. Vide UNICORNU.

## S

- SANGUIS HIRCI. . . . . *ex*  
 Capra AEgagro, Variet. Hirco LINN. *Hispa-*  
*nic.* . . . . SANGRE DE MACHO.  
 SANGUISUGAE. . . . . *Viventes.*  
 Hirudo Medicinalis LINN. . . . SANGUIJUELAS.  
 SCORPIONES. . . . . *Viventes.*  
 Scorpio Europaeus LINN? . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . ALACRANES.  
 SEBUM. Vide ARIES.  
 SEBUM HIRCINUM. . . . . *ex*  
 Capra AEgagro, Variet. Hirco LINN. *Hispa-*  
*nic.* . . . . SEBO DE MACHO.  
 SEPIA. Vide OSSA SEPIAE.  
 SERICUM. . . . . *Folliculum Crysalidis, ex*  
 Phalaena Mori LINN. . . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . CAPULLO DE SEDA.  
 SPERMA CETI. *Substantia concreta sui ge-*  
*neris contenta in cerebello.*  
 Physeteris Macrocephali LINN. . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . ESPERMA DE BALLENA.  
 SPONGIA. . . . . *Stirps*  
 Spongiae Officinalis LINN. . . . *è Mar. Medi-*  
*terran.* . . . . ESPONJA.  
 STRUTHIO. *Testa, seu crusta testacea ovor.*  
 Struthio Camelus LINN. . . . . *Asiatic.*  
*Afric.* . . . . AVESTRUZ.

## T

- TAXUS. . . . . *Axungia.*  
 Ursus Meles LINN. *Hispanic.* . . . . TEXON.

TESTUDO. . . . . Caro.  
 Testudo Orbicularis LINN. . . . . Hispan-  
 nic. . . . . GALAPAGO.

## U

UNGULA ALCIS. . . . . ex  
 Cervo Alce LINN. . . . . Ame-  
 ric. . . . . UÑA DE LA GRAN BESTIA.

UNICORNU MARINUM. . . . . Cornu.  
 Monodon Monoceros LINN. . . . . è Mar. Septen-  
 trion. . . . . UNICORNIO MARINO.

UNICORNU. . . . . Cornu, ex  
 Rhinocerotè Unicorni LINN. . . . . Asiatic.  
 Afric. . . . . CUERNO DE RINOCERONTE.

UNIONES. . . . . Notissimae, ex  
 Mytilo Margaritifero LINN. . . . . Asiatic. Ame-  
 ric. . . . . PERLAS.

URSUS. . . . . Axungia.  
 Ursus Arctos LINN. Hispanic. . . . . OSO.

## V

VIPERA. *Exenterata, capite et cauda absci-  
 sis, pelleque expoliata et recens, Bezoardi-  
 cum animale, et Axungia.*

Coluber Berus LINN. Hispanic. . . . . VIBORA.

VULPES. *Integra, pelle nudata et exenterata.*  
 Canis Vulpes LINN. Hispanic. . . . . ZORRO.

## Z

ZIBETHUM. *Substantia unctuosa, fragrans,  
 pinguis, contenta in folliculis.*

Viverrae Zibethae LINN. . . . . Asia-  
 tic. Mexic. . . . . ZIBETO.

## MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

## S E C T I O II.

## P H Y T O L O G I A.

## A

- ABROTANUM. . . . *Herba, Summitates.*  
 Artemisia Abrotanum LINN. . . *Suffruticosa,*  
     *Hispanic.* . . . . . ABROTANO.  
 ABSINTHIUM. *Herba, Summitates floridæ.*  
 Artemisia Absinthium LINN. *Hispanic. per-*  
     *ennis.* . . . . . AIENJOS.  
 ACACIA AEGYPTIACA. . *Succus inspissatus*  
     *leguminum, ex*  
 Mimosa Nilotica LINN. . *AEgyptiac. Arbo-*  
     *rea.* . . . . . ACACIA DE EGIPTO.  
 ACACIA NOSTRAS. . *Succus inspissatus, ex*  
     *Fructu (Drupa) immaturo.*  
 Pruni Spinosa LINN. . . . *Hispanic. Arbo-*  
     *rea,* . . . . . ACACIA DEL PAIS.  
 ACANTHUS. . . . . *Folia.*  
 Acanthus Mollis LINN. . . . *Hispanic. per-*  
     *ennis.* . . . . ACANTO, BRANCA-URSINA.  
 ACETOSA. . . . *Radix, Folia recentia.*  
 Rumex Acetosa LINN. . . . *Hispanic. peren-*  
     *nis.* . . . . . ACEDERA.  
 ACETOSELLA. . . . . *Herba recens.*  
 Oxalis Acetosella LINN. . . *Hispanic. per-*  
     *ennis.* . . . . ACEDERILLA, ALELUYA.



ACETUM.	Notissimum.
.	VINAGRE.
ACONITUM.	Herba recens.
Aconitum Napellus LINN.	Hispanic. perennis.
.	ACONITO.
ACORUS VERUS.	Vide CALAMUS
AROMATICUS.	
ADIANTUM,	Vide CAPILLUS VENERIS,
AGALLOCHUM.	Vide LIGNUM ALOES.
AGARICUS ALBUS.	Fungus.
Boletus Purgans LINN.	Gallic. perennis.
.	AGARICO BLANCO.
AGAVE.	Radix.
Agave Americana LINN.	Americ. perennis.
.	AGAVE, MAGUEL, Ó PITA.
AGNUS CASTUS.	Semina.
Vitex Agnus Castus LINN.	Hispanic. fruticosa.
.	AGNO CASTO.
AGRIMONIA.	Herba.
Agrimonia Eupatoria LINN.	Hispanic. perennis.
.	AGRIMONIA.
ALCHIMILLA.	Folia.
Alchemilla Vulgaris LINN.	Hispanic. perennis.
.	ALQUIMILA,
ALKEKENGİ.	Fructus (Bacca).
Physalis Alkekengi LINN.	Hispanic. hortensis, perennis.
.	ALKEKENGES,
ALLIARIA.	Herba recens.
Erysimum Alliaria LINN.	Hispanic. biennis.
.	ALIARIA,

- ALLIUM.** . . . . *Bulbi, Semina.*  
**Allium Sativum LINN.** *Hispanic. hortensis, per-*  
*ennis.* . . . . **AJO.**  
**ALOE SUCCOTRINA.** . . *Succus inspissatus,*  
*purus, splendens, laevis, ex*  
**Aloë Perfoliata LINN.** . . . *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . **ACIBAR SUCOTRINO.**  
**ALOYSIA.** . . . . *Folia.*  
**Verbena Triphylla LINN.** *Hispanic. hortensis,*  
*fruticosa.* . . . . **YERBA LUISA.**  
**ALTHAEA.** . . . . *Radix, Semina.*  
**Althaea Officinalis LINN.** . *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . **ALTEA, MALVAVISCO.**  
**AMARACUS.** Vide **MAJORANA.**  
**AMMI.** . . . . *Semina.*  
**Sison Ammi LINN.** . . . . *Europ. an-*  
*nua.* . . . . **AMEOS, ò AMI.**  
**AMOMUM RACEMOSUM.** . . . *Semina.*  
**Amomum Grana Paradysi LINN.** *Asiatic. per-*  
*ennis.* . . . . **AMQMO RACEMOSO.**  
**AMYGDALAE DULCES.** . . . *Semina.*  
**Amygdali Communis LINN.** . *Hispanic. Ar-*  
*borea.* . . . . **ALMENDRAS DULCES.**  
**AMYGDALAE AMARAE.** . . . *Semina.*  
**Variet. Amygdali Communis LINN.** . . .  
. . . . **ALMENDRAS AMARGAS.**  
**AMYLUM.** . . . . *Faecula ex Seminibus.*  
**Tritici Hybernici LINN.** . . . **ALMIDON.**  
**ANACARDIUM.** . . . . *Fructus (Nux).*  
**Semecarpus Anacardium LINN.** *Asiatic. Ar-*  
*borea.* . . . . **ANACARDO.**

- ANAGALLIS AQUATICA. . . *Herba recens.*  
 Veronica Anagallis LINN. . . *Hispanic. perennis.* . . . . ANAGALLIS AQUATICA.  
 ANETHUM. . . . . *Summitates, Semina.*  
 Anethum Graveolens LINN. . . *Hispanic. annua.* . . . . ENELDO.  
 ANGELICA OFFICINALIS. . . . *Radix, Semina.*  
 Angelica Archangelica LINN. . *Hispanic. biennis.* . . . . ANGELICA.  
 ANGURIA. Vide CITRULLUS.  
 ANIME. Vide RESINA.  
 ANISUM, . . . . . *Semina.*  
 Pimpinella Anisum LINN. . *Hispanic. sativa, annua.* . . . . ANIS.  
 ANISUM STELLATUM. . . . . *Semina.*  
 Illicium Anisatum LINN. . . *Asiatic. fruticosa.* . . . . ANIS ESTRELLADO.  
 APIUM. . . . . *Cortex Radicis, Herba recens, Semina.*  
 Apium Graveolens LINN. . . . *Hispanic. biennis.* . . . . APIO SILVESTRE.  
 AQUILEGIA. . . . . *Herba, Semina.*  
 Aquilegia Vulgaris LINN. . . *Hispanic. perennis.* . . . . AQUILEGIA.  
 ARISARUM. . . . . *Radix.*  
 Arum Arisarum LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . . ARISARO,  
 ARISTOLOCHIA LONGA. . . . . *Radix.*  
 Aristolochia Longa LINN. . . *Hispanic. perennis.* . . . . ARISTOLOQUIA LARGA.

- ARISTOLOCHIA ROTUNDA. . . . *Radix.*  
 Aristolochia Rotunda LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . ARISTOLOQUIA REDONDA.
- ARISTOLOCHIA TENUIS. . . . *Radix.*  
 Aristolochia Pistolochia LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . ARISTOLOQUIA TENUE.
- ARNICA MONTANA. *Radix, Herba, Flores.*  
 Arnica Montana LINN. . . *Hispanic. perennis.* . . . . ARNICA MONTANA.
- ARTEMISIA. . . . . *Herba.*  
 Artemisia Vulgaris LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . ARTEMISA.
- ARTHANITA. . . . . *Radix.*  
 Cyclamen Europaeum LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . ARTANITA, PAN DE PUERCO.
- ARUM. . . . . *Radix recens.*  
 Arum Maculatum LINN. . . *Hispanic. perennis.* . . . . ARO.
- ARUNDO. . . . . *Radix.*  
 Arundo Donax LINN. . . *Hispanic. perennis.* . . . . CAÑA.
- ASARVM. . . . . *Radix.*  
 Asarum Europaeum LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . ASARO.
- ASPARAGUS. . . . . *Radix, Semina.*  
 Asparagus Officinalis LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . ESPARRAGUERA.
- ASPLENIUM. Vide CETERACH.
- ASSAFOETIDA. Vide GUMMI.
- AVRANTIUM. *Folia, Flores, Fructus (Bacca), Corticis Flavædo.*

Citrus Aurantium LINN. . . . . *Arborea, Hispanica.* . . . . NARANJO.

AURICULA MURIS. Vide PILOSELLA.

AVELLANAE. . . . . *Fructus (Nux), ex*

Corylo Avellana LINN. . . . . *Hispanic, Arbor.* . . . . AVELLANAS.

AVENA. . . . . *Semina.*

Avena Sativa LINN. . . . . *Hispanic. annua.* . . . . AVENA.

B

BALAUSTIA. . . . . *Flores, ex*

Punica Granato LINN. . . . . *Hispanic. Arbor.* . . . . BALAUSTRIAS.

BALSAMUM COPAYBAE. . . . . *Resina liquida, ex*

Copayfera Officinali LINN. . . . . *Arborea, Americ.* . . . . BALSAMO DE COPAYVA.

BALSAMUM MARIAE. . . . . *Resina.*

An ex Caloqhylo Inophyllo, vel Calaba LINN?

*Indic. Arbor.* BALSAMO, Ó ACEYTE DE MARIA.

BALSAMUM NIGRUM. . . . . *Resina liquida cum acido benzoico combinata, per coctionem elicit a ligno ramisque.*

Myroxyli Peruiferi LINN. Myrospermi Balsamiferi JUSS. et FLOR. PERUV. *Arborea Americ.* . . . . BALSAMO NEGRO.

BALSAMUM TOLUTANUM, sive ALBUM.

*Resina cum acido benzoico combinata, ex*

Myroxylo Peruifero LINN. Myrospermo Balsamifero JUSS. et FLOR. PERUV. *Americ. Arborea.* . . . . BALSAMO DE TOLÚ, Ó BLANCO.



BARDANA.	.	.	.	.	<i>Cortex radices.</i>
Arctium Lappa LINN.	.	.	.	.	<i>Hispanic. per-</i>
<i>ennis.</i>	.	.	.	.	BARDANA.
BASILICUM.	.	.	.	.	<i>Herba, Summitates.</i>
Ocimum Basilicum LINN.	.	.	.	.	<i>Hispanic. hortens-</i>
<i>sis, annua.</i>	.	.	.	.	ALBAHACA.
BDELLIUM. Vide GUMMI.					
BECCABUNGA.	.	.	.	.	<i>Herba recens.</i>
Veronica Beccabunga LINN.	.	.	.	.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	.	.	.	.	BECCABUNGA.
BELLADONNA.	.	.	.	.	<i>Radix, Folia.</i>
Atropa Belladonna LINN.	.	.	.	.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	.	.	.	.	BELLADONNA.
BELLIS.	.	.	.	.	<i>Herba florida.</i>
Bellis Perennis LINN.	.	.	.	.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	.	.	.	.	BELIS, MARGARITA, Ó MAYA.
BENZOINUM. Resina solida cum acido ben-					
<i>zoico combinata, ex</i>					
Styrace Benzoin LINN.	.	.	.	.	<i>Arborea, Indic.</i>
<i>Oriental.</i>	.	.	.	.	BENJUI.
BERBERIS.	.	.	.	.	<i>Fructus (Bacca).</i>
Berberis Vulgaris LINN.	.	.	.	.	<i>Hispanic. hortensis,</i>
<i>fruticosa.</i>	.	.	.	.	BERBEROS.
BETA.	.	.	.	.	<i>Folia recentia.</i>
Beta Vulgaris LINN.	.	.	.	.	<i>Hispanic. hortensis, an-</i>
<i>nua.</i>	.	.	.	.	ACELGA.
BETONICA.	.	.	.	.	<i>Herba.</i>
Betonica Officinalis LINN.	.	.	.	.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	.	.	.	.	BETONICA.
BETULA.	.	.	.	.	<i>Cortex ligni, Folia tenerrima.</i>
Betula Alba LINN.	.	.	.	.	<i>Hispanic. Arbor. ABEDUL.</i>

- BISTORTA.** . . . . . *Radix.*  
 Polygonum Bistorta LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . . **BISTORTA.**  
**BORAGO.** . . . . . *Herba, Flores.*  
 Borago Officinalis LINN. . . . . *Hispanic. biennis.* . . . . . **BORRAJA.**  
**BOTRYS.** . . . . . *Summitates cum Seminibus.*  
 Chenopodium Botrys LINN. . . . . *Hispanic. annua.* . . . . . **BOTRYS, BIENGRANADA.**  
**BRANCA-URSINA.** Vide ACANTHUS.  
**BRYONIA.** . . . . . *Radix.*  
 Bryonia Alba LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* . . . . . **BRYONIA, Ó NUEZA.**  
**BUGLOSSA.** . . . . . *Herba, Flores.*  
 Anchusa Officinalis LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* . . . . . **BUGLOSA, Ó LENGUA DE BUEY.**  
**BUGULA.** . . . . . *Herba.*  
 Ajuga Reptans LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* . . . . . **BUGULA.**  
**BUNIAS.** Vide NAPUS.  
**BURSA PASTORIS.** *Herba cum Seminibus.*  
 Thlaspi Bursa Pastoris LINN. *Hispanic. annua.* . . . . . **TLASPI, BOLSA DE PASTOR.**  
**BUTUA.** . . . . . *Radix.*  
 Cissampelos Pareira LINN. *Amer. perenn.* **BUTUA.**  
**BUXUS.** *Lignum in assulas, seu scobem redact.*  
 Buxus Sempervirens LINN. *Hispanic. fruticosa.* . . . . . **BOX.**

C

- CACAO.** . . . . . *Semina.*  
 Theobroma Cacao LINN. . . . . *Arbor. Ame-*  
 Codex medic. Europ. Sect. VI. p. I. **B**

<i>ric.</i>	CACAO.
CALAGUALA.	<i>Radix.</i>
Polypodium Phillitidis LINN.	<i>Americ. perennis.</i>
	CALAGUALA.
CALAMINTHA.	<i>Herba florida.</i>
Melissa Calamintha LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>
	CALAMINTA.
CALAMUS AROMATICUS.	<i>Radix.</i>
Acorus Calamus LINN.	<i>Indic. Hispanic. perennis.</i>
	CALAMO AROMATICO.
CALENDULA.	<i>Flores.</i>
Calendula Officinalis LINN.	<i>Hispanic. annua.</i>
	CALENDULA.
CAMPECHE.	<i>Lignum in scobem redactum.</i>
Haematoxylum Campechianum LINN.	<i>Arbor. Americ.</i>
	CAMPECHE.
CAMPHORA.	<i>Substantia concreta sui generis, ex</i>
Lauro Camphora LINN.	<i>Arborea, Asia-tic.</i>
	ALCANFOR.
CANCHALAGUA.	<i>Herba florida.</i>
Gentiana Cachanlahuan LINN.	<i>Americ. annua.</i>
	CANCHALAGUA.
CANELLA ALBA.	<i>Cortex.</i>
Canella Alba LINN.	<i>Arborea; Americ.</i>
	CANELA BLANCA.
CANNABIS.	<i>Semina.</i>
Cannabis Sativa LINN.	<i>Hispanic. CAÑAMO.</i>
CAPILLUS VENERIS.	<i>Frons.</i>
Adiantum Capillus Veneris LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>
	CULANTRILLO DE POZO.

CAPPARIS. . . *Cortex radicis, flores non-  
dum explicati.*

Capparis Spinosa LINN. *Hispanic hortensis,  
suffruticosa.* . . . . . ALCAPARRO.

CARANNA. Vide RESINA.

CARDAMOMUM MAJUS. ; . . *Semina.*

Amomum Grana Paradysi LINN. *Asiatic. per-  
ennis.* . . . . . CARDAMOMO MAYOR.

CARDAMOMUM MINUS. . . . *Semina.*

Amomum Cardamomum LINN. *Asiatic. per-  
ennis.* . . . . . CARDAMOMO MENOR.

CARDUUS BENEDICTUS. *Herba florida.*

Centaurea Benedicta LINN. *Hispanic. an-  
nua.* . . . . . CARDO SANTO.

CARICA PINGUIS. Vide FICUS.

CARIES LIGNI SILIQUAE. . . . *ex*

Ceratonia Siliqua LINN. . . *Hispanic. Ar-  
borea.* . . . . . CARCOMA DE ALGARROBO.

CARLINA. . . . . *Radix.*

Carlina Acaulis LINN. *Hispanic. peren.* CARLINA.

CARPOBALSAMUM. . . *Fructus. (Bacca).*

Amyris Opobalsamum LINN. *Arabic. fru-  
ticosa.* . . . . . CARPOBALSAMO.

CARTHAMUS. . . . *Flores, Semina.*

Carthamus Tinctorius LINN. . *Hispanic. sa-  
tiva.* . . . . . CARTAMO, AZAFRAN ROMI, Ó ALAZOR.

CARVI. . . . . *Semina.*

Carum Carvi LINN. *Hisp. bienn.* ALCARAVEA.

CARYOPHYLLATA. . . *Herba, Radix.*

Geum Urbanum LINN. . . *Hispanic. per-  
ennis.* . . . . . CARIOFILATA.

CARYOPHYLLI AROMATICI. *Flores nondum explicati.*

Caryophyllus Aromaticus LINN. *Asiatic. Arborea.* . . . . CLAVOS DE ESPECIA.

CARYOPHYLLI HORTENSES. *Petala exungulata.*

Dianthus Caryophyllus LINN. *Hispanic. hortensis, perennis.* . . . . CLAVELLINAS.

CASSIA FISTULA. *Fructus (Legumen).*

Cassia Fistula LINN. . . . *Arborea, Americ.* . . . . CAÑA FISTULA.

CASSIA LIGNEA. . . . . Cortex.

Laurus Cassia LINN. . . . *Asiatic. Arborea.* CASIALIGNEA, Ó CANELA MALABARICA.

CASTANEA. *Semina, ejusdem cortices.*

Fagus Castanea LINN. *Arbor. Hisp.* CASTAÑAS.

CATECHU. . . . *Succus inspissatus, ex*

Mimosa Catechu LINN. *Arbor. Indic.* CATECU.

CEBADILLA. . . . *Fructus (Capsula).*

Veratrum Sabadilla LINN. *Americ. perennis.* . . . . CEBADILLA.

CENTAURIUM MINUS. *Herba florida.*

Gentiana Centaurium LINN. *Hispanic. annua.* . . . . CENTAURA MENOR.

CENTUMNODIUM. . . . *Herba florida.*

Polygonum Aviculare LINN. *Hispanic. annua.* . . . . SANGUINARIA MAYOR.

CEPA. . . . . *Bulbi, Semina.*

Allium Ceba LINN. *Hispanic. hortensis, perennis.* . . . . CEBOLLA.

CERASA. . . . . *Fructus (Drupa).*



Prunus Cerasus LINN.	<i>Arborea, Hispanica.</i>	CEREZAS.
CEREFOLIUM.	<i>Herba recens.</i>	
Scandix Cerefolium LINN.	<i>Hispanic. hortensis, annua.</i>	PERIFOLLO
CETERACH.	<i>Frons.</i>	
Asplenium Ceterach LINN.	<i>Hispanic. annua.</i>	DORADILLA.
CHACARILLA.	<i>Cortex.</i>	
Croton Cascarilla LINN.	<i>Arborea, Americ.</i>	CHACARILA, Ó QUINA AROMATICA.
CHAMAEDRYIS.	<i>Summitates floridæ.</i>	
Teucrium Chamaedrys LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>	CAMEDRIOS.
CHAMAEPITYS.	<i>Summitates seminibus onustæ.</i>	
Teucrium Chamaepitys LINN.	<i>Hispanic perennis.</i>	CAMEPITEOS, Ó PINILLO OLOROSO.
CHAMOMILLA.	<i>Herba, Flores.</i>	
Cotula Aurea LINN.	<i>Hispanic. annua.</i>	MANZANILLA FINA.
CHAMOMILLA OFFICINALIS.	<i>Flores.</i>	
Anthemis Nobilis LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>	MANZANILLA ROMANA.
CHELIDONIUM.	<i>Herba recens.</i>	
Chelidonium Majus LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>	GELIDONIA MAYOR.
CHENOPODIUM.	<i>Herba.</i>	
Chenopodium Bonus Enricus LINN.	<i>Hispanic. annua.</i>	CHENOPODIO, Ó ZEÑIGLO OFICIAL.
CHINA.	<i>Radix.</i>	

- Smilax China** LINN. . . . . *Asiatic. perennis.* . . . . CHINA.  
**CICERA.** . . . . *Semina.*  
**Cicer Arietinum** LINN. *Hispanic. sativa, annua.* . . . . GARBANZOS.  
**CICHORIUM.** . . . . *Herba, Cortex radicis.*  
**Cichorium Intybus** LINN. . . . *Hispanic. annua.* . . . . ACHICORIAS.  
**CICUTA.** *Herba recens, Succus non defaecatus.*  
**Conium Maculatum** LINN. . . . *Hispanic. biennis.* . . . . CICUTA.  
**CINERES CLAVELLATI.** . . . *Faeces vini in cineres redactae.* . . . CENIZAS CLAVELADAS.  
**CINNAMOMUM.** *Cortex surculorum epidermide spoliatus.*  
**Laurus Cinnamomum** LINN. *Arborea, Ceylanic.* . . . . CANELA DE HOLANDA, Ó DE CEYLAN.  
**CINNAMOMUM ACUTUM, seu MANILENSE.**  
**Laurus Cinnamomum Variet.** LINN. . . . . CANELA DE MANILA.  
**CITREUM.** . . . . *Fructus (Baccae)*  
*Cortex, Succus, et Semina.*  
**Citrus Medica** LINN. *Arbor. Hispanic. CIDRA.*  
**CITRULLUS.** . . . . *Fructus (Pomi) Semina.*  
**Cucurbita Citrullus** LINN. . . . *Hispanic. sativa.* . . . . SANDIA.  
**COCHLEARIA.** . . . . *Herba recens.*  
**Cochlearia Officinalis** LINN. *Hispanic. hortensis, annua.* . . . . COCLEARIA.  
**COFFEA.** . . . . *Semina.*  
**Coffea Occidentalis** LINN. . . . *Americ. frutico-*

- sa.* . . . . . CAFE.  
**COLCHICUM.** . . . . *Bulbi recentes.*  
 Colchicum Autumnale LINN. *Hispanic, perennis.* . . . . COLCHICU.  
**COLOCYNTHIS.** . . . . *Fructus (Pomum).*  
 Cucumis Colocynthis LINN. . *Hispanic, annua.* . . . . COLOQUINTIDA.  
**COLOPHONIA.** Vide PIX GRAECA.  
**COLUBRINUM** (Lign.) *Lignum scobinatum.*  
 Strychnos Colubrina LINN. . *Arborea, Indic.* . . . . LEÑO COLUBRINO.  
**CONSOLIDA MAJOR.** Vide SYMPHYTUM MAJUS.  
**CONTRAYERBA.** . . . . *Radix.*  
 Dorstenia Contragenea LINN. . . *Mexic, perennis.* . . . . CONTRAYERBA.  
**CONYZA MAJOR.** . . . . *Herba.*  
 Erygeron Viscosum LINN. . . *Hispanic, perennis.* . . . . CONYZA MAYOR, ú OLIVARDA.  
**COPAL.** Vide RESINA.  
**CORIANDRUM.** . . . . *Semina.*  
 Coriandrum Sativum LINN. *Hispanic, sativa, annua.* . . . . CILANTRO.  
**CORTEX PERUVIANUS.** Vide QUINA.  
**CORTEX WINTERANEUS.** *Surculor, cort.*  
 Wintera Aromatica LINN. . . *Americ, Arborea.* . . . . CORTEZA WINTERANA.  
**COSTUS ARABICUS.** . . . . *Radix.*  
 Costus Arabicus LINN. . . . *Indic, perennis.* . . . . COSTO ARABIGO.  
**COSTUS HORTENSIS.** *Folia, Summitates.*

Tanacetum Balsamita LINN. *Hispanic. bien-*  
*nis.* . . . . HOJAS DE SANTA MARIA.

CROCUS. . . . . *Stigmata.*

Crocus Sativus LINN. *Hispan. perenn.* AZAFRAN.

CUBEBAE. . . . . *Fructus.* (Bacca)

Piper Cubeba LINN. *Arbor. Asiatic.* CUBEBAS.

CUCUMIS AGRESTIS, vel SILVESTRIS.

*Radix recens, Fructus (Pomum).*

Momordica Elaterium LINN. *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . COHOMBRILO AMARGO.

CUCURBITA. *Semen, Cortex Fructus* (Pomi).

Cucurbita Pepo LINN. . . . . *Hispanic. sati-*  
*va.* . . . . CALABAZA.

CUCURBITA LONGA. *Cortex Fruct.* (Pomi).

Cucurbita Lagenaria LINN. *Hispanic. sati-*  
*va.* . . . . CALABAZA LARGA.

CULEN. . . . . *Folia.*

Psoralea Glandulosa Linn. *Hispanic. suffruti-*  
*cosa.* . . . . CULEN.

CUMINUM. . . . . *Semina.*

Cuminum Cyminum LINN. *Hispanic. sativa,*  
*annua.* . . . . COMINO.

CUPRESSUS. . . . . *Fructus* (Strobilus).

Cupressus Sempervirens. LINN. *Arbor. Hispan-*  
*nic.* . . . . CIPRES.

CURCUMA. . . . . *Radix.*

Curcuma Longa LINN. *Indic. perenn.* CURCUMA.

CYANUS. . . . . *Semina, Radix.*

Centaurea Cyanus LINN. *Hisp. annua.* CYANO.

CYDONIUM. *Fructus* (Pomum), *Semina.*

Pyrus Cydonia LINN. . . . . *Hispanic. Ar-*

- borea.* . . . . MEMBRILLO.  
 CYMINUM. Vide CUMINUM.  
 CYNARA OFFICINARUM. *Flores papposi.*  
 Cynara Cardunculus LINN. *Hispanic. hortensis, perennis.* FLOR DE CARDO DE COMER.  
 CYNOGLOSSUM. *Cortex radidis, Herba recens.*  
 Cynoglossum Officinale LINN. *Hispanic. annua.* . . . . CINOGLOSA.  
 CYNOSBATUS. *Fructus.* (Calix baccatus) *sine seminibus.*  
 Rosa Canina LINN. . . . *Hispanic. fruticosa.* . . . . CINOSBATUS, Ó ESCARAMUJO.  
 CYPERUS LONGUS. . . . *Radix.*  
 Cyperus Longus LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . . JUNCIA OLOROSA.

D

- DACTYLI. . . . *Fructus (Drupa).*  
 Phoenix Dactylifera LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . DATILES.  
 DAPHNE GNIDIUM LINN. *Radicis et Caulis Cortex, Folia, Fructus (Bacca).* *Hispanic. fruticosa.* . . . . TORVISCO.  
 DAUCUS CRETICUS. . . . *Semina.*  
 Atamantha Cretensis LINN. *Hispanic. biennis.* . . . . DAUCO CRETICO.  
 DENS LEONIS. Vide TARAXACUM.  
 DICTAMNUS ALBUS. *Cortex radidis.*  
 Dictamnus Albus LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . . DICTAMO BLANCO.  
 DICTAMNUS CRETICUS. . . . *Folia.*



Origanum Dictamnus LINN. *Europ. perennis.* . . . . DICTAMO CRETICO.

DORONICUM. . . . . *Radix, Semina.*

Doronicum Pardalianches LINN. *Hispanic. biennis.* . . . . . DORONICO.

DRACUNCULUS. . . . . *Herba virens.*

Artemisia Dracunculus LINN. *Hispanic. hortensis, perennis.* . . . . DRAGONCILLO, ESTRAGON.

DULCAMARA. . . . *Herba recens, Caules.*

Solanum Dulcamara LINN. *Hispanic. fruticosa.* . . . . . DULCAMARA.

## E

EBULUS. . . . *Cortex radices, Folia recentia, Fructus (Bacca).*

Sambucus Ebulus LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . . . YEZGO.

ELATERIUM. *Succus inspissatus ex fructibus (Pomis)*

Momordicae Elaterii LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . . ELATERIO.

ELEMI. Vide RESINA.

ENDIVIA. . . . . *Herba, Semina.*

Cichorium Endivia LINN. *Hispanic. hortensis, annua.* . . . . . ESCAROLA.

EPITHYMUM. . . . . *Herba.*

Cuscuta Europea Variet Epithymum LINN.

*Hispanic. parasitica, annua.* . . . . EPITYMO.

EQUISETUM. . . . . *Herba.*

Equisetum Arvense LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . . COLA DE CABALLO.

ERUCA. . . . . *Semina.*

Brassica Eruca LINN.	. . .	Hispanic. annua.	. . . . .	BERZA ORUGA.
ERYNGIUM.	. . . . .	Cortex radicis.		
Eryngium Campestre LINN.		Hispanic. perennis.	. . . . .	ERINGIO, Ó CARDO CORREDOR.
ERYSIMUM.	. . .	Herba recens, et florida.		
Erysimum Officinale LINN.		Hispanic. annua.	. . . . .	ERYSIMO.
ESULA.	. . . . .	Radix.		
Euphorbia Palustris LINN.		Hispanic. perennis.	. . . . .	Radix
EUPATORIUM.	. . . . .	Herba.		
Eupatorium Cannabinum LINN.		Hispanic. perennis.	. . . . .	EUPATORIO.
EUPHORBIVM.	Vide GUMMI			
EUPHRASIA.	. . . . .	Herba.		
Euphrasia Officinalis LINN.		Hispanic. annua.	. . . . .	EUPHRASIA.

F

FABA.	. . . . .	Flores, Semina.		
Vicia Faba LINN.		Hispanic. sativa.	. .	HABAS.
FABAE S. IGNATII.	. . . . .	Semina.		
Ignatia Amara LINN.	Strychnos Ignatii	BERG.		
	Asiatic. fruticosa.	HABAS DE S. IGNACIO.		
FARFARA.	Vide TUSSILAGO.			
FERMENTUM.	. . . . .	Notissimum.		
	. . . . .	LEVADURA.		
FICUS.	Fructus (Receptaculum cum seminibus).			
Ficus Carica LINN.		Hispanic. Arborea.	HIGO.	
FILIPENDULA.	. . . . .	Radix.		

- Spiraea Filipendula LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . . FILIPENDULA.  
 FILIX. . . . . Radix.  
 Polypodium Filix Mas LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . . HELECHO.  
 FOENICULUM. *Cortex radicis, Semina, Summitates, Gummi-resina.*  
 Anethum Foeniculum LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . . HINOJO.  
 FOENUMGRAECUM. . . . . Semina.  
 Trigonella Foenumgraecum LINN. *Hispanic. sativa.* . . . . . ALHOLVA.  
 FOLIUM INDICUM. Vide MALABATRUM.  
 FRAGARIA. *Herba, Radix, Fruct. (Bacca).*  
 Fragaria Vesca LINN. *Hispanic. hortensis, perennis.* . . . . . FRESA.  
 FRAXINELLA. Vide DICTAMN. ALBUS.  
 FRAXINUS. . . . . *Cortex ligni, Semina.*  
 Fraxinus Excelsior LINN. . *Hispanic. Arbo-rea.* . . . . . FRESNO.  
 FULIGO. *Substantia nigra, sublimata ex combustione lignorum.* . . . . . HOLLIN.  
 FUMARIA. . . . . Herba.  
 Fumaria Officinalis LINN. . . . *Hispanic. annua.* . . . . . FUMARIA, HIEL DE TIERRA.  
 FUNGUS MELITENSIS. . . . *Planta parasita,*  
 Cynomorium Coccineum LINN. . . *Italic. His-panic.* . . . . . HONGO DE MALTA.

## G

- GALANGA. . . . . Radix.  
 Maranta Galanga LINN. *Asiatic. Americ. per-*

- ennis.* . . . . . GALANGA.  
 GALBANUM. Vide GUMMI.  
 GALIUM. . . . . *Herba florida.*  
 Galium Verum LINN. . . . . *Hispanic. an-*  
*nua.* . . . . GALIO, ó CUAJALECHE.  
 GALLAE. *Excrescentiae compactae includen-*  
*tes erucam Cyniphis.*  
 Quercus Cerris LINN. . . . . *Arborea, Tur-*  
*cic.* . . . . AGALLAS DE LEVANTE.  
 GAYUBA. Vide UVA URSI.  
 GENISTA. *Radix, Semina, Flores, Cortex ligni.*  
 Genista Tinctoria LINN. . . . . *Hispanic. fruti-*  
*cosa,* . . . . . RETAMA MACHO.  
 GENISTELA. *Herba, Summitates floridae.*  
 Genista Sagittalis LINN. . . . . *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . . CARQUESIA.  
 GENTIANA. . . . . *Radix.*  
 Gentiana Lutea LINN. . . . . *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . . GENCIANA.  
 GLANDES. . . . . *Semina.*  
 Vide QUERCUS. . . . . BELLOTAS.  
 GLYCYRRHIZA. . . . . *Radix.*  
 Glycyrrhiza Glabra LINN. . . . . *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . . REGALIZ, ú OROZUZ.  
 GRAMEN. . . . . *Radix.*  
 Panicum Dactylon LINN. . . . . *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . . GRAMA.  
 GRANA KERMES. *Gallae, seu excrescentiae*  
*intra se continentes insectum quod eas suo*  
*punctu produxit super folia, et ramos.*  
 Quercûs Cocciferae LINN. . . . . *Arborea, Hispa-*

<i>nic.</i>	GRANA DE KERMES.
GRANATA ACIDA.	<i>Fructus (Baccæ) Cor-</i>
<i>tices, et Succus, ex</i>	
Punica Granato LINN.	<i>Hispanic. Arbo-</i>
<i>rea.</i>	GRANADAS AGRIAS.
GRATIOLA.	<i>Herba.</i>
Gratiola Officinalis LINN.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	GRACIOLA.
GROSSULARIA.	<i>Fructus (Bacca).</i>
Ribes Grossularia LINN.	<i>Hispanic. fruti-</i>
<i>cosa.</i>	GROSELLERO.
GUAJACUM.	<i>Lignum, ejus Cortex, Resina.</i>
Guajacum Officinale LINN.	<i>Arborea, Ame-</i>
<i>ric.</i>	GUAYACO, Ó PALO SANTO.
GUMMI AMMONIACUM.	<i>Lacryma gummi-</i>
<i>resinosa.</i>	
An ex Ferula Persica LINN?	<i>Asiatic.</i>
<i>Afric. perennis.</i>	GOMA AMONIACO.
GUMMI ARABICUM.	<i>Lacryma gummosa,</i>
<i>friabilis, et splendens, ex</i>	
Mimosa Nilotica LINN.	<i>Ægyptiac. Arbo-</i>
<i>rea.</i>	GOMA ARABICA.
GUMMI ASSAFOETIDA.	<i>Lacryma gummi-</i>
<i>resinosa, ex</i>	
Ferula Assafoetida LINN.	<i>Persic. peren-</i>
<i>nis.</i>	ASAFETIDA.
GUMMI BDELLIUM.	<i>Lacryma gummi-re-</i>
<i>sinosa.</i>	
An ex Amyridis specie LINN?	<i>Asiatic.</i>
	BEDELIO.
GUMMI COMMUNE.	<i>Lacryma gummo-</i>



*sa, ex*

Speciebus Pruni, et Amygdali LINN. *Hispanic. Arborea.* . . . . GOMA DEL PAIS.

GUMMI ELEMI. Vide RESINA.

GUMMI EUPHORBIIUM. *Lacryma gummi-resinosa, ex*

Euphorbia Officinali LINN. *Afric. perennis.* . . . . EUPORBIO.

GUMMI FOENICULI. *Lacryma gummi-resinosa, ex*

Anetho Foeniculo LINN. . . . GOMA DE HINOJO.

GUMMI GALBANUM. *Lacryma gummi-resinosa, ex*

Bubone Galbano LINN. *Afric. perennis.* . . . . GALBANO.

GUMMI GUTTA. *Succus concretus gummi-resinosus, ex*

Cambogia Gutta LINN. *Indic. perennis.* . . . . GUTA GAMBIA.

GUMMI HEDERAE. *Lacryma gummi-resinosa, ex*

Hedera Helice LINN. *Arborea, Hispanica.* . . . . GOMA YEDRA.

GUMMI JUNIPERI. Vide RESINA.

GUMMI LACCA. Vide RESINA.

GUMMI MYRRHA. *Lacryma gummi-resinos.*

An ex Amyridis specie LINN? *Indic. MIRRA.*

GUMMI OPOPONAX. . . *Substantia gummi-resinosa, ex*

Pastinaca Opoponace LINN. *Europ. perennis.* . . . . OPOPONACO.

GUMMI SARCOCOLLA. *Lacrima gummi-resinosa, ex*

Penaea Sarcocolla LINN. . . *Ætiopic. fruticosa.* . . . SARCOCOLA.

GUMMI THUS, seu OLIBANUM. . . *Lacryma resinoso-gummosa.*

An ex Junipero Lycia LINN? . . . *Asiatic. Afric.* . . . INCENSO FINO.

GUMMI TRAGACANTHUM. *Lacryma gummosa, ex*

Astragalo Tragacantha LINN. *Oriental. fruticosa.* . . GOMA TRAGACANTO, Ó ALQUITIRA.

## H

HEDERA ARBOREA. . . . *Folia recentia, Gumi-resina.*

Hedera Helix LINN. . . . *Arborea. Hispanic.* . . . YEDRA ARBOREA.

HEDERA TERRESTRIS. . . . *Folia.*

Glechoma Hederaceum LINN. *Hispanic. perennis.* . . . YEDRA TERRESTRE.

HELENIMUM. . . . *Radix.*

Inula Helenium LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . ENULA CAMPANA.

HELLEBORVS ALBUS. . . . *Radix.*

Veratrum Album LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . HELEBORO BLANCO, Ó VEDEGAMBRE.

HELLEBORUS NIGER. . . . *Radix.*

Helleborus Niger LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . HELEBORO NEGRO.

HEPATICA NOBILIS. . . . *Folia.*

Anemone Hepatica LINN. . . . *Hispanic. perennis.*

<i>nis.</i>		HEPATICA.
HERMODACTYLI.		<i>Radix.</i>
Colchicum Illyricum BERG.		<i>Indic. peren-</i>
<i>nis.</i>		HERMODATILES.
HERNIARIA.		<i>Herba.</i>
Herniaria Glabra LINN.		<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	HERNIARIA, Ó YERBA TURCA.	
HORDEUM.		<i>Semina.</i>
Hordeum Vulgare LINN.		<i>Hispanic. sativa,</i>
<i>annua.</i>		CEBADA.
HORMINUM.		<i>Herba florida.</i>
Salvia Horminum LINN.		<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>		HORMINIO.
HYOSCYAMUS.	<i>Radix, Folia, Semina.</i>	
Hyoscyamus Niger LINN.		<i>Hispanic. bien-</i>
<i>nis.</i>		BELEÑO.
HYPECACUANHA.		<i>Cortex radidis.</i>
Viola Ipecacuanha LINN.		<i>Brasil. peren-</i>
<i>nis.</i>	HIPECACUANA, Ó BEJUQUILLO.	
HYPERICUM.	<i>Summitates floridæ, semini-</i>	
	<i>busque onustæ.</i>	
Hypericum Perforatum LINN.		<i>Hispanic. per-</i>
<i>ennis.</i>	HIPERICON, Ó CORAZONCILLO.	
HYPOCISTIS.		<i>Succus inspissatus, ex</i>
Cytino Hypocistide LINN.		<i>Parasitica Cysti,</i>
<i>Hispanic.</i>		HYPOCISTIDO.
HYSSOPUS.		<i>Summitates floridæ.</i>
Hyssopus Officinalis LINN.		<i>Hispanic. suffru-</i>
<i>ticosa.</i>		HISOPO.

## I

IMPERATORIA. . . . . *Radix.*  
 Imperatoria Ostruthium LINN. *Hispanic. per-*  
*ennis.* . . . . IMPERATORIA.

INULA. Vide HELENIUM.

IRIS FLORENTINA. . . . . *Radix.*  
 Iris Florentina LINN. . . . . *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . LIRIO DE FLORENCIA.

IRIS NOSTRAS. *Radix recens, Flores.*  
 Iris Germanica LINN. . . . . *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . LIRIO.

## J

JALAPPA . . . . . *Radix.*  
 Convolvulus Jalapa LINN. *Americ. peren-*  
*nis.* . . . . JALAPA.

JASMINUM. . . . . *Flores.*  
 Jasminum Officinale LINN. *Hispanic. fru-*  
*ticosa.* . . . . JAZMIN BLANCO.

JUJUBAE. . . . . *Fructus. (Drupa).*  
 Rhamnus Zizyphus LINN. *Hispanic. Ar-*  
*borea.* . . . . AZUFAYFAS.

JUNCUS ODORATUS. Vide SCHOENANTHUS.

JUNIPERUS. . . . . *Lignum, Fructus (Bacca),*  
*Resina.*

Juniperus Communis LINN. *Hispanic. Ar-*  
*borea.* . . . . ENEBRO.

## K

KALI. Vide SODA.

KERMES. Vide GRANA KERMES.

KINA AROMATICA. Vide CHACARILLA.

KINA. Vide QUINA.

## L

LAC MECCHOACANNAE. *Faecula amylacea.* . . . . Vide MECCHOACAN-

NA. . . . . LECHE DE MECCHOACAN.

LACTUCA. . . . . *Herba recens, Semina.*Lactuca Sativa LINN. *Hispanic. hortensis, annua.* . . . . . LECHUGA.LADANUM. *Resina per coctionem extracta è foliis, stolonibus, et ramulis*Cisti Ladaniferi LINN. . . . *Hispanic. fruticosa.* . . . . . LADANO.LAPATHUM. . . . . *Radix, Folia.*Rumex Acutus LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . . . LAPATO.LAUREOLA. . . . . *Folia.*Daphne Laureola LINN. . . . *Hispanic. fruticosa.* . . . . . LAUREOLA.LAURUS. . . . . *Folia, Fructus (Bacca).*Laurus Nobilis LINN. . . . *Hispanic. Arborea.* . . . . . LAUREL.LAVENDULA. *Summitates seminibus onustae, Flores.*Lavandula Spica LINN. . . . *Hispanic. suffruticosa.* . . . . . ESPLIEGO, Ó ALHUCEMA.LEPIDIUM. . . . . *Herba recens.*Lepidium Latifolium LINN. *Hispanic. annua.* . . . . . LEPIDIO.LICHEN. . . . . *Frons.*Lichen Islandicus LINN. *Hispanic. Islandic. perennis.* . . . . LIQUEN ISLANDICO.



LIGNUM ALOES.	.	.	.	<i>Lignum, ex</i>
Excaecaria Agallocha LINN.	.	.	.	<i>Asia-</i>
<i>tic. Arborea.</i>	.	.	.	LEÑO ALOES.
LIGNUM NEPHRITICUM.	.	.	.	<i>Lignum, ex</i>
Guilandina Moringa LINN.	.	.	.	<i>Arborea, Ame-</i>
<i>ric.</i>	.	.	.	PALO NEFRITICO.
LIGNUM RHODINUM.	.	.	.	<i>Lignum, ex</i>
Genista Canariense LINN.	.	.	.	<i>Arborea, Ca-</i>
<i>nariens.</i>	.	.	.	PALO DE ROSA, LEÑO RODINO.
LILIUM ALBUM.	.	.	.	<i>Bulbi, Flores.</i>
Lilium Candidum Linn.	.	.	.	<i>Hispanic. hortensis,</i>
<i>perennis.</i>	.	.	.	AZUCENA.
LILIUM CONVALLIUM.	.	.	.	<i>Flores.</i>
Convallaria Majalis LINN.	.	.	.	<i>Hispanic. per-</i>
<i>ennis.</i>	.	.	.	LIRIO DE LOS VALLES.
LIMONES. <i>Fructus</i> (Baccae) <i>Flavedo, Semi-</i>				
<i>na, et Succus, ex</i>				
Citro Medica Variet. LINN.	.	.	.	<i>Arborea, Hispa-</i>
<i>nic.</i>	.	.	.	LIMONES.
LINARIA.	.	.	.	<i>Herba recens,</i>
Antirrhinum Linaria LINN.	.	.	.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	.	.	.	LINARIA.
LINGUA CERVINA.	.	.	.	<i>Frons.</i>
Asplenium Scolopendrium LINN.	.	.	.	<i>Hispanic. per-</i>
<i>ennis.</i>	.	.	.	LENGUA DE CIERVO.
LINUM.	.	.	.	<i>Semina.</i>
Linum Usitatissimum LINN.	.	.	.	<i>Hispanic. sa-</i>
<i>tiva.</i>	.	.	.	LINO.
LIQUIDAMBAR.	.	.	.	<i>Balsamum, ex</i>
Liquidambar Styracifluo LINN.	.	.	.	<i>Arborea,</i>
<i>Mexic.</i>	.	.	.	LIQUIDAMBAR.

LIQUIRITIA. Vide GLYCYRRHIZA.

LITHOSPERMUM. . . . . *Semina.*

Lithospermum Officinale LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . MIJO DEL SOL.

LUJULA, sive ALELUYA. Vide ACETOSELLA.

LUPINI. . . . . *Semina.*

Lupinus Albus LINN. . . . . *Hispanic. sativa.* . . . . ALTRAMUCES.

LUPULUS. . . . . *Semina.*

Humulus Lupulus LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* . . . . LUPULO, ú HOMBRECILLO.

## M

MACIS. *Tegumentum membranosum Nucis Moschatae.* . . . . Vide NUX MOSCHATA . . . . . MACIAS.

MAJORANA. . . . . *Summitates floridæ.*

Origanum Majorana LINN. *Hispanic. hortensis, perennis.* . . . . MEJORANA.

MAJORANA SILVESTRIS. . . . . *Summitates floridæ.*

Thymus Mastichina LINN. *Hispanic. suffruticosa.* . . . . MEJORANA SILVESTRE.

MALABATHRUM. . . . . *Folia.*

Lauri Cassiae LINN. . . . . *Asiatic. Arborea.* . . . . MALABATRO, ó FOLIO INDICO.

MALA INSANA. . . . . *Fructus (Bacca)*

Solani Melongenæ LINN. . . . . *Hispanic. sativa.* . . . . BERENGENAS.

MALVAE. *Folia, Cortex radicis, Flores, Semina.*

- Malva Silvestris, et Rotundifolia LINN. *Hispanic. annua.* . . . . MALVAS.
- MANDRAGORA. . . *Folia recentia, Radix, Fructus (Bacca),*
- Atropa Mandragora LINN. . *Hispanic. perennis.* . . . . MANDRAGORA.
- MANNA. *Lacryma gummoso-sacharina, ex Fraxino Orno* LINN. . . . *Arborea, Calabrens.* . . . . MANA.
- MARRUBIUM. . . . *Folia, Summitates.*
- Marrubium Vulgare LINN. . *Hispanic. perennis.* . . . . MARRUBIO.
- MARUM CORTUSI. . . *Herba, Summitates.*
- Teucrium Marum LINN. *Hispanic. hortensis, suffruticosa.* . . . . MARO CORTUSO.
- MARUM VULGARE. . . *Folia, Flores.*
- Salvia Sclarea LINN. . . . *Hispanic. biennis.* . . . . MARO VULGAR.
- MASTICHE. Vide RESINA.
- MATRICARIA. . . . *Herba florida.*
- Matricaria Parthenium LINN. *Hispanic. perennis,* . . . . MATRICARIA.
- MECHOACANNA. . . . *Radix, Faecula.*
- An Convolvulus Sepium LINN? *Americ. perennis.* . . . . MECHOACANNA.
- MEL. Vide ZOOLOGIA.
- MELILOTUS. . . *Herba virens, Semina*
- Trifolium Melilotus LINN. *Hispanic. biennis.* . . . MELIOTO, ó TREBOL OLOROSO
- MELISSA. . . . *Folia, Summitates*
- Melissa Officinalis LINN . . *Hispanic. per*

<i>ennis.</i>					TORONGIL.
MELO.			<i>Fructus (Pomi)</i>		<i>Semina.</i>
Cucumis Melo LINN.			<i>Hispanic.</i>	<i>hortensis,</i>	
<i>annua.</i>					MELON.
MENTHA.			<i>Folia, Summitates</i>	<i>floridæ.</i>	
Mentha Sativa LINN.			<i>Hispanica,</i>	<i>hortensis,</i>	
<i>perennis.</i>					YERBABUENA.
MENTHASTRUM.				<i>Folia,</i>	
Mentha Rotundifolia LINN.			<i>Hispanic.</i>	<i>peren-</i>	
<i>nis.</i>					MASTRANZO.
MENTHA PIPERITA.			<i>Summitates</i>	<i>floridæ.</i>	
Mentha Piperita LINN.			<i>Hispanic.</i>	<i>hortensis,</i>	
<i>perenn.</i>	YERBABUENA	DE SABOR	DE PIMIENTA.		
MERCURIALIS.				<i>Herba.</i>	
Mercurialis Annua LINN.				<i>Hispa-</i>	
<i>nic.</i>					MERCURIAL.
MESPILUS.			<i>Fructus (Antrum).</i>		
Mespilus Germanica LINN.			<i>Hispanic.</i>	<i>Arbo-</i>	
<i>rea.</i>					NISPERO.
MEUM ATHAMANTICUM.				<i>Semina.</i>	
AEthusa Meum LINN.			<i>Hispanic.</i>	<i>bien-</i>	
<i>nis.</i>					MEO ATAMANTICO.
MEZEREUM.			<i>Folia, Cortex caulis, et</i>		
<i>radicis.</i>					
Daphne Mezereum LINN.			<i>Hispanic.</i>	<i>peren-</i>	
<i>nis.</i>					MECEREON.
MILIUM.				<i>Semina.</i>	
Panicum Miliaceum LINN.			<i>Hispanic.</i>	<i>sati-</i>	
<i>va.</i>					MILJO.
MILLEFOLIUM.				<i>Herba.</i>	
Achillea Millefolium LINN.			<i>Hispanic.</i>	<i>peren-</i>	

- nis.* . . . MILEFOLIO, Ó MILENRAMA.  
**MORA.** *Fructus* (Calix baccatus), *Folia re-*  
*centia.*  
**Mori Nigrae** LINN. . . . *Arborea, Hispa-*  
*nic.* . . . . . MORAS.  
**MUSCUS ARBOREUS,** . . . . *Frons.*  
**Lichen Plicatus** LINN. *Hispanic. perennis, pa-*  
*rasilica.* . . . . MUSCO ARBOREO,  
**MYROBALANI BELLERICI** . . . *Fructus.*  
 (Drupa), ex  
**Terminalia Bellerica** RHEED, et BREYN. *Arbo-*  
*rea, Asiatic.* . . . . MIROBALANOS BELERICOS.  
**MYROBALANI EMBLICI.** . . . *Fructus*  
 (Capsula), ex  
**Phyllantho Emblica** LINN. *Arborea, Asia-*  
*tic.* . . . . MIROBALANOS EMBLICOS.  
**MYROBAL. CHEBULI.** } *Fruct. (Drupa)*  
**MYROBALANI CITRINI.** } *aetate diversa*  
**MYROBALANI INDICI.** } *collectus, ex*  
**Terminalia Chebula** LINN. . . *Arborea.*  
*Asiatic.* . . . . MIROBALANOS QUEBULOS, CETRINOS,  
 É INDICOS.  
**MYRRHA.** Vide GUMMI.  
**MYRTILLUS.** . . . *Fructus (Bacca).*  
**Vacinium Myrtillus** LINN. *Hispanic. frutico-*  
*sa.* . . . . ARANDANO, MIRTILO.  
**MYRTUS.** . . . *Folia, Fructus (Bacca).*  
**Myrtus Communis** LINN. . . *Hispanic. fruti-*  
*cosa.* . . . . . ARRAYAN.



N

NAPHA.	Flores.
Vide AURANTIUM.	AZAHAR.
NAPI.	Radix, Semina.
Brassica Napus LINN.	Hispanic. sa-
tiva.	NABOS.
NASTURTIIUM AQUATICUM.	Herba,
recens.	
Sisymbrium Nasturtium LINN.	Hispa-
nic. perennis.	BERRO.
NASTURTIIUM HORTENSE.	Herba, Semina.
Lepidium Sativum LINN.	Hispanic. an-
nua.	MASTUERZO.
NICOTIANA.	Folia recentia. Semina,
Nicotiana Tabacum LINN.	Hispanic. sativa,
annua.	TABACO.
NIGELLA.	Semina.
Nigella Sativa LINN.	Hispanic. an-
nua.	NEGUILLA.
NUCES JUGLANDIS.	Semina.
Juglandis Regiae LINN.	Hispanic. Arbo-
rea.	NUECES.
NUX MOSCHATA.	Semen, ejus tegumen-
tum, ex	
Myristica Moschata LINN.	Arborea, In-
dic.	NUEZ MOSCADA.
NUX VOMICA.	Semina.
Strychnos Nux Vomica LINN.	Indic. Ar-
borea.	NUEZ VOMICA.
NYMPHAEA.	Flores, Radix.
Nymphaea Alba LINN.	Hispanic. per-

ennis.

NINFEA.

## O

OLEUM MARIAE. Vide BALSAMUM.

OLEUM OLIVARUM. . . . . *Notissimum, ex*Olea Europaea LINN. . . . . *Arborea, Hispanic.* . . . . . ACEYTE COMUN.OLEUM OMPHACINUM. . . . . *Oleum è fructibus (Drupis), nondum perfectè maturis expressum,*Oleae Europaeae LINN. . . . . *Arborea. Hispanic.* . . . . . ACEYTE ONFACINO.

OLIBANUM. Vide GUMMI THUS.

OMPHACIUM. . . . . *Succus expressus è fructibus. (Baccis) immaturis*Vitis Viniferae LINN. . . . . *Hispanic. fruticosa,* . . . . . ZUMO DE AGRAZ.ONONIS. . . . . *Radix.*Ononis Spinosa LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* . . . . . UÑA GATA, Ó GATUÑA.OPIUM. . . . . *Succus inspissatus,*  
An ex Papavere Orientale LINN? *Asiatic. annua.* . . . . . OPIO.

OPOBALSAMUM, sive BALSAMUM VERUM.

. . . . . *Resina liquida, ex*  
Amyride Opobalsamo LINN. *Arabic. fruticosa.*

OPOBALSAMO, BALSAMO SYRIACO, Ó DE MECA.

OPOPONAX. Vide GUMMI

ORIGANUM. . . . . *Summitates floridæ.*Origanum Vulgare LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* . . . . . OREGANO.ORYZA. . . . . *Semina.*

- Oryza Sativa LINN. . . . . *Hispanic. annua.* . . . . ARROZ.  
 OXYACANTHA. . . . . *Fructus (Antrum).*  
 Crataegus Oxyacantha LINN. *Hispanic. fruticosa.* . . . . ESPINO MAJUELO.

## P

- PAEONIA. . . . . *Radix, Petala, Semina.*  
 Paeonia Officinalis LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* . . . . PEONIA.  
 PALEA DE MECHA. Vid. SCHOENANT.  
 PALMA CHRISTI. Vide RICINUS.  
 PAPAVER ALBUM. *Folia, Fructus (Capsulae) Pericarpia, et Semina.*  
 Papaver Somniferum LINN. . . . . *Hispanic. annua.* . . . . ADORMIDERA BLANCA.  
 PAPAVER NIGRUM. . . . . *Folia recentia.*  
 Papaver Somniferum Variet. LINN. *Hispanic. hortensis.* . . . . ADORMIDERA NEGRA.  
 PAPAVER RUBRUM. . . . . *Petala, Semina.*  
 Papaver Rhoeas. LINN. . . . . *Hispanic. annua.* . . . . AMAPOLA.  
 PARIETARIA. . . . . *Herba.*  
 Parietaria Officinalis LINN. . . . . *Hispanic. annua.* . . . . PARIETARIA.  
 PASSULAE. . . . . *Fructus sicci (Baccae)*  
 Vitis Viniferae LINN. . . . . PASAS.  
 PASTINACA. . . . . *Semina.*  
 Daucus Carota LINN. . . . . *Hispanic. biennis.* . . . . ZANAHORIA.  
 PERSICUM. . . . . *Flores*  
 Amygdalus Persica LINN. . . . . *Arborea, Hispa-*

- nic.* . . . . . MELOCOTON.  
 PERSICARIA MACULATA. *Herba recens.*  
 Polygonum Persicaria LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . PERSICARIA MANCHADA.  
 PES LEONIS. Vide ALCHIMILLA.  
 PETASITES. . . . . *Folia.*  
 Tussilago Petasites LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . PETASITES, Ó SOMBRERERA.  
 PETROSELINUM. *Cortex radidis, Folia, Semina.*  
 Apium Petroselinum LINN. *Hispanic. hortensis, biennis.* . . . . PEREGIL.  
 PETROSELIN. MACEDONICUM. *Herba, Semina.*  
 Bubon Macedonicum LINN. . . . *Asiatic. biennis.* . . . . PEREGIL DE MACEDONIA.  
 PEUCEDANUM. . . . . *Radix.*  
 Peucedanum Officinale LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . PEUCEDANO.  
 PHU PONTICUM. Vide VALERIANA PHU.  
 PHYTOLACCA. . . . . *Folia.*  
 Phytolacca Decandra LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . FITOLACA, YERBA CARMIN.  
 PILOSELLA. . . . . *Herba.*  
 Hieracium Pilosella LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . PELOSILLA.  
 PIMPINELLA. . . . . *Herba virens.*  
 Poterium Sanguisorba LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . PIMPINELA.  
 PIPER ALBUM, *Piper nigrum excorticatum.*  
 PIPER LONGUM. . . . . *Fructus.*  
 Piper Longum LINN. *Arborea, Indiae Orien-*

<i>tal.</i>	PIMIENTA LARGA.
PIPER NIGRUM.	<i>Fructus (Bacca).</i>
Piper Nigrum LINN.	<i>Oriental. fruticosa.</i>
	PIMIENTA NEGRA.
PIPER TABASCI.	<i>Fructus (Bacca).</i>
Myrtus Pimenta LINN.	<i>Arborea, Mexic.</i>
	PIMIENTA DE TABASCO, MALAGUETA.
PIX BURGUNDINA.	<i>Resina mollis, ex</i>
Pino Abiete LINN.	<i>Arborea, Italic.</i>
	PEZ DE BORGÑA.
PIX GRAECA.	<i>Resina solida, pellucida, hyacinthina, residua post distillationem olei crassi Therebintinae.</i>
	PEZ GRIEGA.
PIX NIGRA.	<i>Resina, compacta et nitida, ex combustione.</i>
Pini Silvestris LINN.	<i>Arborea, Hispanic.</i>
	PEZ NEGRA.
PLANTAGO.	<i>Folia, Semina.</i>
Plantago Major. LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>
	LLANTEN.
POLIUM MONTANUM.	<i>Summitates.</i>
Teucrium Polium LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>
	POLIO MONTANO, ZAMARRILLA.
POLYGALA.	<i>Radix, Herba.</i>
Polygala Amara LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>
	POLIGALA AMARGA.
POLYGONATUM.	<i>Radix.</i>
Convallaria Polygonatum LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>
	POLIGONATO.
POLYPODIUM.	<i>Radix.</i>



- Polypodium Vulgare LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . . POLIPODIO.  
 POLYTRICHUM. Vide SCOLOPENDRIUM.  
 POMA REDOLENTIA. *Fructus* (Pomum)  
 Pyri Mali LINN. . . . . *Arborea, Hispanica.* . . . . . CAMUESAS.  
 POPULUS NIGRA. *Folia, Gemmae foliferae.*  
 Populus Nigra LINN. . . . . *Arborea, Hispanica.* . . . . . CHOPO.  
 PORRUM. . . . . *Semina.*  
 Allium Porrum LINN. . . . . *Hispanic. sativa.* . . . . . PUERRO.  
 PORTULACA . . . . . *Herba recens.*  
 Portulaca Oleracea LINN. . . . . *Hispanic. annua.* . . . . . VERDOLAGA.  
 POTENTILLA. . . . . *Radix, Herba*  
 Potentilla Reptans LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* POTENTILA, PENTAFILON, Ó CINCOENRAMA.  
 PRIMULA VERIS. . . . . *Herba.*  
 Primula Officinalis LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* . . . . . YERBA DE LA PRIMAVERA.  
 PRUNA. . . . . *Fructus* (Drupa)  
 Pruni Domesticae LINN. . . . . *Arborea, Hispanica.* . . . . . CIRUELAS DAMASCENAS.  
 PRUNELLA. . . . . *Herba.*  
 Prunella Vulgaris LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* . . . . . BRUNELA.  
 PSYLLIUM. . . . . *Semina.*  
 Plantago Psyllium LINN. . . . . *Hispanic. annua.* . . . . . ZARAGATONA.  
 PULEGIUM *Folia, Summitates floridæ.*

Mentha Pulegium LINN.	Hispanic. perennis.	POLEO.
PULMONARIA MACULATA.	Folia.	
Pulmonaria Officinalis LINN.	Hispanic. perennis.	PULMONARIA OFICINAL.
PULSATILLA.	Herba recens.	
Anemone Pulsatilla LINN.	Hispanic. perennis.	PULSATILA.
PYRETHRUM.	Radix.	
Anthemis Pyrethrum LINN.	Bohem. perennis.	PELITRE.
PYROLA.	Herba.	
Pyrola Rotundifolia LINN.	Hispanic. perennis.	PYROLA.

Q

QUARANGUS.	Vide QUINA.	
QUASSIA.	Vide SIMARUBA.	
QUERCUS.	Cortex, Semina.	
Quercus Ilex LINN.	Arborea, Hispanic.	ENCINA.
QUINA AROMATICA.	Vide CHACARILLA.	
QUINA CALISAYA.	Cortex surculorum.	
An ex Cinchona Lanceolata Ruiz, et Pavon?	Arborea, Americ.	QUINA CALISAYA DE CAÑUTILLO.
QUINA EX LOXA.	Cortex surculorum.	
Cinchona Officinalis LINN.	C. Condaminea	
HUMB. et BOMPL.	Arborea, Americ.	QUINA DE LOXA.
QUINA PERUANA.	Cortex surculorum.	
Cinchona Nitida Ruiz, et Pavon.	Arborea,	

*Americ.* . . . . QUINÁ PERUVIANA

## R

RANUNCULUS. . . . *Herba recens.*

*Varii usurpantur in Officinis nostris, ut*

Ranunculus Acris, Ranunculus Aquatilis

LINN.. *Hispanic.* . . . . RANUNCULO.

RAPHANUS. . . . *Radix, Semina.*

Raphanus Sativus LINN. *Hispanic. hortensis,*  
*sativa.* . . . . RABANO.

RAPHANUS RUSTICANUS. *Cortex radicis recens.*

Cochlearia Armoracia LINN. *Hispanic. hor-*  
*tensis, perennis.* . . . RABANO. RUSTICANO.

RATANHIA. . . . *Radix.*

Krameria Triandra FLOR. PERUV. *Americ. per-*  
*ennis,* . . . . RATANIA.

RESINA ANIME. . . . *Resina solida, ex*

Hymenaea Courbaril LINN. *Arborea, Ame-*  
*ric.* . . . . ANIME.

RESINA CARANNA. *Resina solida, nigri-*  
*cans, ex*

Palmae specie nondum nota. . . Vide Mater.  
Medic. BERG. . . . CARAÑA.

RESINA COPAL. . . . *Resina, ex*

Elaeocarpus Copallifera LINN. *Arborea, Asia-*  
*tic.* . . . . COPAL.

RESINA ELEMI. *Resina mollis, fragrans, ex*

Amyride Elemiferä LINN. *Arborea, Ame-*  
*ric.* . . . . GOMA DE LIMON.

RESINA GUAJACI. *Resina compacta, ex*

Guajaco Officinali LINN. . . *Arborea, Ame-*  
*ric.* RESINA DE GUAJACO, Ó DE PALO SANTO,

RESINA JUNIPERI. *Lacryma resinosa, ex*  
Junipero Cummini LINN. *Arborea, Hispan-*  
*nic.* RESINA DE ENEBRO, GRASILLA, SANDARACA.

RESINA LACCA. *Resina gummoso-extracti-*  
*va, ex*

Crotone Laccifero LINN. . . . *Arborea, In-*  
*dic.* . . . . . GOMA LACA.

RESINA MASTICHE. . . . *Lacryma resinosa,*  
*diaphana, et splendens, ex*

Pistacia Lentisco LINN. . . . *Arborea, Asia-*  
*tica.* . . . . . ALMACIGA.

RESINA PINI, seu COMMUNIS. . . . *Resina*  
*pura, concreta, opaca, residua post distil-*  
*lationem olei volatilis Therebintinae cum*  
*aquâ subacta.* . . . . RESINA DE PINO.

RESINA THUS. Vide GUMMI THUS.

RHABBARBARUM. . . . . *Radix.*

Rheum Palmatum LINN. . . . *Asiatic. peren-*  
*nis.* . . . . . RUIBARBO.

RHAMNUS CATHARTICUS. . . . *Fructus.*  
(Bacca). . . . . *ATUE*

Rhamnus Catharticus LINN. *Hispanic. fruti-*  
*cosa.* RAMNO CATARTICO, Ó ESPINA CERVINA.

RHAPONTICUM. . . . . *Radix.*

Rheum Rhaponticum LINN. . . . *Europ. peren-*  
*nis.* . . . . . RAPONTICO.

RHEUM. Vide RHABBARBARUM.

RICINUS. . . . . *Semina.*

Ricinus Communis LINN. . . . *Hispanic. bien-*  
*nis.* . . . . RICINO, Ó HIGUERA DEL INFIERNO.

ROSA PALLIDA. . . . . *Petala.*



Rosa Centifolia LINN. *Hispanic. hortensis, fruticosa.* . . . . . ROSA DE ALEXANDRIA.

ROSA RUBRA. *Petala florum nondum explicatorum.*

Rosa Gallica LINN. *Hispanic. hortensis, fruticosa.* . . . . . ROSA RUBRA, Ó CASTELLANA.

ROSMARINUS. *Folia, Summitates, Flores.*

Rosmarinus Officinarum LINN. *Hispanic. suffruticosa.* . . . . . ROMERO.

RUBIA. . . . . Radix.

Rubia Tinctorum LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . . RUBIA DE TINTOREROS, GRANZA.

RUBUS. *Sirculi recentes, Fructus (Bacca).*

Rubus Fruticosus LINN. *Hispanic. ZARZAMORA.*

RUBUS IDAEUS. . . . . *Fructus (Bacca).*

Rubus Idaeus LINN. . . . . *Hispanic. fruticosa.* . . . . . SANGUESA.

RUSCUS. . . . . *Radix, Folia.*

Ruscus Aculeatus LINN. . . . *Hispanic. fruticosa.* . . . . , BRUSCO.

RUTA. . . . . *Herba-recens.*

Ruta Graveolens LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . . . RUDA.

RUTA CAPRARIA. . . . . *Herba.*

Galega Officinalis LINN. . . . *Hispanic. perennis.* . . . . RUDA CABRUNA, GALEGA.

## S

SABINA. . . . . *Folia, Fructus (Drupa).*

Juniperus Sabina LINN. . . . *Hispanic. fruticosa.* . . . . . SABINA.



**SACCHARUM.** *Substantia concreta sui generis elicitā ex*

**Saccharo Officinali** LINN. *Indic. Hispanic. perennis.* . . . . . **AZUCAR.**

**SAGAPENUM.** *Lacryma gummi-resinosa, ex Ferulae specie* LINN. *Oriental.* . . . . **SAGAPENO.**

**SALICARIA.** . . . . *Herba recens.*

**Lythrum Salicaria** LINN. *Hispanic. suffruticosa.* . . . . **SALICARIA.**

**SALVIA.** . . . . *Folia, Summitates.*

**Salvia Officinalis** LINN. *Hispanic. suffruticosa.* . . . . **SALVIA.**

**SAMBUCUS.** *Cortex interior, Folia recentia, Fructus (Bacca), Flores.*

**Sambucus Nigra** LINN. . . . *Arborea, Hispanic.* . . . . **SAUCO.**

**SAMPSUCUS.** Vide **MAJORANA SILVESTRIS.**

**SANDARACHA.** Vide **RESIN. JUNIPERI.**

**SANGUINARIA MAJOR.** Vide **CENTUMNODIUM.**

**SANGUINARIA MINOR.** . . . . *Herba florida.*

**Illecebrum Paronychia** LINN. *Hispanic. perennis.* **SANGUINARIA MENOR,** Ó **NEVADILLA.**

**SANGUIS DRACONIS.** *Resina rubra, compacta.*

*Variae sunt species, praecipue usurpatur, ex*

**Dracaena Dracone** LINN. *Arborea, Canariensis.* . . . . **SANGRE DE DRAGO.**

**SANICULA.** . . . . *Folia,*

**Sanicula Europaea** LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . **SANICULA.**

SANTALUM ALBUM. *Alburnum trunci in scobem redactum.*

Santalum Album LINN. . . . . *Arborea, Asia-tic.* . . . . SANDALO BLANCO.

SANTALUM CITRINUM. *Rasurae meditullii lignosi Santali Albi.* . . . . SANDALO CITRINO.

SANTALUM RUBRUM. *Lignum in scobem redactum.*

Pterocarpus Santalinus LINN. *Arborea, Asia-tic.* . . . . SANDALO RUBIO.

SANTONICUM. . . . . *Semina.*

Artemisia Santonica LINN. . . . . *Persic. perennis.* SIMIENTE DE ALEJANDRIA, SANTONICO.

SARSAPARRILLA. . . . . *Radix.*

Smilax Sarsaparrilla LINN. *Americ. suffruticosa.* . . . . ZARZAPARRILLA.

SASSAFRAS. *Lignum et Cortex radiceis.*

Laurus Sassafras LINN. *Arborea, Americ.* . . . . SASAFRAS

SATUREJA. . . . . *Summitates floridae.*

Satureja Hortensis LINN. *Hispanic. hortensis, annua.* . . . . AJEDREA.

SATYRIUM. . . . . *Radix.*

Orchis Bifolia LINN. . . . . *Hispanic. perennis.* . . . . SATIRION

SAXIFRAGA ALBA. *Radix, Herba, Flores*

Saxifraga Granulata LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . SAXIFRAGA

SCABIOSA. . . . . *Herba florida*

Scabiosa Arvensis LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . ESCABIOSA

- SCAMMONIUM. . . . . *Succus inspissatus, ex*  
 Convolvulo Scammonea LINN. . . . . *Syriac. per-*  
*ennis.* . . . . ESCAMONEA.
- SCHOENANTHUM. . . . . *Herba florida.*  
 Andropogon Schoenanthus LINN. . . . . *Indic. per-*  
*ennis.* . . . . ESQUENANTO, PAJA DE MECA.
- SCOLOPENDRIUM. Vide LINGUA CERVINA.
- SCORDIUM. . . . . *Herba.*  
 Teucrium Scordium LINN. . . . . *Hispanic. peren-*  
*nis,* . . . . . ESCORDIO.
- SCORZONERA. . . . . *Radix.*  
 Scorzonera Hispanica LINN. . . . . *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . ESCORZONERA.
- SCROPHULARIA. . . . . *Herba.*  
 Scrophularia Aquatica LINN. . . . . *Hispanic. peren-*  
*nis.* . . . . ESCROFULARIA.
- SCYLLA. . . . . *Bulbi.*  
 Scilla Maritima LINN. . . . . *Hispanic. peren-*  
*nis-* . . . . . CEBOLLA ALBARRANA.
- SECALE. . . . . *Semina.*  
 Secale Cereale LINN. . . . . *Hispanic. sati-*  
*va.* . . . . . CENTENO.
- SEDUM MINUS. Vide SEMPER VIVUM MINUS.
- SEMEN CONTRA. Vide SANTONICUM.
- SEMPERVIVUM MAJUS. . . . . *Folia recentia.*  
 Sempervivum Tectorum LINN. . . . . *Hispanic. per-*  
*ennis.* . . . . SIEMPREVIVA MAYOR.
- SEMPERVIVUM MINUS. . . . . *Herba recens.*  
 Sedum Acre LINN. . . . . *Hispanic. an-*  
*nua.* . . . . UVAS DE GATO, SIEMPREVIVA MENOR.
- SENECIO. . . . . *Folia, Summitates floridæ.*

- Senecio Vulgaris LINN. . . . *Hispanic. annua.* . . . . SENECIO, YERBA CANA.
- SENNA HISPANICA. . . . . *Folia.*
- An Cassiae Sennae Var. LINN? *Hispanic. sativa.* . . . . SEN DE ESPAÑA.
- SENNA ORIENTALIS. . . . . *Folia.*
- Cassia Senna LINN. . . . *AEgyptiac. perennis.* . . . . SEN ORIENTAL.
- SERPENTARIA VIRGINIANA. . . . *Radix.*
- Aristolochia Serpentaria LINN. *Americ. perennis.* . . . . SERPENTARIA VIRGINIANA.
- SERPILLUM. . . . *Summitates floridæ.*
- Thymus Serpyllum LINN. *Hispanic. suffruticosa.* . . . . SERPOL.
- SESAMUM. . . . . *Semina.*
- Sesamum Orientale LINN. *Hispanic. hortensis, annua.* . . . . SESAMO, ALEGRIA, AJONJOLI.
- SESELI CRETICUM. . . . . *Semina.*
- Tordylium Officinale LINN. *Hispanic. Italic. annua.* . . . . COMINO DE CRETA.
- SESELI MASSINIELSE. . . . . *Semina.*
- Seseli Tortuosum LINN. *Europ. Austral. Hispanic. perennis.* . . . . COMINO DE MARSELLA.
- SESELI RUSTICUM. . . . . *Semina.*
- Thapsia Asclepium LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . COMINO RUSTICO.
- SILIQUEAE. . . . . *Fructus (Legumen)*
- Ceratoniae Siliquae LINN. *Hispanic. Arborea.* . . . . ALGARROBAS DE VALENCIA.
- SIMARUBA. . . . . *Cortex radices.*
- Quassia Simaruba LINN. *Arborea, Ame-*

- ric.* . . . . . SIMARUBA.  
**SINAPIS.** . . . . . *Semina.*  
 Sinapis Nigra LINN. *Hispanic. hortensis., an-*  
*nua.* . . . . . MOSTAZA.  
**SISARUM.** . . . . . *Radix, Semina.*  
 Sium Sisarum LINN. *Indic. Hispanic. bien-*  
*nis.* . . . . . SISARO, Ó CHIRIVIA DE QUARESMA.  
**SISYMBRIUM.** . . . . . Vide NASTURTium.  
**AQUATICUM.**  
**SODA.** . . . . . *Cineres, ex*  
 Salsola Sativa LINN. . . . . *Hispanic.*  
*nua.* . . . . . BARRILLA.  
**SOLANUM.** . . . . . *Herba recens.*  
 Solanum Nigrum LINN. . . . . *Hispanic. an-*  
*nua,* . . . . . SOLANO NEGRO, YERBA MORA.  
**SPICA CELTICA.** . . . . . *Radix.*  
 Valeriana Celtica LINN. *Hispanic. Germanic.*  
*biennis.* . . . . . ESPICA CELTICA.  
**SPICA NARDUS.** . . . . . *Radix.*  
 Andropogon Nardus LINN. *Indic. peren-*  
*nis,* . . . . . ESPICANARDO, NARDO INDICO.  
**SPINA CERVINA.** Vide RHAMNUS CATHAR-  
**TICUS.**  
**STACHYS.** . . . . . *Herba.*  
 Stachys Recta LINN. . . . . *Hispanic. perennis.*  
 ESTAQUIS RECTA, Ó YERBA DE LA FERIDURA.  
**STAECHAS.** . . . . . *Folia, Spicae floridae,*  
 Lavandula Staechas LINN. *Hispanic. suffruti-*  
*cosa.* . . . . . CANTUESO.  
**STAPHISAGRIA.** . . . . . *Semina.*  
 Delphinium Staphisagria LINN. *Hispanic. bien-*



- nis.* . . . . . ESTAFISAGRIA, ALBARRAZ.  
**STRAMONIUM.** . . . . *Herba recens.*  
**Datura Stramonium** LINN. *Hispanic. annua.* . . . . . ESTRAMONIO.  
**STYRAX, seu STORAX CALAMITA.** *Resina concreta cum acido benzoico combinata, ex Styrace Officinali* LINN. *Arborea, Indic. Oriental,* . . . . . ESTORAQUE.  
**STYRAX, seu STORAX LIQUIDA.** *Ex Styrace Calamita, Balsamo de Mecha, Vino, et Oleo conficitur, in doliolis nobis ab India affertur, et Styrax liquida improprie dicitur.* . . . . . ESTORAQUE LIQUIDO.  
**SUMACH.** *Curtex surculorum, Folia, Fructus (Bacca).*  
**Rhus Coriaria** LINN. *Hispanic. fruticosa,* . . . . . ZUMAQUE.  
**SYMPHITUM MAJUS.** . . . . *Radix, Folia.*  
**Symphytum Officinale** LINN. *Hispanic. perennis.* SINFITO MAJOR, Ó SUELDACONSUELDA.  
**SYMPHYTUM MINUS.** . . . . *Radix.*  
**Symphytum Tuberosum** LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . . SINFITO MENOR.

## T

- TACAMAHACA.** *Lacryma resinosa, ex Fagara Octandra, et Populo Balsamifera* LINN. *Arborea, Americ.* . . . . . TACAMACA.  
**TAMARINDUS.** *Fructus (Leguminis) Pulpa.*  
**Tamarindus Indica** LINN. *Arborea. Americ. Indic,* . . . . . TAMARINDO.  
**TAMARISCUS.** . . . . *Cortex ligni, Folia,*

- Tamarix Gallica** LINN. . . *Hispanic. Arborea.* . . . . . TARAY.
- TANACETUM.** . . . *Summitates floridæ.*
- Tanacetum Vulgare** LINN. *Hispanic. hortensis.*  
*perennis.* YERBA LOMBRIGUERA, TANACETO.
- TAPIOCA.** . . . . *Faecula, ex*  
*Cycas Circinali, et Metroxylo Sagu.* LINN. *Indic. Oriental.* . . . . TAPIOCA, SAHAGU.
- TARAXACUM.** . . . *Herba recens.*  
**Leontodon Taraxacon** LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . DIENTE DE LEON.
- TARTARUS.** *Tartras acidulus potassæ impurus, in lagenis vini post fermentationem incrustatus.* . . . RASURAS DE VINO, TARTARO.
- TELEPHIUM.** . . . *Herba recens.*  
**Sedum Telephium** LINN. *Hispanic. perennis.* . . . . TELEFIO.
- TEREBINTHINA ABIETIS.** *Resina liquida, ex*  
**Pino Abiete** LINN. *Arborea, Asiatic. Europ.* . . . TREMENTINA DE ABETO.
- TEREBINTHINA COMMUNIS.** *Resina liquida, ex*  
**Pino Silvestri** LINN. . . *Arborea, Hispanic.* . . . TREMENTINA COMUN.
- TEREBINTHINA VENETA.** *Resina liquida, ex*  
**Pino Larice** LINN. . . *Arborea, Europea.* . . . TREMENTINA DE VENECIA.
- N. B. *Terebinthina Abietis usurpari debet imprimis pro usu interno.*
- TERRA JAPONICA.** Vide CATECHU.
- TEUCRIUM.** . . . . *Herba.*

Teucrium Flavum LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>	TEUCRIO VERDADERO.
THAPSIA.	<i>Radix, Semina.</i>	
Thapsia Asclepium LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>	TAPSIA.
THE HISPANICUM.	<i>Herba florida.</i>	
Chenopodium Ambrosioides LINN.	<i>Hispanic. annua.</i>	TE DE ESPAÑA.
THE ORIENTALE.	<i>Folia.</i>	
Thea Bohea LINN.	<i>Indic. fruticosa.</i>	TE ORIENTAL.
THLASPI. Vide BURSA. PASTORIS.		
THUS, seu OLIBANUM. Vide GUMMI.		
THYMBRA HISPANICA.	<i>Summitates floridæ.</i>	
Thymbra Verticillata LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>	TIMBRA.
THYMELEA.	<i>Cortex caulis, Folia.</i>	
Daphne Thymelea LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>	TIMELEA.
THYMUS CRETICUS.	<i>Summitates floridæ.</i>	
Satureja Capitata LINN.	<i>Hispanic. suffruticosa.</i>	TOMILLO DE CABEZUELAS.
THYMUS OFFICINALIS.	<i>Summitates floridæ.</i>	
Thymus Vulgaris LINN.	<i>Hispanic. suffruticosa.</i>	TOMILLO.
TILIA.	<i>Cortex ligni interior, Flores.</i>	
Tilia Europaea LINN.	<i>Arborea, Hispanic.</i>	TILO.
TORMENTILLA.	<i>Radix.</i>	
Tormentilla Erecta LINN.	<i>Hispanic. perennis.</i>	TORMENTILA.

TRITICUM. *Seminum Farina, Fermentum, Panis.*

Triticum Hybernum LINN. *Hispanic. sativa.* TRIGO CANDEAL.

TUNICAE. Vide CARYOPHYLLI HORTENSES.

TURPETHUM. *Radix.*

Convolvulus Turpethum LINN. *Indic. perennis.* TURBIT.

TUSSILAGO. *Folia.*

Tussilago Farfara LINN. *Hispanic. perennis.* TUSILAGO.

U

ULMARIA. *Herba.*

Spiraea Ulmaria LINN. *Hispanic. perennis.* ULMARIA.

UMBILICUS VENERIS. *Folia recentia.*

Cotyledon Umbilicus LINN. *Hispanic. annua.* OMBLIGO DE VENUS.

URTICA. *Herba recens, Semina.*

Urtica Dioica LINN. *Hispanic. perennis.* ORTIGA.

UVA URSI. *Folia, Fructus (Bacca).*

Arbutus Uva Ursi LINN. *Hispanic. suffruticosa.* GAYUBA.

V

VALERIANA PHU, seu MAJOR. *Radix.*

Valeriana Phu LINN. *Hispanic. perennis.* VALERIANA MAYOR.

VALERIANA SILVESTRIS, seu MINOR. *Radix.*

Valeriana Officinalis LINN. *Hispanic. peren-*

<i>nis.</i>	VALERIANA SILVESTRE.
VANILLA.	<i>Fructus (Siliqua).</i>
Epidendrum Vanilla LINN.	<i>Americ-fruticosa,</i>
<i>parasitica.</i>	VAYNILLA.
VERBASCUM.	<i>Folia, Summitates floridæ.</i>
Verbascum Thapsus LINN.	<i>Hispanic. bien-</i>
<i>nis.</i>	GORDOLOBO.
VERBENA.	<i>Folia.</i>
Verbena Officinalis LINN.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	VERBENA.
VERONICA.	<i>Herba.</i>
Veronica Officinalis LINN.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	VERONICA.
VINCA PERVINCA.	<i>Folia recentia.</i>
Vinca Minor LINN.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	YERBA DONCELLA.
VINCETOXICUM.	<i>Radix.</i>
Asclepias Vincetoxicum LINN.	<i>Hispanic. per-</i>
<i>ennis.</i>	VENCETÓSIGO.
VINUM ALBUM et RUBRUM.	<i>Notissi-</i>
<i>mum.</i>	VINO BLANCO Y TINTO.
VIOLA.	<i>Folia recentia, Flores.</i>
Viola Odorata LINN.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	VIOLETA.
VIPERINA.	Vide SCORZONERA.
VIRGA AUREA.	<i>Summitates floridæ.</i>
Solidago Virga aurea LINN.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	VARA DE ORO.
VISCUM QUERCINUM.	<i>Lignum et Folia.</i>
Viscum Album LINN.	<i>Hispanic. peren-</i>
<i>nis.</i>	VISCO QUERCINO.



## X

XILOBALSAMUM. *Lignum ramulorum, ex*  
 Amyride Opobalsamo LINN. *Arabic. frutico-*  
*sa.* . . . . XILOBALSAMO.

## Z

ZEDOARIA. . . . . *Radix.*  
 Kaempheria Rotunda LINN. . *Asiatic. peren-*  
*nis.* . . . . ZEDOARIA.  
 ZINGIBER. . . . . *Radix.*  
 Amomum Zingicer LINN. . . *Asiatic. peren-*  
*nis.* . . . . GENGIBRE.

## MATERIAE MEDICAE SYLLOGE.

## S E C T I O I I I

## MINERALOGIA.

## A

AERUGO. Vide VIRIDE AERIS.  
 AETITES. Vide LAPIS.  
 ALABASTRUM. . . . . *Lapis.*  
 Gypsum Alabastrum LINN. . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . ALABASTRO, YESO COMPACTO.  
 ALUMEN. . . . . *Sal purificatus, ex*  
 Alumine Nativo LINN. *Hispanic.* . . ALUMBRE.  
 AMBRA GRYSEA. Vide ZOOLOGIA.  
 AMIANTUS. . . . . *Lapis.*  
 Asbestus Amiantus LINN. . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . ASBESTO, AMIANTO.

- ANTIMONIUM CRUDUM. *Minera fusa, ex*  
 Stibio Vulgari LINN. . . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . . ANTIMONIO CRUDO.
- ARGENTUM. . . . . *Metallum purum, ex*  
 Argenti speciebus LINN. . . . . *Hispanic. Ame-*  
*ric.* . . . . . PLATA.
- ARGILLA. . . . . *Terra.*  
 Argilla Communis LINN. . . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . . ARCILLA COMUN.
- ARSENICUM ALBUM. *Oxygeno et Arsenico*  
*constans, ex*  
 Cobalto Arsenicali et Arsenici speciebus LINN.  
*Hispanic.* . . . . . ARSENICO BLANCO.
- ARSENICUM FLAVUM. *Arsenicum Sulphure*  
*combinatum.* . . . . .
- Arsenicum Auripigmentum LINN. *Europ. Ar-*  
*tificial.* . . . . . ARSENICO AMARILLO, OROPIMENTE.
- ARSENICUM RUBRUM. *Arsenicum Sulphure*  
*combinatum.* . . . . .
- Arsenicum Sandaraca LINN. *Europ. Artifi-*  
*cial.* . . . . . ARSENICO ROJO, REJALGAR.
- ASPHALTUM. . . . . *Phlogistum.*  
 Bitumen Asphaltum LINN. *Asiatic.* ASFALTO.
- AURIPIGMENTUM. Vide ARSENICUM FLA-  
 VUM.
- AURUM. . . . . *Metallum purum, ex*  
 Auro Nativo LINN. *Americ. Hispanic.* ORO.

## R

- BARYTA. . . . . *Terra elicta è*  
 Baryte Vulgari LINN. . . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . . BARITA, TIERRA PESADA.

- BISMUTUM.** . . . *Metallum purum, ex*  
*Wismuti speciebus LINN. Europ.* BISMUTO.  
**BITUMEN JUDAIC.** Vide ASPHALTUM.  
**BOLUS ARMENICA.** . . . . *Lapis.*  
*Argilla Bolus LINN. Armen.* BOL ARMENICO.  
**BOLUS VULGARIS.** . . . . *Lapis.*  
*Argilla Rubrica LINN.* . . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . TIERRA ROXA, BOL COMUN.  
**BORAX.** . . . . *Sal purificatus, ex*  
*Borace Tincal LINN.* . . . *Indic, Oriental. Sa-*  
*xon.* . . . . ATINKAR, BORRAX.

## C

- CALYBS.** *Ferrum pauxillo carbonis combina-*  
*tum. Artesfial.* . . . . ACERO.  
**CALX.** . . . . *Terra elicita è*  
*Marmoris speciebus LINN. Hispanic.* CAL VIVA.  
**CERUSSA.** *Plumbi carbonas cum ejusdem me-*  
*talli oxydo permixtus.* . . . . *Artifi-*  
*cial.* . . . . ALBAYALDE FINO.  
**CINNABARIS NATIVA.** . . . *Metallum.*  
*Hydrargyrum Cinnabaris LINN. Hispanic.* Al-  
*maden.* . . . CINABRIO ROJO OSCURO.  
**COBALTUM.** . . . *Metallum purum, ex*  
*Cobalto Hispanico LINN.* . . . COBALTO.  
**CRETA ALBA.** . . . . *Terra.*  
*Creta Scriptoria LINN. Hispanic.* . . . CRETA.  
**CRYSTALLUS MONTANA.** . . . *Lapis.*  
*Quartzum Crystallus LINN.* . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . CRISTAL MONTANO, Ó DE ROCA.  
**CUPRUM.** . . . *Metallum purum, ex*  
*Cupri speciebus LINN. Hispanic.* . . COBRE.

## E

ELECTRUM. Vide SUCCINUM.

## F

FERRUM. . . . . *Metallum purum, ex*  
 Ferri speciebus LINN. *Hispanic.* . . . HIERRO.

## G

GRANATI. . . . . *Lapides.*  
 Gemma Granatus LINN. . . . *Indic. Eu-*  
*rop.* . . . . GRANATES.  
 GYPSUM. . . . . *Lapis.*  
 Gypsi specierum LINN. . . . . YESO.

## H

HAEMATITES. Vide LAPIS.  
 HYACINTHUS ORIENTALIS. . . . *Lapis.*  
 Gemma Hyacinthus LINN. . . . *Asia-*  
*tic.* . . . . JACINTO ORIENTAL.  
 HYDRARGYRUS. . . . *Metallum purum, ex*  
 Hydrargyri speciebus LINN. *Hispanic.* AZOGUE.

## K

KARAVE. Vide SUCCINUM.

## L

LAPIS AETITES. . . . . *Metallum.*  
 Ferrum Subaquosum Variet. Aetites LINN. *Eu-*  
*rop.* . . . . PIEDRA DEL AGUILA, Ó ETITES.  
 LAPIS CALAMINARIS. . . . . *Metallum.*  
 Zincum Calaminare LINN. . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . CALAMINA. Ó PIEDRA CALAMINAR.  
 LAPIS CANANOR. Vide LAPIS NEPHRITICUS.  
 LAPIS HAEMATITES. . . . . *Metallum.*  
 Ferrum Haematites Variet. Rubrum. LINN.

- Hispanic.* . . . . HEMATITES ROJA.  
 LAPIS JUDAICUS. . . . . *Larvatum.*  
 Helmintholithus Echini Variet. Aculeorum  
 LINN. *Hispanic.* . . . . PIEDRÁ JUDAICA.  
 LAPIS LAZULI.  
 Lazurus Orientalis LINN. . . . . *Orien-*  
*tal.* . . . . PIEDRA LAZULI, LAZULITA.  
 LAPIS NEPHRITICUS.  
 Serpentinus Nephriticus LINN. *Americ. Eu-*  
*rop.* . . . . PIEDRA CANANOR, Ó NEFRITICA.  
 LAPIS PUMEX.  
 Lava Pumex LINN. *Italic.* . . . . POMEZ.  
 LYTHARGYRUS. *Plumbi oxydum pauxillo*  
*ejusdem carbonatis permixtum.* . . . *Ar-*  
*tificial.* . . . . LITARGIRIO.

## M

- MAGNES. . . . . *Metallum.*  
 Ferrum Magnes LINN. . . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . PIEDRA IMAN, HIERRO MAGNETICO.  
 MANGANESIUM. . . . . *Metallum.*  
 Magnesia Vulgaris LINN. . . . . *Hispa-*  
*nic.* . . . . MANGANESA GRIS.  
 MARMOR. . . . . *Lapis*  
 Marmoris specierum LINN. . . . . *Vul-*  
*gar.* . . . . MARMOL, PIEDRA CALIZA.  
 MERCURIUS. Vide HYDRARGYRUS.  
 MINIUM. *Oxydum plumbi rubrum.* . . . *Ar-*  
*tificial.* . . . . MINIO.

## N

- NITRUM. . . . . *Sal purificatus, ex*  
 Codex medic. Europ. Sect. VI. p. I. E



Nitro Nativo LINN. . . . . *Hispanic.*  
*nic.* . . . . SALITRE NITRO.

## O

OLEUM PETRAE. Vide PETROLEUM.

## P

PETROLEUM. . . . . *Phlogistum.*

Bitumen Petrolèum LINN. . . . . *Italic.*  
 PETROLEO. ACEYTE MINERAL.

PLUMBAGO. . . . . *Phlogistum.*

Graphites Plumbago LINN. . . . . *Hispanic.*  
 GRAFITO, LÁPIZ PLOMO.

PLUMBUM. . . . . *Metallum purum, ex*

Plumbi speciebus LINN. *Hispanic.* PLOMO.

## R

RUBINUS. . . . . *Lapis.*

Gemma Rubinus LINN. . . . . *Indic. Oriental.*  
 RUBÍ ORIENTAL.

## S

SAL AMMONIACUS. *Sal purificatus, ex*

Muria Ammoniaca LINN. . . . . *AEgyptiac.*  
 SAL AMMONIACO.

SAL CATHARTICUS. *Sal purificatus, ex*

Amaro Genuino LINN. . . . . *Hispanic.*  
 SAL AMARGA, Ó DE LA HIGUERA.

SAL COMMUNIS. *Sal, ex evaporatione*

Muriae Aquaticae LINN. . . . . *Hispanic.*  
 SAL COMUN.

SAL GEMMA. . . . . *Sal.*

Muria Montana LINN. . . . . *Hispanic.*  
 SAL GEMA, SAL FOSIL.

SAL GLAUBERI. . . . . *Sal purificatus, ex*

Mirabile Genuino LINN.	.	.	Hispa-
nic.	.	.	SAL DE GLAUBERO.
SAPHIRUS.	.	.	Lapis.
Gemma Saphirus LINN.	.	.	Indic. Orien-
tal.	.	.	ZAFIRO ORIENTAL.
SMARAGDUS.	.	.	Lapis.
Gemma Smaragdus LINN.	.	.	Indic. Ame-
ric.	.	.	ESMERALDA.
STANNUM.	.	.	Metallum purum, ex
Stanni speciebus Linn.	.	.	Hispanic. An-
glic.	.	.	ESTAÑO.
SUCCINUM.	.	.	Phlogistum.
Succinum Electricum LINN.	.	.	Europ. SUCINO.
SULPHUR.	.	.	Phlogistum.
Sulphur Nativum LINN.	.	.	Hispanic. AZUFRE.

## T

TERRA ARGILLOSA. Vide ARGILLA.

TERRA BARYTICA. Vide BARYTA.

TERRA LEMNIA.

Argilla Lemnia LINN. TIERRA DE LEMNOS.

TERRA SIGILLATA. . . . . ex

Argilla Lemnia LINN. . . . . TIERRA SELLADA.

TINKAR. Vide BORAX.

TOPAZIUS. . . . . Lapis.

Gemma Topazius LINN. . . . . Indic. Orien-

tal. . . . . TOPACIO ORIENTAL.

TUTIA. *Oxydum zinci semivitrificatum, ex fusione*

Zinci Pseudogalenae LINN. Germanic. Hispa-

nic. . . . . TUCIA.

## V

VIRIDE AERIS. *Cupri oxydum cum ejusdem metalli acetate permixtum.* . . . *Artificial.* . . . CARDENILLO.

VITRIOLUM ALBUM. *Sal purificatus, ex*  
 Vitriolo Zinci LINN. . . . *Europ.* . . . VITRIOLO BLANCO.

VITRIOLUM CAERULEUM. . . *Sal purificatus, ex*

Vitriolo Cupri LINN. *Indic. Italic. Hispanic.* . . . VITRIOLO AZUL, PIEDRA LIPIZ.

VITRIOLUM VIRIDE. *Sal purificatus, ex*

Vitriolo Ferri LINN. . . . *Hispanic.* . . . VITRIOLO VERDE, Ó CAPARROSA.

## Z

ZINCUM. . . . *Metallum purum, ex*  
 Zinci speciebus LINN. *Hispanic.* . . . ZINC.

---

---

## C A P U T II.

### PONDERA ET MENSURAE, EORUMQUE CHARACTERES.

---

#### P O N D E R A.

- ℥j. LIBRA. . . *constat* Unciis duodecim.  
ʒj. UNCIA. . . . Drachmis octo.  
ʒj. DRACHMA. . . . Scrupulis tribus.  
ʒj. SCRUPULUS. . . . Granis viginti quatuor.  
*Ob.* OBOLUS. . . . Granis duodecim.  
*Sil.* SILIQUA. . . . Granis quatuor.  
*Gr.* GRANUM. quod aequat pondus grani hor-  
dei modicè crassi.

#### M E N S U R A E.

Hae eisdem nominibus, quibus Pondera, donantur, et quamvis capacitate variant pro diversa liquidorum gravitate specifica, ad trutinam singulae ita revocatae sunt, ut quantitas Aquarum, Decoctorum, Oleorum et Syruporum, quae omnia Mensuris inter se capacitate distinctis metiri apud nos usu receptum est, Ponderibus exactè respondeat.

*Cong.* CONGIUS habet libras octo.

*Q.* . . MENSURAE QUADRANS uncias sexdecim continet.

*Cochl.* COCHLEARE unciam ferè dimidiam, vel tres drachmas liquoris continet.

*Gut.* GUTTA minima est quae haberi potest liquoris per intervalla stillantis portiuncula.  
*Gutta liquidorum Grano solidorum ferè respondet.*

SESQLIBRA, libra una et semis.

SEQUIUNCIA, uncia una et semis.

SEQUIDRACHMA, drachma una et semis.

*N.* NUMERIS, 1, 2, 3, &c. utuntur Medici quando praescribunt aliqua, ut Fructus, Viperas, Scorpiones et similia.

*P.* PUGILLUS, quidquid digitorum apicibus comprehendi potest.

*M.* MANIPULUS, quidquid manus apprehendit quantum fieri potest dilatata.

*F.* FASCICULUS Manipulis duodecim constat.

*ss.* SEMIS medietatem cujusque ponderis significat, ut ℥ss. ℥ss. &c.

*àà.* ANA, vox à Graecis sumpta, singularum rerum prius enuntiatarum aequale pondus in schedulis sumendum esse ostendit; id est quantum de uno medicamento accipitur, tantundem de singulis est accipiendum.

*P. AE.* PARTES AEQUALES, in quibusdam schedulis ubi quantitatem non est necesse praescribere, dicitur omnium partes sumendas aequales, ut in praeparatione Carbonatis Magnesiaie usurpari solet.



*P. P.* Idest *PRAEPARATUM*  
*S. A.* Idest *SECUNDUM ARTEM.*  
*Q. S.* Idest *QUOD SUFFICIAT.*

Dicitur

cum Pharmaceutico modus componendi aut ponderandi, vel mensurandi juxta Pharmaciae regulas committitur.

*Q. V.* Idest *QUANTUM VIS*: cum Pharmaceutici judicio Pondus, vel Mensura relinquitur.

*B. M.* Idest *BALNEUM MARIAE*, seu *AQUOSUM*.

*B. V.* Idest *BALNEUM VAPORIS*.

*N. B.* 1.<sup>o</sup> In compositionibus Minsicth et Fuller libra continet uncias sexdecim.

2. <sup>o</sup> Etsi characteres Ponderum et Mensurarum in prioribus editionibus Pharmacopoeae Hispanae rejecti fuere; in hâc tamen inserere opportunum duximus, quia in formulis diversarum Pharmacopoearum reperiuntur, et quidam Medici ac Chirurghi eos etiamnunc usurpare solent.

3. <sup>o</sup> Fasciculus, Manipulus et Pugillus mensurae sunt vagae et erroribus obnoxiae, quia portionem vel quantitatem praecisè non significant ob diversam raritatem, aut soliditatem rerum mensurabilium; cujus rei gratia, et ut Pharmaceutici certè in dispensatione schedularum, partiri vel metiri possint, sic has mensuras regulamus.

FASCICULUS, libris duabus.

MANIPULUS, unciis duabus.

PUGILLUS, dimidia unciae.

Respondet pro termino medio.

## C A P U T I I I.

### *PRAEPARATIONES SIMPLICIOR.*

#### ADIPIS, AXUNGIAE, SEBI ET MEDULLAE PRAEPARATIO.

*R̄.* Adipis Q. V.

A pelliculis et partibus carnosis separa, minutim concide, Aquâ frigidâ lava, leni igne liqua, humiditatem vapora, cola et refrigeratam serva ad usum.

#### ASELLORUM PRAEPARATIO.

*R̄.* Asellorum vivorum Q. V.

Vino Albo suffoca, ablue, exsicca lenissimo calore et serva.

*Dosis à semidrachmâ ad drachmam.*

#### CORNU CERVI PULVERATIO.

*R̄.* Cornu Cervi Q. V.

Scobina derade, scobem in pulverem redige, per setaceum subtilem trajice et ad usum repone.

#### CORNU CERVI USTIO.

(*C. C. Calcinatio.*)

*R̄.* Cornu Cervi in frustula Q. V.

In fornace ure igne aperto ad albedinem, deinde pulvera, Aqua superaspersa laeviga, exsicca et usui serva.

## FELLIS PRAEPARATIO.

R̄. Fellis Tauri, vel cujusvis animalis recenter extractae Q. V.

Cola per linteum, vapore igne lento vase vitreo, balneo arenae, ad consistentiam mellis inspissati, in vase vitreo serva et repone ad usum.

## OESYPI PURIFICATIO.

R̄. OEsypi impuri Q. V.

Coque in Aquae sufficienti quantitate ut fiat liquamentum, seu puls liquida, cola per setaceum, spathulâ ligneâ agitando et exprimendo, vapore ad extracti mollis consistentiam, servaque ad usum.

*Usus externus.*

## SERI LACTIS PRAEPARATIO.

R̄. Lactis recenter mulcti Q. V.

Misce cum pauxillo floris Cynaræ Officinarum, aut cujusvis Acidi vegetabilis, supra lenem ignem in vase fictili vitreato, ut Lac coëat. Coagulum in manicam immitte, ut serum stillet, quod semel et iterum trajicies.

## SERI LACTIS CLARIFICATIO.

R̄. Seri Lactis libram unam.

Tartratis aciduli potassae pulverati scrupulum semis.

Cum ovi albumine agita et adde Sero ebullienti pauxillum Seri ipsius non calefacti. Cola per manicam et si colatura non

fuert adhuc perfectè limpida, Serum penitus refrigeratum denuo trajice.

### SPONGIAE PRAEPARATIO.

Rx. Spongiae in fragmenta longitudinalia dissectae Q. V.

Multoties Aqua ablue continuè malaxando, ut omnes impuritates exsudet et Aqua limpida evadat: postea fortiter exprime, et dum sicca ferè appareat, in albuminibus ovorum immerge, continuè malaxando, donec ejus cavitates repleantur; postea manibus exprime, et cum filo cannabino fortiter circumdatis singulis fragmentis, fiant cylindri, seu bacilli, qui siccentur ad usum.

### SPONGIAE USTIO.

Rx. Spongiae lotae et à particulis terreis spoliatae Q. V.

Incide frustulatim, et in vase terreo non vitreato benè cooperto, foraminulo in parte superiori patulo, ure igne lento, gradatim augendo per sesquihoram; post refrigerationem, spongiam, seu potius carbonem nigrimum, raram et levem pulvera subtilitè et serva ad usum.

*Usus externus.*

Eodem modo uruntur

*Spodium, seu Ebur et Similia.*

### TESTARUM PERLARUM LAEVIGATIO,

*(Matris Perlarum Praeparatio.)*

Rx. Testarum Perlarum Q. V.

Probè mundatas subtilissimè pulvera et Aquâ calidâ pluries ablue. Decantatâ Aquâ supra porphyritem, aut lapidem durum expolitum, in pulvem tenuissimam, addendo, quoties opus fuerit, Aquae pauxillum, laeviga, quousque dentibus applicatâ non stri- deat. Tunc in umbra sicca et ad usum serva.

Simili modo praeparantur.

*Caetera testacea,*

*Corallia,*

*Lapis Judaicus,*

*Succinum et similia.*

### VIPERARUM PRAEPARATIO.

R̄. Viperarum Q. V.

Forcipe apprehensis, caput, caudamque abscinde: eas excoria et exentera, atque, pinguedine, hepate et corde ad alios usus sepositis, truncos adhibe ad jacula, aut in aëre, umbræque exsicca et in vase clauso, loco sicco, repone.

Eodem modo praeparantur.

*Angues.*

### ALOES PURIFICATIO.

R̄. Aloes Q. V.

Si fortè minus pura fuerit, dissolve in Aquae sufficienti quantitate. Digere, cola cum expressione, in vase fictili vitreato vapora et sub finem in balneo aquoso ad humiditatis consumptionem inspissa.

*Dosis à scrupula ad drachmam.*



Simili modo purificantur Extracta, In-  
spissamentaue.

### GUMMI AMMONIACI PURIFICATIO.

R. Gummi Ammoniaci contusi, si minus puri  
fuerit, Q. V.

Misce igne leni Vini Albi, aut Aceti, seu  
potius Aquae sufficienti quantitate, spathulâ  
continenter agitando. Liquorem lactescentem  
pluries cola per setaceum. Vapora balneo  
aquoso ad extracti mollis consistentiam.

*Dosis à semidrachma ad drachmam.*

Simili modo purificantur

*Galbanum,*

*Sagapenum,*

*Opoponax,*

*Bdellium, &c.*

### LADANI PURIFICATIO.

R. Ladani Q. V.

In frustula redige et in quantitate Aquae  
ferventis immitte, donec mollescat et quasi  
massa emplastrica liquida appareat; postea  
fortitè agita, et dum fervet, per setaceum  
trajice, spathulâ lignea mōvendo, manibus-  
que comprimendo. Post refrigerationem re-  
sinam Aquae supernatantem, malaxa et in  
cylindros, seu in massam serva.

*Usus externus.*

### RHABARBARI TORREFACTIO.

R. Rhabarbari electi pulverati Q. V.

Mitte in patinam ferream; impone igni moderato, continuò spathulâ movendo, donec fuscum colorem adquisiverit. Serva ad usum.

Simili modo torrefiunt

*Myrobalani et similia.*

### SCYLLAE EXSICCATIO.

R̃. Bulborum Scyllae Q. V.

Externis squamis et meditullio ablatis, filo per intervalla nodis interstincto caeteras trajice, radiis solaribus expone, vel transversim in frustula sectas, ignis lenissimo calore exsicca.

*Dosis ad granum.*

### TEREBINTHINAE COCTIO.

R̃. Terebinthinae Abietis Q. V.

Coque in quadruplo Aquae ad consistentiam emplastricam, ut fiat massa pilularis ad usum servanda.

*Dosis ad drachmas duas.*

### SULPHATIS ALUMINAE EXSICCATIO,

*(Alumen Calcinatum.)*

R̃. Sulphatis Aluminae purificati Q. V.

Humiditatem in vase figulino non vitreato tamdiu igne subjecto vapore, donec ampullas amplius non emittat; post refrigerationem pulvera subtiliter et ad usum serva.

*Usus externus.*

Simili modo exsiccatur.

*Sulphas Magnesia.*

## SULPHATIS ALUMINAE PURIFICATIO.

*(Alumen Purificatum.)*

℞. Sulphatis Aluminae communis Q. V.

Solve in Aqua sufficienti quantitate et filtra; postea in vase vitreo vapore ad pelliculam, in loco frigido repone, ut concrecant crystalli. Liquorem decanta, evaporationesque repete, donec crystallos non obtineas.

*Dosis ad scrupulum.*

Sic purificantur

*Boras Sodae,**Murias Ammoniaci,**Sulphas Magnesiae,**Sodae;**Zinci,**Cupri et similia.*

## BOLI ARMENICAE PURIFICATIO.

℞. Boli Armenicae Q. V.

Cum Aqua multa permisce et agita. Aquam, cum turbida fuerit, decanta et in vase idoneo repone. Superstiti materiae iterum Aquam affunde, tere et Aquam turbidam super priorem effunde; idque toties repete, donec totam materiam subtilissimam exhausteris. Tum Aquam omnem effusam decanta et Bolum in fundo vasis remanentem exsicca et serva.

*Dosis ad drachmam.*

Simili modo purificantur.

*Argilla,*  
*Terra Lemnia.*

## CARBONATIS PLUMBI PURIFICATIO.

(*Cerussa Praeparata.*)

℞. Carbonatis Plumbi, si minus purus fuerit, Q. V.

In pulverem subtilissimum redige, Aquâ dilue et post brevissimam subsidentiam Aquam adhuc turbidam et albicantem decanta et rejice, quod repetes, donec addita nova Aquae quantitas statim clarescat; postea Aquam per decantationem separa, in umbrâ sicca et repone ad usum.

*Usus externus.*

## CINNABARIS NATIVAE LAEVIGATIO.

(*Sulphuretum Mercurii Praeparatum.*)

℞. Cinnabaris Nativae pulveratae Q. V.

In porphyrite Aquae ope laeviga quousque dentibus non strideat; postea sicca in umbrâ et vase vitreo ad usum serva.

*Dosis ad drachmam.*

Sic laevigantur

*Antimonium Crûdum,*

*Lapis Calaminaris,*

*Magneticus,*

*Haematites et similia.*

## MURIATIS SODAE EXSICCATIO.

(*Salis Communis Decrepitatio.*)

℞. Muriatis Sodae pulverati Q. V.

Immitte in patinam fictilem non vitream: supra ignem colloca et spathulâ ligneâ tamdiu agita, quousque humiditatem amittat.

### NITRATIS POTASSAE PURIFICATIO.

(*Nitrum Purificatum.*)

R̄. Nitratis Potassae communis libras octo.

Solve in Aquae calidae libris viginti. Filtratum liquorem vapore ad pelliculam et reponere in loco frigido, ut concrecant crystalli. Liquorem decanta et evaporationes, crystallisationesque repete, quamdiù crystalli purissimas et prismaticas exhibeat.

### SULPHURIS PURIFICATIO.

(*Flores Sulphuris.*)

R̄. Sulphuris Q. V.

Tere, mitte in ollam fictilem colli longioris et capitello vitreo cum rostro instructam. Sublima, identidem capitellum renova et Flores collige, donec tota Sulphuris quantitas, relictis in fundo faecibus, florum formâ ascenderit, quos cum Aqua distillata lavatos ac siccos ad usum repone.

*Dosis ò semiscrupulo ad semidrachmam.*

---



## C A P U T I V.

### P U L V E R E S,

#### PULVIS SANGUINIS DRACONIS DENTIFRICUS.

*(Dentifricium siccum.)*

℞. Tartratis aciduli Potassae, } ana unciam se-  
Sanguinis Draconis, } mis,  
Cornu Cervi usti. . . }  
Radicis Iridis Florentinae drachmas duas,  
Caryophyllorum Aromaticorum drachmam  
unam,  
Coccinellae scrupulum semis.

Fiat pulvis subtilissimus S. A.

#### PULVIS HYPECACUANAE OPIATUS.

*(Doveri.)*

℞. Sulphatis Potassae unciam unam,  
Nitratis Potassae unciam unam et semis,  
Radicis Hypecacuanae, } ana drachmas duas.  
Opium purificati. }

Omnia seorsim pulverata in mortario lapideo exactè misce.

*In singulis scrupulis continet Opium grana duo.*

*Dosis ad scrupulum.*

#### PULVIS JALAPPAE COMPOSITUS.

℞. Pulveris Radicis Jalappae, } ana partes ae-  
Tartratis aciduli Potassae, } quales.  
Magnesiae purae. }

Tere simul diutissimè, ut optimè permisceantur.

*Dosis à drachma ad sesquidrachmam.*

### PULVIS CUPRESSI RESTRICTIVUS.

℞. Boli Armenicae drachmas duas,

Radiciſ Bistortae.

Rosarum Rubrarum,

Fructuum Myrti,

Cupressi,

Sulphatis Zinci,

Thuris. . . . .

} ana unciam unam.

Fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Usus externus.*

### PULVIS SCAMMONII ANTIMONIALIS.

(*Cornachinus.*)

℞. Scammonii electi,

Oxydi Antimonii Albi usualis,

Tartratis aciduli Potassae.

} ana partes  
aequales.

Seorsim pulverata misce S. A.

*Dosis ad drachmam.*

### PULVIS SCAMMONII CATHOLICUS.

℞. Scammonii electi semiunciam,

Radiciſ Mechoacannae,

Jalappae.

} ana drachmas sex,

Tartratis Potassae drachmas tres.

Seorsim pulverata misceantur omnia et  
serventur ad usum.

*Dosis ad scrupulos duos.*

## PULVIS PAEONIAE COMPOSITUS.

*(De Gutteta.)*

℞. Radicis Paeoniae unciam unam et semis,  
 Contrayerbae, }  
 Ligni Visci Quercini. } ana drachmas sex,  
 Rasurae Eboris, . . . }  
 Cornu Cervi, }  
 Ungulae Alcis, } ana drachmam  
 Cranii Humani, } unam et semis.  
 Corallii Rubri laevigati, }  
 Hyacinthorum laevigatorum, }  
 Lapidis Bezoar Occidentalis, }

Fiat omnium pulvis subtilissimus S. A.

*Dosis ad drachmam unam.*

N. B. Pro pulveribus Imperialibus, Epilepticis, Marchionis, Cachecticis, Lapidis Cordialis de Goa et è Kelis Cancrorum deservire possunt.

## PULVIS QUINAE ANTISEPTICUS.

*(Bezoardicus Curvi.)*

℞. Radicis Contrayerbae, }  
 Carlinae, }  
 Tormentillae, } ana drachmas  
 Dictamni Albi, } duas,  
 Florum Papaveris Rubri, }  
 Foliorum Scordii, }  
 Cardui Benedicti, }

Oxydi Antimonii Albi usualis,	} ana drachm. unam.
Margaritarum laevigatarum,	
Rasurae Cornu Cervi,	
Oculorum Cancrorum laeviga-	
torum,	
Lapidis Cananor,	}
Bezoar Occidentalis,	
Cordialis de Goa.	

Quinae optimae Peruvanae uncias duas.

Fiat pulvis subtilissimus S. A.

*Dosis ad drachmam per horas reiteranda.*

## C A P U T V.

### S U C C I.

#### SUCCUS AGRESTAE, SEU OMPHACIUM.

R̄. Uvas acerbas: pistillo contere in mortario porphyretico, vel potius inter assulas ligneas confrica, ut succus omnis stillet, quem per manicam colatum defaeca, et decantatum in vase vitreo, cerâ obturato, aut pauxillo Olei Olivarum superaffuso repone.

Nota. 1.<sup>o</sup> Omnes succos, qui admiscendi sint Unguentis, vel Emplastris, defaecatione non indigere. 2.<sup>o</sup> Plantas aridas decocto earundem irrorandas. 3.<sup>o</sup> Omnes succos acidos vitium contrahere in vasis metallicis, seu

fictilibus crustâ tantum semivitrificatâ obductis.

### SUCCUS FRUCTUUM GRANATORUM.

℞. Granata Acida: à corticibus exterioribus mundata et transversim secta spathulâ lignâ concute, ut grana à pelliculis separata concidant: in mortario porphyretico contere, in linteum immitte, et succum expressum per subsidentiam purifica.

### SUCCUS LIMONUM.

℞. Limones: à corticibus carnosus separa, medullam succosam à seminibus repurgatam fortiter exprime, per linteum cola et succum per subsidentiam defaeca.

Eadem ratione exprimitur Succus

*Fructuum Aurantiorum,*

*Citreorum et similia.*

### SUCCUS MORORUM.

℞. Fructus Mororum: succum extrahe, per setaceum cola et per subsidentiam purifica.

Eodem modo extrahitur Succus è fructibus

*Grossulariae,*

*Rubi Idaei et similia.*

### SUCCUS EX CAULIBVS ET FOLIIS.

℞. Caules et Folia recentia probè mundata: in mortario lapideo pinsito in massam, quam in vase terreo vitreato per aliquot horas, si opus fuerit, relinque, ut succus coadunetur; et antequam fermentescat, torculari exprime.



—Succum expressum levi ebullitione clarifica,  
ut faecula secedat et cola.

Sic extrahuntur Succi

*Fumariae,*

*Cichorii et similia.*

### SUCCUS EX FLORIBUS.

R. Flores à calycibus mundatos: in mortario  
marmoreo pinsito et prelo exprime: succum  
in vase idoneo loco frigido, ne fermentescat,  
repone, ut per subsidentiam clarescat et per  
decantationem separa.

Hoc modo extrahitur Succus.

*Violarum,*

*Rosarum et similia.*

### SUCCUS EX FRUCTIBUS ET RADICIBUS CARNOSIS.

R. Fructus, seu Radices: radulâ detere, per  
expressionem succum elice, per subsidentiam  
clarifica et per inclinationem separa.

Hoc modo extrahitur Succus

*Pomorum,*

*Cydoniorum immaturorum,*

*Radicis Bryoniae,*

*Cucumeris Agrestis et similia.*

---

## C A P U T V I.

### I N S P I S S A M E N T A.

#### INSPISSAMENTUM CUCUMERIS AGRESTIS.

(*Elaterium*)

R̄. Fructûs Cucumeris Agrestis recentis Q. V.

Io mortario marmoreo conquassa, succum prelo exprime et per subsidentiam defaeca; postea lento igne balneo aquoso vapora ad mellis spissioris consistentiam et ad usum serva.

*Dosis ad drachmam.*

Simili modo parantur Inspissamenta

Urticarum,	} ex Foliis et Caulibus;
Taraxaci,	
Chelidonii,	
Cichorii,	
Pulsatillae,	
Cicutae,	
Aconiti.	

*Glycyrrhizae ex Radicibus,*

addendo, si opus fuerit, Aquae pauxillum.

N. B. Huc subjiciuntur Inspissamenta sequentia:

*Terra Japonica,*

*Acacia Aegyptiaca,*

*Opium,*



**EMULSIO PURGANS, SEU EMULSIO CUM  
MANNA.**

**R.** Emulsionis Communis non edulcoratae un-  
cias sex,

Mannae uncias tres.

Ignē lento dissolve et cola; tunc adde  
Aquae Cinnamomi Lacticinosae drachmam  
unam.

*Pro dosi unica.*

**EMULSIO GUMMI AMMONIACI.**

*(Brunneri)*

Vide *MIXTURAE*.

---

**C A P U T V I I I .****I N F U S I O N E S .****I N F U S U M R O S A R U M P A L L I D A R U M .**

**R.** Petalorum 'Rosarum Pallidarum recentium  
libras sex.

Aquae bullientis libras duodecim.

Infunde per horas octo in vase fictili vi-  
treato. Liquorem colatum, expressum et  
defaecatum, superaffuso Olei Olivarum pau-  
xillo, in lagenis vitreis angustioris colli  
serva pro Syrupo Rosarum Pallidarum, si  
fortè illum extempore conficere tenearis.

Simili modo parantur Infusa

*Petalorum Mali Persici,*

*Rosarium Rubrarum,*

*Paeoniae et similium.*

### INFUSUM ROSARUM RUBRARUM.

(*Tinctura Aquosa Rosarum Rubrarum.*)

℞. Petalorum Rosarum Rubrarum exungulatarum et siccarum unciam semis,

Aquae ferventis libras tres.

Infunde in vase fictili crustâ vitri lactei coloris obducto per horae quadrantem addendo

Acidi Sulphurici Aquosi scrupulum unum.

Cola.

N. B. Hic subjiciuntur Infusa Alkoholica, Vinosa et Acetosa, de quibus sub nomine generico TINCTURAE ALKOHOLICAE, VINA ET ACETA singulatim agemus.

## C A P U T I X.

### J U S C U L A.

#### JUSCULUM PULLI GALLINACEI LIENTERICUM.

(*Valentinum.*)

℞. Pullum Gallinaceum deplumem et exenteratum, capite ac cruribus rejectis. Farciatur usque ad mediatarem Rosis Rubris siccis;



adde Trochiscorum Ramich pulveratorum  
drachmas tres,  
Cariei Ligni Siliquae drachmam unam.

Repleatur eisdem Rosis siccis reliquum  
cavitatis et consuatur. Coque in olla fictili  
vitreata cum duodecim libris Aquae ad li-  
bras octo: tunc Pullum extrahe; et Jusculum  
adhuc calens exhibe, quod in domo Aegroti  
igni admoveatur, ne calorum inter utendum  
amittat.

*Dosis ab unciiis quatuor ad sex, saepius ite-  
randa.*

### JUSCULUM VIPERAE.

℞. Viperam recens praeparatam: seca in par-  
tes et adde  
Scobis Santali Rubri drachmam semis,  
Aquae uncias sex.

Coque balneo arenae in matraccio vitreo  
per quadrihorium. Cola.

## C A P U T X.

### DECOCTIONES.

DECOCTUM CORNU CERVI GUMMOSUM.

(Album.)

℞. Cornu Cervi usti et laevigati drachmas duas,

Gummi Arabici, seu	}	singulorum unciam semis,
Communis		
pulverati,		
Sacchari albi. . .		

Aquae libram unam et semis.

Coque, assiduè agitando, ad libram unam.

Traice per setaceum.

*Dosis ab unciis duabus ad uncias quatuor,  
aut plures, saepius iteranda.*

### DECOCTUM CORNU CERVI GUMMOSUM TENUIUS.

(*Album Tenuius.*)

R̄. Cornu Cervi usti et laevigati unciam semis,  
Gummi Arabici, seu Communis unciam unam,  
Sacchari uncias duas,  
Aquae libras quatuor.

Coque leviter et cola.

### DECOCTUM CORNU CERVI CUM MICA PANIS.

(*Album Sydenhami.*)

R̄. Cornu Cervi usti et laevigati semiunciam,  
Micae Panis albissimi uncias duas,  
Aquae libras sex.

Coque leviter, cola et dulcora cum Sy-  
rupi Simplicis unciis quatuor; postea adde,  
si libuerit,

Aquae Naphae, vel Cinnamomi Lacticinosae  
drachmas duas.

*Dosis ad uncias quatuor.*

## DECOCTUM CHAMAEDRYOS AMARUM.

Rx. Summitatum Chamaedryos unciam semis,  
 Absinthii, . . . } ana drach-  
 Centaurii minoris } mas duas,  
 Aquae libras quatuor.

Coque ad dimidias, addendo sub finem  
 coctionis

Florum Chamomillae drachmas duas,  
 Sennae Hispanicae unciam unam et semis.

Cola ad usum.

*Nonnumquam sine purgante praescribitur.*

*Dosis ab unciis quatuor ad sex.*

## DECOCTUM VERBASCI ANODYNUM.

(*Fotus Anodynus.*)

Rx. Foliorum Verbasci, }  
 Malvae. } ana unciam unam et sem.

Seminum Lini uncias duas,  
 Fructuum Papaveris Albi drachmam unam,  
 Aquae libras quatuor.

Coque per quadrantem horae et sine co-  
 latura ad usum porrige.

## DECOCTUM QUINAE ANTISEPTICUM.

Rx. Radicis Viperinae in taleolas sectae unciam  
 unam.

Seminum Citrei contusorum drachmas duas.

Coque in Aquae libris sex ad libras  
 quatuor. Decocto colato et calenti infunde  
 in vase clauso per quadrihorium.

Corticis Peruviani crassiusculè pulverati un-  
 cias duas,

Radicis Contrayerbae tritae unciam unam.

Iterum cola et adde

Mellis Sambuci uncias tres.

*Dosis ab unciis duabus ad uncias quatuor.*

## DECOCTUM QUINAE ANTISEPTICUM

### PURGANS.

℞. Decocti praedicti et calentis absque Melle  
Sambuci libras quatuor,

Foliorum Sennae Hispanicae unciam unam

Infunde per quadrihorium in vase clau-  
so, cola et adde

Mellis Sambuci, . . . . } ana uncias duas.  
Syrupi Rosarum Pallidarum. }

*Dosis ab unciis duabus ad uncias quatuor.*

## DECOCTUM SCORZONERAE BEZO-

### ARDICUM.

(*Bezoardicum Curvi incompletum.*)

℞. Radicis Viperinae in taleolas sectae unciam  
unam,

Seminis Citrei, aut Limonum contusi drach-  
mas duas,

Aquae libras sex.

Coque S. A. ad remanentiam librarum  
quatuor; postea cola et adde

Pulveris Quinae Bezoardici unciam semis,

Mellis Sambuci uncias tres.

*Dosis ad uncias quatuor.*



# DECOCTUM SCORZONERAE BEZOARDICUM SOLUTIVUM.

(*Bezoardicum Curvi completum, seu purgans.*)

℞. Decocti praedicti libras quatuor,  
Foliorum Sennae mundatae unciam semis.

Levi ebullitione coque, cola et adde

Syrupi Rosarum Pallidarum uncias sex,  
Pulveris Quinae Bezoardici unciam semis.

*Dosis ad uncias quatuor.*

# DECOCTUM GRAMINIS COMPOSITUM.

(*Aperiens.*)

℞. Radicis Graminis, . . . } ana unciam semis.  
Rubiae. . . . }

Contusas coque in Aquae libris tribus ad  
libras duas, sub finem addendo

Glycyrrhizae rasae et contusae drachmam  
unam.

In colatura dissolve

Nitratis Potassae purificati drachmam unam.

# DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

(*Pectorale.*)

℞. Seminum Hordei mundatorum unciam semis,  
Aquae libras tres.

Coque ad libras duas. Sub finem coctio-  
nis adde

Hederae terrestris exsiccatae drachmas duas,

Glycyrrhizae rasae et con- } ana drachmam  
tusae, . . . . }

Florum Papaveris Rubri. } unam et semis.



Cola ad usum.

*Dosis ab unciis tribus ad uncias sex.*

### DECOCTUM JUJUBARUM PECTORALE.

℞. Seminis Hordei mundati unciam unam,  
 Jujubarum num. duodecim,  
 Caricarum Pinguium num. sex,  
 Passularum mundatarum, } ana semiun-  
 Glycyrrhizae rasae et contusae } ciam,  
 Capilli Veneris unciam semis,  
 Aquae libras tres.

Coque S. A. ad libras duas et cola.

*Dosis ad uncias sex.*

### DECOCTUM LIGNI CAMPECHIANI.

℞. Scobis Ligni Campechiani unciam unam.  
 Praemissa digestionem S. A. coque in Aquae  
 libris quatuor ad libras duas. Cola.

*Dosis ab unciis quatuor ad octo.*

### DECOCTUM POLYGALAE.

℞. Herbae Polygalae unciam unam.

Coque in S. Q. Aquae ad libras duas et  
 cola.

*Dosis ab unciis quatuor ad sex, saepius  
 iteranda.*

### DECOCTUM CARBONATIS POTASSAE ABSINTHII.

(*Febrifugum Salsum.*)

℞. Carbonatis Potassae Absinthii drachmam  
 unam,

Mellis optimi uncias quatuor,  
Aquae libras duas.

Coque ad despumationem in vase fictili vitreato. Cola.

*Dosis ab unciis tribus ad sex, saepius iteranda.*

## DECOCTUM LIGNI GUAJACI COMPOSITUM.

*(Lignorum.)*

℞. Scobis Ligni Guajaci,  
Radici Sarsaeparrillaemi. } ana uncias duas,  
nutim sectae. . . }

Aquae libras octo.

Digere per duodecim horas vase clauso et coque leni igne ad libras quatuor, addendo sub finem

Scobis Ligni Sassafras unciam unam,  
Glycyrrhizae rasae et contusae drachmam unam.

Cola et per subsidentiam defaeca.

*Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.*

## DECOCTUM SARSAEPARRILLAE EX CALLAC.

*(Ptisana ex Callac.)*

℞. Radici Sarsaparrillae incisae uncias duas,  
Muriatis Hydrargyri sublimati (*dulcis*) laevigati et in petia ligati drachmas duas,  
Aquae libras quindecim.

Coque in vase terreo vitreato ad remanentiam tertiae partis; postea adde

Foliorum Sennae mundatae unciam unam,  
Seminis Coriandri contusi drachmas sex,

Codex medic. Europ. Sect. VI. p. I.

G

Sulphatis Aluminae drachmam semis.

Iterum coque per horae quadrantem, ab igne separa et post semirefrigerationem cola ad usum.

*Dosis ad uncias sex.*

### DECOCTUM SARSAEPARRILLAE EDULCORANS.

R̄. Radicis Sarsaeparril. incisae, }  
          Chinae contusae.    } ana uncias duas,

Scobis Santali Rubri drachmas sex,

Cornu Cervi sesquiunciam,

Digere per viginti quatuor horas et coque in Aquae libris duodecim ad libras sex, sub finem addendo

Scobis Santali Citrini drachmas sex,

Sacchari uncias sex.

Cola ad usum.

*Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.*

### DECOCTUM FRUCTUUM JUNIPERI CARMINATIVUM.

*(Folus Carminativus.)*

R̄. Fructuum Juniperi,        }  
    Seminum Anisi,            }  
    Muriatis Ammoniaci.      } ana unciam unam,

Florum Chamomillae uncias duas.

Contusa bulliant leviter in Aquae libris quatuor. Colaturae adde  
Alkoholis Vini libram unam.

# DECOCTUM RADICIS ALTHAEAE EMOLLIENS.

℞. Radicis Althaeae sectae, }  
 Foliorum recentium Mal- } ana unciam unam.  
 vae. . . . . }

Coque in Aquae libris duabus ad libram unam. Cola calidè.

# DECOCTUM MALVARUM CARMINATIVUM.

(*Carminativo-emolliens.*)

℞. Decocti praedicti libram unam,  
 Seminum Anisi contusorum drachmam unam,  
 Florum Chamomillae drachmas duas.  
 Bulliant leviter et cola tepidè.

# DECOCTUM MANNAE LAXATIVUM.

(*Potio Laxativa.*)

℞. Mannae uncias duas,  
 Foliorum Sennae Hispanicae drachmas sex,  
 Sulphatis Magnesiaae drachmas duas,  
 Aquae uncias quatuordecim.

Coque leviter ad libram unam, clarifica, si praescriptum fuerit, et cola.

*Dosis ab unciis sex ad octo.*

# DECOCTUM MANNAE PURGANS.

(*Potio Angelica.*)

℞. Aquae uncias octo.

Cum albumine ovi agita. Adde  
 Foliorum Sennae Hispanicae drachmas tres,  
 Mannae uncias tres,  
 Tartratis Potassae aciduli drachmam unam.

In vase idoneo dissolve et levi ebullitione clarifica. Dein pluries cola per manicam, donec liquor diaphanus transmittatur. Adde Aquae Cinnamomi scrupulum unum.

*Pro unica dosi.*

## DECOCTUM MANNAE CARMINATIVUM.

*(Ptisana Anticolica.)*

℞. Mannae uncias quatuor,  
Foliorum Sennae mundatae unciam unam,  
Tartratis Potassae,                    }  
Seminis Anisi contusi.               } ana unciam semis,  
Aquaе libras quatuor.

In vase terreo vitreato digerantur per semihoram, postea coque paulisper et cola

*Dosis ad uncias sex.*

## DECOCTUM RHABARBARI.

*(Anima Rhabarbari.)*

℞. Radicis Rhabarbari contusae drachmas duas,  
Aquaе uncias octo.

Post levem ebullitionem cola.

*Pro unica dosi.*

## C A P U T. XI.

### E X T R A C T A.

## EXTRACTUM CICHORII.

℞. Foliorum Cichorii. ℞. V.



Coque in Q. S. Aquae. Cola, leni igne vapore et sub finem balneo aquoso, spathulâ continenter agitando, vaporare perge ad soliditatem et S. A. repone.

Hoc modo fit Extractum

*Taraxaci,*

*Absynthii,*

*Boraginis,*

*Cardui Benedicti,*

*Centaurii Minoris et similium.*

### EXTRACTUM FRUCTUUM JUNIPERI.

R̄. Fructuum Juniperi libras quatuor.

Contusos infunde per biduum, vel tri-  
duum in Aquae ferventis libris duodecim.  
Coque ad mollitiem. Liquorem expressum,  
et per subsidentiam defaecatum, cola et va-  
pora in balneo aquoso ad Extracti consi-  
stentiam.

*Dosis à drachma ad drachmas tres.*

Eodem modo fit Extractum

*Siliquarum et similium.*

### EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI.

R̄. Quinae Peruvanae pulveratae libram unam.

Infunde per biduum in Aquae libris duo-  
decim, balneo aquoso, vel leni calore, sae-  
pius agitando. Infusiones cum novis Aquae  
quantitatibus repete, donec liquores insipidi  
percipiantur; quos omnes filtratos vapore in  
vase aeneo, stanno obducto et sub finem in  
balneo aquoso ad Extracti solidi consistentiam.

*Dosis à scrupula ad drachmas duas.*

Simili modo fit Extractum

*Ratanhiae et similitum.*

### EXTRACTUM GLYCYRRHIZAE.

**R.** Radicum Glycyrrhizae siccarum, ab epidermide mundatarum et minutim incisarum libras quatuor,

Aquae ferventis libras sexdecim.

Infunde per horas duodecim. Liquorem colatum et decantatum vapore, sub finem in balneo aquoso, ad Extracti solidi consistentiam.

*Dosis à semidrachma ad drachmam.*

### EXTRACTUM RHABARBARI.

**R.** Radicis Rhabarbari electi, minutim secti libram unam,

In olla fictili vitreata maceretur per dies tres in Aquae libris sexdecim; postea levi ebullitione coque et cola sine expressione; dein igne lento decoctum per subsidentiam depuratum vapore ad Syrupi consistentiam, spathulâ ligneâ continuè agitando; postea balneo aquoso inspissa, donec manibus malaxari possit Emplastri instar et in rotulas ad usum serva.

*Dosis ad scrupulos duos.*

Sic parantur Extracta sequentia

*Croci,*

*Sennae et similitum.*

## EXTRACTUM OPII AQUOSUM.

*(Laudanum Simplex.)*

℞. Opii minutim secti uncias quatuor.

Tere in mortario marmoreo, per vices addendo Aquae frigidae sufficientem quantitatem et digere loco calido ad perfectam partis extractivae dissolutionem. Liquorem collatum vapore in balneo aquoso ad siccitatem.

*Dosis ad grana duo,*

## EXTRACTUM OPII GLYCYRRHIZATUM.

*(Laudanum Urinarium.)*

℞. Extracti Glycyrrhizae uncias tres,

Camphorae drachmas duas,

Crocī scrupulos octo,

Alkekengi, . . .

Terebinthinae Abietis

Gummi Tragacanthi,

Resinae Mastiches.

} ana unciam unam,

} ana drachmam unam

Extracti aquosi Opii unciam semis.

Extracta in mortario cum pauxillo Aquae diluantur, ut fiat liquamentum mellis instar; dein adde Terebinthinam et pistetur ad perfectam mixtionem; postea caetera pulverata misceantur ut fiat massa, è qua formentur Trochisci, qui siccentur et ad usum servantur.

*Dosis ad scrupulum.*

## EXTRACTUM OPII CROCATUM.

*(Laudanum Opiatum)*

℞. Extracti Opii aquosi uncias duas,

Crocī unciam unam,

Testarum Margaritarum,	} ana drachmam
Lapidum Hyacinthorum,	
Coralliorum. . . . .	

	} unam et semis,

Terrae Sigillatae drachmam unam,  
Lapidis Bezoar scrupulos quatuor,  
Scobis Cornu Cervi scrupulos duos.

Omnia subtiliter pulverentur et cum Aquae  
pauillo fiant Trochisci, qui siccentur ad usum.

*Dosis ad grana quatuor.*

### EXTRACTUM OPII CINNABARINUM.

*(Laudanum Cinnabarinum.)*

Rx. Extracti Opii aquosi drachmas sex,  
Crocī pulverati, . . . . . } ana drachmas  
Cinnabaris Nativae laevigatae } tres.

Fiat massa cum Aquae pauillo, in rotulas  
sicca et ad usum serva.

### EXTRACTUM SARSAEPARRILLAE.

Rx. Radicis Sarsaparillae fissae et minutim se-  
ctae libras duas,  
Aquae libras viginti..

Infunde in olla fictili vitreata per vigin-  
tiquatuor horas loco calido; postea coque  
per horas duas et cola; residuo adde novam  
Aquae quantitatem, coque ut antea ad libras  
octo et cola; colaturas per subsidentiam de-  
pura et decanta; postea vapora ut in Extracto  
Radicis Rhabarbari dictum est.

*Dosis ad drachmas duas.*

Sic parantur sequentia Extracta

*Ligni Guajaci,*

*Radicis Tormentillae,*  
*Bistortae,*  
*Valerianae,*  
*Helenii,*  
*Gentianae et similia.*

### EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis Hellebori Nigri contusae libram unam,

Aquae ferventis libras octo,  
 Alcoholis Vini uncias quatuor.

Digere per horas duodecim, postea coque per horas duas leni igne in vase optimè clauso; semirefrigeratum decoctum cola deinceps cum expressione, depuratumque per subsidentiam vapora et procede ut supra.

Sic parantur sequentia Extracta

*Agarici,*  
*Colocynthis et similia.*

### EXTRACTUM AGARICI ALOETICUM.

(*Extractum Catholicum.*)

R. Extracti Hellebori Nigri, } ana unciam unam,  
       Agarici. . . }  
       Colocynthis drachmas sex,

Scamonii pulverati unciam unam,  
 Aloes Succotrinae pulveratae uncias duas,  
 Sulphatis Magnesia unciam semis,  
 Aquae Q. S.

Pistentur Extracta in mortario, ut fiat massa mollis; tunc adde Pulveres et ex om-



nibus perfectè mixtis formentur Trochisci,  
qui siccentur ad usum.

*Dosis ad semidrachmam.*

## C A P U T · X I I .

### G E L A T I N A E .

#### GELATINA CORNU CERVI.

℞. Scobis Cornu Cervi albissimae et lotae li-  
bram semis,

Aquae libras quatuor.

Coque in vase fictili vitreato, donec tra-  
ctatus liquor digitis adhaereat. Unicuique li-  
brae liquoris colati cum expressione adde  
Sacchari albi unciam unam et semis,

Tartratis aciduli Potassae scrupulum unum.

Clarifica cum albumine Ovi.

#### GELATINA FRUCTUUM GROSSULARIAE.

℞. Sacchari clarificati et ad soliditatem cocti li-  
bras duas,

Succi Fructuum Grossu-	} ana libram unam.
lariae recenter expressi,	
Aquae. . . . .	

Coque ad Gelatinae spissitudinem et cola.  
Eodem modo fit Gelatina

*Fructuum Rubi Idaei,  
Cydoniorum,  
Fragariae et similia.*

---

## CAPUT XIII.

## MEL L L A.

## MEL FRUCTUUM MORORUM.

R̄. Succi Mororum nigrorum libram unam,  
Mellis libras duas,  
Aquae Q. S.

Coque in vase figulino crustâ vitri lactei  
coloris obducto ad Syrupi spissioris densita-  
tem et cola.

*Dosis ab uncia ad uncias duas.*

## MEL ROSARUM RUBRARUM.

(*Rhodomel.*)

R̄. Succi Rosarum Rubrarum, } ana libras duas.  
Mellis optimi. . . . }  
Aquae Q. S.

Coque ad Syrupi spissitudinem. Cola.

## MEL FRUCTUUM SAMBUCCI.

R̄. Succi Fructuum maturorum Sambuci libram  
unam,  
Mellis libras duas,  
Aquae Q. V.

Coque ad Syrupi spissioris densitatem et cola ad usum.

*Dosis à semuncia ad unciam.*

### MEL ACETI.

*(Oxymel Simplex.)*

℞. Mellis optimi libras quatuor,  
Aceti Albi optimi filtrati libras duas.

Dissolve in vase figulino crustâ vitri lactei coloris obducto, igne lento vapore ad despumationem debitamque consistentiam et cola.

*Dosis ab uncia ad uncias tres.*

### MEL ACETI SCYLLAE.

*(Oxymel Scylliticum.)*

℞. Aceti Scyllae recentis libras duas,  
Mellis optimi libras quatuor.

In vase figulino vitri lactei coloris crustâ obducto, balneo aquoso, dissolve et cola.

*Dosis à semuncia ad unciam.*

Simili modo fit Mel

*Aceti Colchici.*

### MEL DEPURATUM.

℞. Mellis optimi Q. V.

Coque in Aquae Q. S. ad despumationem et Syrupi consistentiam; postea cola et ad usum serva.

## CAPUT XIV.

### SYRUP I.

#### SYRUPUS SIMPLEX, SEU SACCHARUM CLARIFICATUM.

℞. Sacchari albi libras duas,  
Aquae libras quatuor.

Cum Albumine Ovi in Aqua agitato clarifica, vapore ad debitam spissitatem et cola.

#### SYRUPUS ACETI.

℞. Aceti Albi optimi libram unam,  
Sacchari albissimi pulverati libras duas.

Misce in vase fictili crustâ vitri lactei coloris obducto, et igne lento, vel balneo aquoso Saccharum dissolve.

Eodem modo fit Syrupus

*Succi Agrestae,*

*Cydoniorum,*

*Pomorum Redolentium et similia.*

#### SYRUPUS GRANATORUM.

℞. Succi Granatorum depurati libras duas et uncias duas,

Sacchari albissimi pulverati libras quatuor.

Fiat Syrupus ut supra.

Sic parantur Syrupi Fructuum

*Grossulariae,*

*Myrtilli,*

*Limonum et similia.*

### SYRUPUS CORTICUM CITREI.

R̄. Aquae Corticum Citrei Lacticinosae libram unam,

Sacchari clarificati ad soliditatem cocti libras duas.

Misce leni calore et cola.

### SYRUPUS CORTICUM CITREI AMARUS.

R̄. Aquae Corticum Citrei libram unam,

Flavedinis Corticum Citrei recentium uncias quatuor.

Digere per horas duas in matraccio obturato et cola, tunc sume

Sacchari clarificati ad soliditatem cocti libras duas.

Misce leni calore et cola.

Sic paratur Syrupus Amarus

*Corticum Aurantiorum.*

### SYRUPUS COCHLEARIAE.

R̄. Succu defaecati Cochleariae, aut Lepidii libram semis.

Misce cum Sacchari clarificati et ad debitam spissitudinem cocti libra una. Cola.

*Dosis ab uncia ad unciam et semis.*

### SYRUPUS PETALORUM VIOLARUM.

*(Caeruleus.)*

R̄. Petalor. Flor. Violarum recentium libr. unam.

Affunde in vase stanni



Aquae ferventis libras duas.

Post horas octo cola et exprime. In colatura dissolve igne lento, aut balneo aquoso Sacchari albissimi pulverati libras quatuor.

Eodem modo fit Syrupus

*Florum Papaveris Rhoeados,*

*Caryophylli Hortensis et simi-  
lium.*

### SYRUPUS VIOLARUM COMMUNIS.

℞. Florum Violarum recentium libram unam,  
Aquae ferventis libras quatuor.

Infunde per quadrihorium, et statim cum expressione cola: in colatura dissolve

Sacchari albi libras sex. Fiat Syrupus S. A.

Simili modo paratur Syrupus

*Florum Nymphaeae.*

### SYRUPUS ERYSIMI COMPOSITUS.

℞. Erysimi floridi uncias tres,  
Folior. recentium Boraginis, }  
Capilli Veneris. . . . . } ana unc. duas,  
Summitatum Rorismarini unciam unam.

Coque in Aqua ad libras sex, cola et dissolve

Sacchari libras tres,

Mellis libram unam.

Clarifica, coque in Syrupum crassiorem et adde

Succi Erysimi uncias sex. Cola.

*Dosis à semuncia ad unc. duas, saepius iteranda.*

## SYRUPUS HEDERAE TERRESTRIS.

R<sub>x</sub>. Folior. Hederæ terrestris siccor. uncias duas.

Infunde in Aquæ libris duabus. Colaturæ adde

Sacchari clarificati et ad soliditatem cocti libras quatuor. Fiat Syrupus et cola.

Simili modo fiunt Syrupi

*Scordii,*

*Capilli Veneris,*

*Prassii Albi, seu Marrubii,*

*Artemisiae,*

*Hyssopi,*

*Menthae et similia.*

## SYRUPUS ROSARUM RUBRARUM.

(*Rhodosaccharum.*)

R<sub>x</sub>. Succī defaecati Rosarum Rubrarum libras duas,

Sacchari albi libras quatuor,

Aquæ Q. S.

Coque in Syrupum S. A.

*Dosis ad uncias duas.*

## SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM.

R<sub>x</sub>. Petalorum Rosarum Pallidarum recentium libras tres,

Aquæ ferventis libras sex.

Infunde per horss duodecim. Cola et exprime. In colatura dissolve

Sacchari albi libras duas.

Clarifica et coque in Syrupum.

*Dosis ab uncia ad uncias duas.*

## SYRUPUS CICHORII SIMPLEX.

R̄. Succī recentis Cichorii, }  
 Sacchari albi. . . . . } ana libras quatuor,  
 Aquae Q. S.

Clarifica et coque in Syrupum.

*Dosis ad uncias duas.*

Simili modo parantur Syrupi

*Fumariae,*

*Urticarum,*

*Plantaginis,*

*Boraginis et similibus.*

## SYRUPUS CICHORII CUM RHABARBARO.

R̄. Herbae Cichorii recentis uncias quatuor,  
 Aquae libras quatuor.

Coque ad tertiae partis consumptionem,  
 sub finem addendo

Rhabbarbari electi, minutim incisi, uncias  
 quatuor.

Colaturae cum expressione adde

Sacchari libras quatuor.

Clarifica et coque in Syrupum.

*Dosis à semuncia ad uncias duas.*

## SYRUPUS CARTHAMI SOLUTIVUS.

(*Comitis.*)

R̄. Seminum Carthami contusorum uncias qua-  
 tuor.

Coque in Aquae libris sex ad libras qua-  
 tuor, sub finem addendo

Foliorum Sennae Hispanicae uncias quatuor,  
 Seminis Anisi semunciam.

Codex medic. Europ. VI. p. I.

H

Colaturae adde

Sacchari albi libras duas.

Clarifica et coque in Syrupum.

*Dosis ab uncia ad unciam et semis.*

### SYRUPUS EXTRACTI OPII.

(*Meconii.*)

℞. Syrupi Simplicis libram unam,

Extracti Opii aquosi scrupulum unum.

Dissolve Extractum in Aquae unciis tribus, Syrupo permisce et leni igne ad debitam spissitudinem paululum coque.

*Dosis ad unciam.*

*In singulis unciis continet Extracti Opii grana duo.*

### SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

(*Diacodionis.*)

℞. Fructuum Papaveris Albi, absque seminibus, exsiccatorum et contusorum uncias sexdecim,

Aquae tepidae libras viginti.

Injiciantur in vase terreo vitreato et post horas duodecim coque ad tertiae partis remanentiam; cola cum forti expressione et adde

Sacchari albi libras quatuor,

Aquae Q. S.

Cum albuminibus Ovorum in Aquae agitata fiat Syrupus S. A.

## SYRUPUS CORALLII RUBRI.

R̄. Corallii Rubri laevigati uncias quatuor,  
Succi Granatorum Acidorum recenter ex-  
pressi libras duas.

Digere in matraccio vitreo per dies quatuor  
identidem agitando et decanta tincturam.

Tunc sūme

Fructuum Papaveris Albi, absque seminibus,  
siccatorum uncias duas,

Granorum Kermes drachmas sex,

Aquae libras tres.

Coque ad dimidias et cola cum forti ex-  
pressionē, tunc sūme

Sacchari albi libras sex,

Aquae Q. S.

Coque iterum ad Syrupi crassioris consi-  
stentiam, addendo in fine coctionis tincturam  
Corallii praedictam prius per manicam tra-  
jectam, aut filtratam.

*Dosis ad unciam unam.*

## SYRUPUS ALTHAEAE.

R̄. Radicum Althaeae recentium, lotarum et  
in taleolas sectarum uncias duas,

Coque in Aquae libris sex ad libras qua-  
tuor, addendo sub finem

Radici Glycyrrhizae radulâ mundatae et  
contusae unciam semis.

Colaturae adde

Sacchari albi libras duas.

Clarifica et coque in Syrupum.



Simili modo paratur Syrupus  
*Symphyti et similium.*

### SYRUPUS PAEONIAE.

R̄. Radicis Paeoniae contusae uncias duas.

Coque in Aquae libris sex ad libras quatuor.

Colaturae adde

Sacchari albi libras duas.

Clarifica et coque in Syrupum.

### SYRUPUS CHINAE COMPOSITUS.

(*Antirheumaticus.*)

R̄. Radicis Chinae contusae, . . .	} ana uncias
Sarsaeparrillae incisae. . .	
Scobis Ligni Guajaci, . . .	} ana unciam
Santali Rubri. . .	

Digere in vase terreo vitreato in Aquae  
libris duodecim per diem. Coque ad dimi-  
dias. In colatura dissolve.

Sacchari albi libras quatuor.

Clarifica et coque in Syrupum.

*Dosis ab uncia una ad tres.*

### SYRUPUS QUINAE.

(*Corticis Peruviani.*)

R̄. Quinae ex Loxa pulveratae uncias quatuor,

Vini Albi libras tres,

Alkoholis Vini uncias tres.

Digere in matraccio per viginti quatuor  
horas, et post refrigerationem cola et fil-  
tra, aut per manicam trajice et unicuique  
infusionis librae admisce leni igne

Sacchari albissimi pulverati, aut clarificati  
et ad soliditatem cocti libras duas.

*Dosis à semuncia ad uncias duas.*

### SYRUPUS APII COMPOSITUS.

(*De quinque Radicibus.*)

R̄. Radicum incisarum Apii, . .	} singulo- rum unci- as quatuor
Foeniculi,	
Petroselini,	
Rusci,	
Asparagi.	

Aquae libras quatuordecim.

Coquantur in vase terreo vitreato ad re-  
manentiam librarum octo; postea cola cum  
expressione et adde

Sacchari albi libras sex.

Clarifica et coque in Syrupum S. A. ad-  
dendo Aquae Q. S.

*Dosis ad uncias duas.*

## C A P U T X V.

### C O N S E R V A E.

#### CONSERVA PRUNORUM.

R̄. Prunorum Damascenorum Q. V.

Coque in Aqua ad mollitiem. Pulpam per  
setaceum equinum trajice et ad mellis con-  
sistentiam in balneo aquoso vapore. Hujus

Pulpae libris singulis admisce  
Sacchari albi pulverati libras duas.

### CONSERVA ROSARUM RUBRARUM.

℞. Petalorum Rosarum Rubrarum recentium,  
nondum penitus explicatorum et ab un-  
gulis mundatorum libram unam,  
Sacchari clarificati et ad Syrupi crassioris  
spissitatem cocti libras duas.

Contunde petala diligentissimè in mortario  
lapideo, Syrupo admisce et igne leni humi-  
ditatem ad debitam consistentiam vapore.

*Dosis à semuncia ad unciam et semis.*

Sic fit Conserva

*Violarum et similia.*

### CONSERVA HEDERAE TERRESTRIS.

℞. Foliorum Hederæ Terrestris recentium li-  
bram unam,

Sacchari albissimi pulverati libras duas.

Hederam in mortario marmoreo pinsito,  
addendo, si opus fuerit, Aquæ pauxillum  
ut fiat massa mollis et tenuissima: postea  
adde Saccharum fortiter contundendo et, ex-  
actè mixtis, serva ad usum.

*Dosis ad uncias duas.*

Simili modo fit Conserva

*Capilli Veneris et similia.*

### CONSERVA COCHLEARIAE.

℞. Foliorum Cochleariae recentium libras duas.

In mortario marmoreo pistillo ligneo con-

tundantur diligentissimè, ut fiat pasta mollis;  
postea adde

Sacchari albissimi pulverati libras quatuor,

Fiat omnium massa tenuissima, quae ad  
usum vase vitreo servetur et pauxillo Sac-  
chari albissimi pulverati conspergatur ne  
mucescat.

Simili modo parantur Conservae

*Lepidii,*

*Scordii et similium.*

N. B. Conservam Cochleariae, aut Lepi-  
dii pro Syrupo Scelotyrbico serva, si fortè  
illum ex tempore conficere tenearis.

---

## C A P U T X V I.

### ELECTUARIA ET CONFECTIOES.

#### ELECTUARIUM SENNAE COMPOSITUM.

(*Catholicum commune.*)

R̄. Radicis Polipodii mundatae et contusae un-  
cias sex.

Coque in Aquae libris decem ad molliti-  
em, addendo paulò ante finem

Foliorum Malvarum unciam unam.

In colatura dissolve

Mellis libras novem.

Fiat Syrupus crassior, cui admisce

Pulpae Prunorum libram unam et semis,  
 Pulveris Sennae Hispanicae libram unam,  
 Seminis Anisi uncias duas.

*Dosis à semuncia ad unciam.*

# ELECTUARIUM CASSIAE TAMARINDATUM.

*(Lenitivum.)*

℞. Pulpae Cassiae Fistulae recens extractae un-  
 cias octo,

Mannae uncias duas,

Pulpae Tamarindorum unciam unam,

Syrupi Rosarum Pallidarum uncias octo.

Mannam leni igne dissolve in Syrupo  
 Rosarum, Pulpas admisce et vapora conti-  
 nenter spathulâ ligneâ agitando ad debitam  
 spissitudinem.

*Dosis ab unciis duabus ad uncias quatuor.*

# ELECTUARIUM SCORDII OPIATUM.

*(Diascordium.)*

℞. Foliorum Scordii,

Petalorum Rosarum Ru- } ana drachmas sex,  
 brarum exungulorum }

Cinnamomi drachmas tres,

Boli Armenicae,

Mastiches,

Dictamni Cretici.

Radicis Tormentillae,

Gentianae,

Zingiberis,

Piperis Tabasci.

Opii drachmas duas,

} ana drachmam unam,

} ana drachmam unam,



Pulvera subtilissimè et misce cum Mellis  
Rosarum unciiis viginti quatuor.

*In singulis drachmis continet Opii duas tertias  
grani partes:*

*Dosis ad drachmas duas.*

### ELECTUARIUM THERIACALE.

R $\acute{y}$ . Radicis Valerianae silvestris,	}	ana libram unam,
Contrayerbae,		
Gentianae,		
Foliorum Scordii,		
Florum Chamomillae,		
Cinnamomi electi,		
Piperis Tabasci,		
Fructuum Juniperi,		
Flavedinis Aurantiorum,		
Seminum Anisi,		
Myrrhae. . . . .	}	
Quinae Loxae libras quatuor,		
Croci. . . . .	}	ana libram unam,
Sulphatis Ferriad albedi- nem exsiccati. . .		
Opii purissimi libras duas,		
Mellis Fructuum Sambuci libras sex,		
Mellis optimi libras quadraginta octo.		

Melli cum sufficienti Vini generosi quan-  
titate despumato, et Melli Fructuum Sam-  
buci mixtis, et paulum calefactis diligenter  
immisce Crocum et Sulphatem Ferri pul-  
verata, deinde Opium in Vino solutum; po-  
stremò sub continuâ agitatione sensim adde

caetera, prius commixta et in pulverem tenuem redacta.

*Dosis ad drachmam.*

*In singulis drachmis continet Opii grana duo.*

# ELECTUARIUM THERIACALE MAGNUM.

R<sup>x</sup>. Trochisc. Scylliticor. libras quadraginta octo,

Viperinorum,	} ana libras vigin-
Hedychroi,	
Piperis Longi. . . . .	
Opii electi. . . . .	

tiquatuor,

Petalor. Rosar. Rubrar. exungul.

Iridis Florentinae,

Succi Glycyrrhizae,

Seminis Buniadis,

Scordii,

Opobalsami, seù Balsami veri,

Cinnamomi,

Agarici.

} ana libras  
duodecim,

Myrrhae, . . . . .

Costi Arabici,

Croci,

Cassiae Ligneae,

Spicae Nardi,

Schoenanthi,

Thuris,

Piperis Albi,

Nigri,

Dictamni Cretici,

Marrubii,

Radiciis Rhapontici,

} ana libras sex,

Staechados,	} ana libras sex,
Petroselini Macedonici,	
Calaminthae Montanae,	
Terebinthinae optimae,	
Radicis Zingiberis,	
Pentaphylli	} ana libras quatuor,
Polii Montani, . . .	
Chamaepityos,	
Styracis Calamitae,	
Meu Athamantici,	
Amomi Racemosi,	
Acori Veri,	
Spicae Celticae,	
Terrae Lemniae,	
Radicis Valerianae,	
Chamaedryos,	
Malabathri,	
Sulphatis Ferri ad albe-	
dinem exsiccati,	
Radicis Gentianae,	
Seminis Anisi,	
Foeniculi,	
Ammios,	
Hypocystidis,	
Acaciae,	
Carpobalsami,	
Gummi Arabici,	
Cardamomi Minoris,	
Seseleos Massiliensis,	
Thlaspi,	

Hyperici,  
Sagapeni. } ana libras quatuor,

Radicis Aristolochiae Tenuis }  
Dauci Cretici, }  
Bituminis Judaici, }  
Opoponacis, } ana libras duas,  
Galbani, }  
Centaurii Minoris, }  
Castorei. . . . . }

Mellis praestantissimi triplum,

Vini optimi Q. S.

Conficitur solemnī ritu Matriti, in communibus opificii *Pharmaceuticorum Aedibus*, coram *Regali Collegio* legitimè congregato. Electuarium Theriacale Magnum privatim componere, nemini jus esto.

## ELECTUARIUM HYOSCYAMI OPIATUM,

(*Philonium Romanum.*)

R. Seminis Hyoscyami, }  
Anisi, }  
Foeniculi, } ana drachmas sex,  
Myrrhae, }  
Castorei. . . . . }

Opii drachmas quinque,

Cinnamomi unciam unam,

Croci drachmas duas,

Florum Chamomillae drachmas tres.

Fiat omnium pulvis subtilissimus et cum Mellis despumati libris duabus misce.

*Dosis à scrupulo ad scrupulos duos.*

*In singulis drachmis continet Opii granum unum et semis.*

## CONFECTIO SANTALORUM CORDIALIS.

*(Electuarium Cordiale.)*

R̄. Santali Citrini, . . .	} ana drachmam unam.
Rubri,	
Croci,	
Cinnamomi,	
Caryophyllorum Aromaticorum,	
Flavedinis Citrei.	

Subtilissimè pulverentur et cum sufficienti quantitate Syrupi Citrei misceantur ad Electuarii mollis spissitudinem.

*Dosis à drachma ad drachmas duas.*

## CONFECTIO QUINAE ANTIMONIALIS.

*(Electuarium Febrifugum.)*

R̄. Tartratis Potassae et Antimonii grana sex,  
Tartratis aciduli Potassae drachmas tres.

Misce et in mortario vitreo per semihoram tere. Deinde adde

Quinae Loxae pulveratae unciam unam,  
Syrupi Aceti uncias tres et semis.

*Dosis à drachmis duabus ad unciam semis.*

*In singulis unciis continet Tartratis Potassae et Antimonii granum circiter unum et semis.*



## CONFECTIO MARGARITARUM KERMESINA.

*(Confectio Alkermes.)*

℞. Margaritarum laevigatarum, } ana drach-  
 Lapidis Lazuli laevigati. } mas duas,  
 Pulveris Ligni Aloes, } ana drach-  
 Cinnamomi Manilensis } mas sex,  
 Syrupi Kermes recentis, ad mellis liquidi con-  
 sistentiam inspissati libram unam et semis.  
 Omnia optimè misceantur et fiat Confectio.

*Dosis ad drachmas duas.*

N. B. Loco Margaritarum, earum Te-  
 stae usurpari possunt.

## CONFECTIO HYACINTHORUM COMPOSITA.

*(Confectio Hyacinthorum cum acido.)*

℞. Hyacinthorum laevigatorum unciam unam,  
 Corallii Rubri laevigati, }  
 Terrae Sigillatae, } ana semi unciam,  
 Santali Citrini, }  
 Cornu Cervi. . . . }  
 Radicis Tormentillae, . . . }  
 Dictamni Albi, }  
 Granorum Kermes, }  
 Myrrhae, } ana drach-  
 Petalorum Rosarum Rubrarum } mas duas,  
 exungulatarum, }  
 Seminum Citrei excorticorum, }  
 Acetosae, }  
 Portulacae. . . . }  
 Margaritarum laevigatarum, } ana drachmam,  
 Croci. . . . . }

Flavedinis Citrei, . . . . . } ana scrupulos  
 Aurantiorum. } duos.

Omnia subtiliter pulverata misceantur exactissimé, et cum Syrupi Limonum recentis libris duabus et semis fiat Confectio S. A.

*Dosis ad drachmas duas.*

### CONFECTIO QUINAE ANTIEPILEPTICA.

(*Elect. Peruvian. Antiepil. Fuller.*)

R̄. Pulveris Quinae Loxae drachmas sex,  
 Serpentar. Virginian. drachmas duas.  
 Syrupi Florum Paeoniae uncias tres.  
 Misce S. A.

*Dosis ad drachmas tres, vel quatuor.*

### CONFECTIO QUINAE ASTRINGENS.

(*Elect. Peruvian. Astring. Fuller.*)

R̄. Quinae ex Loxa unciam unam,  
 Catechú, . . . . . } ana drachmam unam.  
 Balsami Albi. . . . . }

Omnia subtiliter pulverata misceantur S. A. cum Syrupi Symphyti unciis tribus, ut fiat Confectio ad usum.

*Dosis ad unciam semis.*

### CONFECTIO ROSARUM RUBRARUM ASTRINGENS.

(*Elect. Astringens Fuller.*)

R̄. Conservae Rosarum Rubrarum uncias duas,  
 Electuarii Scordii Opiati unciam semis,  
 Boli Armenicae drachmas duas,  
 Sanguinis Draconis drachmam unam et semis.

Balaustiorum drachmam semis,  
Olei distillati Nucis Moschatae, ana guttas  
Cinnamomi. duas.

Omnia exacté pulverata pistentur et cum Syrupi Rosarum Rubrarum uncia una misceantur S. A.

*Dosis ad unciam unam.*

CAPUT XVII.

*S U P P O S I T O R I A.*

Huc Dentifricia, Collyria sicca, Pessariâ,  
Errhina solida, Masticatoria, et alia hujus-  
modi sub nomine Injectiones Solidae subjici  
debent.

**SUPPOSITORIUM MELLIS CUMMUNE.**

℞. Mellis uncias duas.

Coque igne lento ad duritiem, addendo  
sub finem

Muriatis Sodae pulverati drachmas duas.

Misce optimè et supra tabulam, aut lapidem Oleo inunctum formentur duo Suppositoria conica, duplicato filo appensa.

## SUPPOSITORIUM MELLIS IRRITANS.

**R̄. Mellis ad duritiem cocti unciam unam,**

Pulveris Colocynthidum drachmam semis,  
Muriatis Sodae drachmam unam.  
Misce et fiat Suppositorium, ut supra.

---

## CAPUT XVIII.

## TABELLAE.

## TABELLAE ALTHAEAE GUMMATAE.

℞. Radicum Althaeae recentium uncias quatuor.

Mundatae et incisae bulliant leviter in  
Aquae libris sex. In colatura dissolve igne  
lento, continenter spathulâ ligneâ agitando  
Gummi Arabici albissimi pulverati libras  
duas et semis.

Deinde admisce

Sacchari albissimi libras duas et semis.

Cola et vapore ad mollioris massae soliditatem non intermissâ agitatione. Adde albumina ovorum quatuor in Aquae Naphae unciis quatuor soluta. Fortiter agita supra ignem ad humiditatis consumptionem. Effunde in chartam candidissimam, Amyli pulvere conspersam et setaceo superimpositam. Tunc amotâ chartâ, Amyli quod supersit secerne,

massam refrigeratam in Tabellas scinde et Amylo denuo coopertas in vase idoneo serva.

### TABELLAE HYPECACUANHAE SACCHARATAE.

℞. Hypecacuanhae pulveratae drachmam unam,  
Sacchari albi uncias quinque et semis,  
Gummi Tragacanthi drachmas tres,  
Aquae Q. S. ad Gummi solutionem.

Misce et fiant Tabellae numero centum quadraginta quatuor, ritè exsiccandae.  
*Dosis ad scrupulum, seu Tabella per intervalla iteranda.*

*In singulis scrupulis continent Hypecacuanhae granum semis.*

---

## C A P U T X I X.

### P I L U L A E.

#### PILULAE CYNOGLOSSI OPIATAE.

℞. Corticis Radicis Cynoglossi pulverati uncias duas,  
Extracti Opii aquosi drachmas tres,  
Pulveris Croci drachmas quinque,  
Castorei drachmas sex.

Misce et cum Syrupi Simplicis drachmis novem fiat massa, aëri ad siccitatem exponenda.



*In singulis scrupulis continent Extracti Opii  
grana duo.*

*Dosis ad scrupulum unum.*

## PILULAE HYDRARGYRI GLYCYRRHIZATAE.

*(Mercuriales.)*

℞. Hydrargyri purificati uncias duas.

Exstingue in mortario lapideo cum Mellis  
unciis duabus et semis. Adde

Pulveris Glycyrrhizae unciam unam et semis.

Fiat massa pilularis.

*In singulis scrupulis continent Hydrargyri gra-  
na octo.*

*Dosis à granis tribus ad scrupulum.*

## PILULAE HYDRARGYRI EDIMBURGENSES.

℞. Hydrargyri purificati,     }  
Mellis optimi.     . .     } ana unciam unam.

Triturentur simul in mortario marmoreo  
donec Hydrargyrus inconspicuus reddatur;  
postea adde

Micae panis albi et recentis uncias duas.

Pistentur ut fiat massa S. A.

*Dosis ad semiscrupulum.*

## PILULAE SCYLLAE AMMONIACALES.

*(Scylliticae.)*

℞. Saponis albi drachmas duas et scrupulum  
unum,

Gummi Ammoniaci pulverati drachmam  
unam,

Scyllae pulveratae,      }  
Resinae Copaivae.      } ana scrupulum unum.

Fiat massa pilularis.

*Dosis ad grana novem.*

*In singulis scrupulis continent Scyllae grana duo.*

## PILULAE SULPHATIS POTASSAE ALOE-TICAE.

*(Tartareae Bontii.)*

℞. Aloes Succotrinae drachmas sex,  
Gummi Ammoniacy drachmas tres,  
Sulphatis Potassae drachmam unam.

Misce et cum Melle Depurato fiat massa pilularis.

*Dosis à scrupulo ad drachmam.*

## PILULAE ALOES MARTIALES.

*(Benèdictae ex Fuller.)*

℞. Aloes Succotrinae unciam semis,  
Sennae Hispanicae drachmas duas,  
Gummi Assaefoetidae, }  
Myrrhae,                    } ana drachmam unam,  
Galbani.                    }

Sulphatis Ferri drachmas sex,

Croci, . . . . . }  
Macis. . . . . } ana drachmam semis

Omnia pulverata misceantur, et cum Olei Succini guttis quadraginta et Syrupi Artemisiae Q. S. fiat massa pilularis S. A. é quae formentur Pilulae numero centum sexaginta.

ta pro quadraginta dosibus, scilicet quatuor pro dosi.

# PILULAE ALOES COMPOSITAE.

(*Cochiae.*)

R $\acute{e}$ . Aloes Succotrinae uncias duas,  
Fructuum Colocynthis praeparatorum drach-  
mas sex et semis,  
Scamonii optimi unciam semis,  
Radicis Jalappae, } ana drachmas decem.  
Sulphatis Magnesiae. }  
Fiant Pilulae S. A.

*Dosis ad scrupulos duos.*

# PILULAE GUMMI AMMONIACI BALSAMICAE.

R $\acute{e}$ . Asellorum praeparatorum drachmas sex,  
Gummi Ammoniaci drachmas tres,  
Acidi Benzoici scrupulos quatuor,  
Croci, . . . . . } ana scrupulum unum  
Balsami Peruani Nigri }  
Olei Terebinthinae Sulphurati Q. S.  
Fiat massa S. A. è qua formentur Pilulae.

---

## C A P U T . X X .

### T R O C H I S C I .

#### TROCHISCI CARBONATIS PLUMBI CHAMPHORATI.

(*Albi ex Rhasis.*)

℞. Carbonatis Plumbi purificati unciam unam  
et semis,

Amyli, . . . . .	} ana drachmas duas,
Gummi Arabici, . . .	

Camphoræ semidrachmam.

Seorsim pulverata misce et cum sufficienti Aquae quantitate formentur Trochisci.

N. B. Quotiescumque cum Opio praescripti fuerint; singulis Trochiscorum drachmis adde Opii grana tria, et tunc

*In gravis vigintiquinque continent Opii granum unum.*

#### TROCHISCI MURIATIS OXYGENATI HYDRARGYRI.

(*Escharotici.*)

℞. Muriatis Oxygenati Hydrargyri sublimati  
unciam unam,

Amyli unciam unam et drachmas sex,

Gummi Tragacanthi drachmas duas.

Subtiliter pulvera in mortario vitreo et

cum Aquae sufficienti quantitate fiant Trochisci.

*In singulis drachmis continent Muriatis Oxygenati Hydrargyri sublimati scrupulum unum.*

### TROCHISCI FRUCTUUM CUPRESSI EX RAMICH.

℞. Succī Cydoniorum uncias sexdecim,  
Omphacii unciam unam et semis,  
Fructuum Cupressi uncias tres,  
Foliorum Myrti uncias duas,  
Rosarum Rubrarum unciam unam.

Coque leviter in vase idoneo. Colaturae adde

Pulveris Gummi Arabici sesquiunciam,  
Santali Citrini drachmas decem,  
Sumach, . . . } ana unciam unam,  
Rosarum Rubr. }  
Piperis Tabasci unciam unam et  
semis.

Vapora in radiis solaribus ad exsiccationem. Subtilissimè massam pulvera et cum Aquae Rosarum S Q. Trochiscos efforma S.A.

*Dosis à drachma ad drachmas duas.*

### TROCHISCI MYRRHAE COMPOSITI.

℞. Gummi Myrrhae unciam semis,  
Assaefoetidae, . . . }  
Sagapeni, } ana drach-  
Opoponacis, } mas duas.  
Foliorum Rutae,  
Pulegii, }



Menthastri,  
 Radicis Rubiae Tinctorum,  
 Seminis Petroselini. } ana drachmas  
 duas.

Pulvera subtiliter et cum S. Q. decocti  
 Artemisiae fiant Trochisci, in umbrâ sicca  
 et vase cooperto ad usum serva.

*Dosis ad drachmam unam.*

### TROCHISCI AGARICI.

**R.** Agarici Albi Q. V.

Radatur minutissimè et cum Vini Albi  
 optimi S. Q. fiat massa in mortario lapideo,  
 quae exsiccata, iterumque est trochiscanda  
 et in umbrâ siccanda ad usum.

*Dosis ad drachmam unam in pulvere,  
 ad drachmas quinque in infusione.*

### TROCHISCI FRUCTUUM COLOCYNTHIDIS:

(*Alhandal.*)

**R.** Fructuum Colocynthidis minutim conciso-  
 rum, absque seminibus et à pedunculis  
 mundatorum uncias quatuor,

Gummi Tragacanthi drachmas duas,

Vini Albi generosi Q. S.

Fiat pasta in mortario lapideo ex qua  
 formentur Trochisci in umbra siccandi.  
 Postea in pulverem redige et cum Vino fiant  
 iterum Trochisci ut antea, qui siccentur,  
 iterumque trochiscentur.

*Dosis ad grana quatuor, vel sex in pul-  
 vere subtilissimo sumenda.*

## TROCHISCI SCYLLITICI.

℞. Pulpae recentis Scyllae coctione praeparatae  
libram unam,

Dictamni Albi pulverati Q. S.

Fiant Trochisci S. A, sicca in umbrâ et  
serva ad usum.

*In Electuarium Theriacale Magnum in-  
grediuntur.*

## TROCHISCI FERRI TARTARISATI.

Vide *PRAEPARATA EX FERRO.*

## TROCHISCI VIPERARUM.

℞. Pulveris truncorum Viperarum cum visceri-  
bus praepparatorum Q. V.

Mucilaginis Gummi Tragacanthi Vino Albo  
paratae Q. S.

Fiant Trochisci S. A, quos in umbrâ sicca,  
Balsamo Nigro Peruano inungendos et ad  
usum servandos.

*In Electuarium Theriacale Magnum ingre-  
diuntur.*

TROCHISCI CALAMI AROMATICI HE-  
DYCROI.

℞. Herbae Mari Vulgaris,	} ana uncias undecim;
Amaraci,	
Radiciſ Asari,	
Ligni Aloes. . . .	

Radiciſ Calami Aromatici.	}	ana uncias ſexdecim,
Phù Pontici,		
Herbae Schoenanthi. . .		
Herbae Coſti Hortenſis,	}	ana uncias ſex- decim,
Cinnamomi,		
Opobalsami,		
Xylobalsami. . . . .		
Malabathri, . . . .	}	ana uncias triginta et duas,
Spicae Nardi,		
Cassiae Ligneae,		
Gummi Myrrhae,		
Croci. . . . .		

Amomi Racemosi uncias ſexaginta et tres,  
Maſticheſ uncias quinque et drachmas duas.

Omnia optime pulverata Vini optimi Q.  
S. confinge, Trochiſcos forma ſi volueris,  
et ſerva ad uſum.

*In Electuarium Theriacale Magnum tantum ingrediuntur et quotiescumque conficitur parari debent eoquod ad alios uſus non deſerviant.*

## C A P U T X X I.

### O L E A E X P R E S S A.

#### OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

R̄. Amygdalarum dulcium recentium aſpero lin-  
teo confrictarum libras ſex.

In mortario lapideo tere pistillo ligneo, per setaceum trajice, sacco cannabino immitte, ac torculari subijce.

*Dosis ab uncia semis ad uncias tres, vel plures.*

Eadem ratione exprimitur Oleum

*Amygdalarum Amararum,*

*Avellanarum,*

*Nucum Juglandium,*

*Seminum Ricini dempto prius cortice,*

*Papaveris Albi,*

*Lini,*

*Sesami Orientalis,*

*Cannabis,*

*Hyoscyami et similia.*

## OLEUM FRUCTUS CACAO.

*(Butyrum Cacao.)*

R̄. Fructus Cacao torrefacti et mundati Q. V.

Tere et per setaceum trajice; postea in mortario marmoreo calefacto diutissime pinsito, ut fiat massa mollis, statim sacco linteo excipe et prelo calefacto comprime; tunc in vase vitreo loco calido Oleum repone ut liquescat, filtra, in modulos papyraceos mitte et post refrigerationem serva.

## OLEUM NUCIS MOSCHATAE.

R̄. Nucum Moschatarum Q. V.

In mortario marmoreo pistillo ligneo tere et per setaceum trajice; postea in mortario ferreo calefacto pinsito fortiter, ut fiat mas-

sa tenuissima et malaxabilis, in sacculo lin-  
teo excipe et confestim prelo calido exprime.

*Dosis ad scrupulum.*

Sic extrahuntur sequentia Olea

*Fructuum Lauri siccatorum,*

*Seminis Anisi,*

*Foeniculi et similia.*

## OLEUM EX VITELLIS OVORUM.

R̄. Ova Q. V.

Coque in Aqua ad duritiem, vitellos exi-  
me et radulâ comminutos in vase ferreo igne  
moderato assa, spathulâ assiduè movendo,  
donec ex flavo rubescant et pinguedinem  
exsudent. Confestim in sacculo lineo excipe,  
preloque calido exprime.

## CAPUT XXII.

### OLEA COCTA.

#### OLEUM APPARITH.

*(Balsamum Aparitii.)*

R̄. Olei Olivarum libras sex,

Summitatum Rorismarini,	} ana libram unam
Hyperici,	
Rutae.	



Mixta calido loco per triduum digere.

Adde

Lumbricorum terrestrium libram semis.

Coque ad humiditatis consumptionem. In colatura dissolve

Terebinthinae optimae libram unam et semis.

Pulveris Resinae Juniperi,	} ana uncias duas,
Myrrhae electae,	
Thuris.	

Mastiches unciam unam.

Cola et serva.

### OLEUM CAPPARUM.

Rx. Florum Capparis nondum explicatorum et

Aceto conditorum uncias octo,

Corticis Radicum ejusdem plantae uncias duas,

Radiciis Cyperi Longi unciam unam,

Foliorum Rutae recentium drachmas duas.

Incide, tere et adde

Olei Olivarum libras tres,

Vini Albi uncias sex.

Macera per triduum loco calido, coque ad humiditatis consumptionem, cola et per subsidentiam defaeca.

### OLEUM CUCURBITAE PLEURITICUM.

(*Balsamum Pleuriticum*)

Rx. Corticum Cucurbitae longae	} ana libras sex.
in frustula incisorum,	
Olei Olivarum. . . . .	

Coque ad perfectam humiditatis consumptionem, cola et defaeca.

### OLEUM EUPHORBII.

R̄. Euphorbii pulverati unciam unam,  
Olei Olivarum libram unam.

Misce, leni igne dissolve et cola.

### OLEUM HYPERICI.

R̄. Summitatum Hyperici seminibus onustarum,  
fermè siccarum et contusarum libras quatuor,

Olei Olivarum libras sex.

Digere per septimanam, leviter coque et cola.

### OLEUM LUMBRICORUM.

R̄. Lumbricorum libras duas,

Vini uncias sex,

Olei Olivarum libras tres.

Coque in vase idoneo ad humiditatis consumptionem. Cola.

### OLEUM ROSARUM.

R̄. Olei Olivarum libras octo,

Petalorum Rosarum Rubrarum et Pallidarum recens explicatarum et contusarum ana libras tres.

Digere per triduum, aut quatrimum: postea coque ad humiditatis consumptionem et cola cum expressione.

Eâdem methodo parantur Olea  
*Rorismarini* ex summitatibus floridis,

*Chamomillae* ex floribus,  
*Liliorum Alborum* ex petalis,  
*Rutae* ex foliis,  
*Sambuci* ex floribus,  
*Myrti* ex foliis et fructibus,  
*Solani* ex foliis et fructibus cum Oleo  
 Rosarum,  
*Althaeae* ex radicibus.

## OLEUM BRYONIAE COMPOSITUM.

( *Agrippae.* )

℞. Radicum recentium Bryoniae, } ana libram  
 Cucumeris Agrestis } unam,  
 Scyllae, . . . }  
 Iridis Nostratis, } ana libram semis.  
 Ebuli. . . . }

Mundatas, incisas et contusas coque igne  
 lento ad humiditatis fermè consumptionem  
 in Olei Olivarum libris quatuor.

Postea cola, defaeca et ad usum serva.

## OLEUM CASTOREI.

℞. Castorei triti uncias duas,  
 Olei Olivarum libras duas,  
 Vini Albi optimi uncias quatuor.

Digere in vase vitreo angustioris colli per  
 dies octo; postea coque lento igne ad humi-  
 ditatis consumptionem et serva sine colatura.  
 Per decantationem hoc oleum usurpatur,

## OLEUM CROCI.

℞. Croci unciam unam,

Radicis Calami Aromatici,	}	ana sesquiun-
Seminis Cardamomi Minoris		
contusorum. . . . .	}	ciam,

Vini Albi optimi libram semis,

Olei Olivarum libram unam et semis.

Misce et digere per octiduum; postea coque leviter ad humiditatis consumptionem, cola et serva ad usum.

### OLEUM STRAMONII COMPOSITUM.

(*Balsamum Tranquillans.*)

R̄. Foliorum Stramonii uncias quatuor,

Solani Nigri,	}	singulorum uncias
Phytolaccae,		
Belladonnae,		
Mandragorae,		
Nicotianae,		
Hyoscyami,		
Papaveris Albi	}	quatuor.
Nigri.)		

Summitatum floridarum)

Rorismarini,	}	singulorum un-
Salviae,		
Rutae,		
Absynthii,		
Hyssopi,		
Lavendulae,		
Thymi,		
Majoranae,		
Costi Hortensis,	}	ciam unam,

Menthae,	} singulorum un-
Sambuci,	
Hyperici,	
Persicariae.	

ciam unam,

Bufones vivos numero quinque.

Herbae succulentae minutim secta simul-  
que Bufones injiciantur in Olei Olivarum li-  
bris quinque et coquantur ad humiditatis  
consumptionem; postea cola cum forti ex-  
pressionem et adde herbas aromaticas, quae  
insolentur per dies octo; tunc coque pau-  
lulum, cum expressione cola et post defae-  
catum Oleum serva ad usum.

### OLEUM THAPSIAE ANTIRHEUMATICUM.

(Vulgò *del Fraile*.)

Rx. Radicis Thapsiae minutim sectae,	} ana libram
Foliorum Rorismarini,	
Vini Rubri optimi. . . . .	

Olei Olivarum libras quatuor.

Misce et digere per dies quatuor; postea  
coque lento igne ad Vini consumptionem,  
cola, defaeca per subsidentiam et serva ad  
usum.

### OLEUM ARTHANITAE COMPOSITUM.

Rx. Succi, vel Decocti fortissimi Radicis Artha-  
nitae libras duas,  
Succi, vel Decocti Cucumeris Agrestis un-  
cias octo,  
Colocynthis uncias duas,  
Polypodii uncias tres,



Euphorbii drachmas duas.

Omnia mixta et contusa digerantur in Olei Irini recentis libris duabus per dies quatuor; postea coquantur ad humiditatis fère consumptionem, cola et per subsidentiam depuratum serva ad usum.

### OLEUM INULAE COMPOSITUM.

(*Martiatonis.*)

R. Radicis Helenii, . . . .	} singulorum uncias tres,
Valerianae Sylvestris,	
Bardanae. . . . .	
Summitatum Hyperici,	} singulorum uncias tres,
Herbarum Abrotani,	
Absinthii,	
Ocymi,	
Calaminthae,	
Costi Hortensis,	
Majoranae,	
Menthastri,	} singulorum uncias tres,
Sabinae. . . . .	
Salviae,	} singulorum uncias tres,
Foliorum Sambuci.	
Summitatum floridarum Cha-	} singulorum uncias duas,
momillae,	
Meliloti,	
Staechados	
Foliorum Lauri recentium,	} singulorum uncias sex,
Ebuli,	
Rorismarini,	
Rutae. . . . .	

Seminum Cymini,	}	singulorum unciam unam,
Foenigraeci,		
Urticae. . .		

Olei Olivarum libras duodecim.

Radices contusae et mundatae macerentur in Oleo simul cum floribus et herbis per dies quatuor; postea coque ad humiditatis consumptionem et depuratum Oleum per subsidentiam ad usum serva.

### OLEUM CONYZAE COMPOSITUM.

(*Aregonis.*)

R. Foliorum Conyzae Majoris,	}	singulorum uncias quatuor,
Laureolae,		
Cucumer. Agrest.		

Foliorum Calaminthae,	}	singulorum uncias quatuor,
Rorismarini,		
Majoranae,		
Thymi,		
Rutae,		
Lauri,		
Sabinae,		
Salviae. . .		

Radicis Bryoniae, . . .	}	singulorum uncias duas.
Ari,		
Cucumeris Sylvestris. .		

Omnia incisa et contusa macerentur in Olei Olivarum libris decem per dies quatuor; postea igne lento coquantur ad humiditatis consumptionem; cola cum expressione et post defaecatum Oleum serva ad usum.

## OLEUM IRINUM.

℞. Radicum Iridis Nostratis recentium et contusarum libram unam et semis,  
Olei Olivarum libras tres.

Digerantur in vase fictili vitreato per horas vigintiquatuor, coque ad humiditatis ferè consumptionem; postea cola cum expressione et infunde

Florum Iridis ejusdem speciei libram semis.

Digere per horas duodecim; coque ad humiditatis consumptionem, cola, depura Oleum per subsidentiam et serva ad usum.

## OLEUM SCORPIONUM.

℞. Scorpiones vivos centum,  
Olei Olivarum libras tres.

Scorpiones suffoca in Oleo, coque cum Aquae pauxillo et cola.

## OLEUM OXYDI CUPRI VIRIDE.

(*Balsamum Viride.*)

℞. Olei Olivarum libram unam et semis,  
Terebinthinæ uncias tres.

Dissolve igne lento et refrigeratis adde Pulveris Oxydi Cupri acetati drachmas quatuor et semis,

Olei distillati Caryophyllorum drachmam unam et semis.

## CAPUT. XXIII.

### OLEA DISTILLATA.

#### OLEUM ABSINTHII.

Rx. Herbae floridae Absinthii, seminibus onustae et incisae libras octo,  
Aquae libras sexaginta quatuor.

Distilla ex alembico, donec nihil amplius Olei prodeat. Oleum ab Aqua per infundibulum separa, et cum nova Absinthii quantitate rursus distilla; idque toties repete quousque sufficientem Olei portionem obtinueris.

Simili modo extrahitur Oleum

*Florum Chamomillae,*

*Lavendulae,,*

*Herbae Menthae et similitum.*

#### OLEUM CARYOPHYLLORUM.

Rx. Caryophyllorum Aromaticorum libram unam,  
Aquae libras quadraginta.

Macera per dies quatuor et in alembico distilla forti igne ad dimidias; Oleum ab Aqua separatum per infundibulum ad usum serva.

*Dosis ad guttas sex.*

Simili modo distillatur Oleum

*Fructuum Lauri,*

*Juniperi,*  
*Nucis Moschatae,*  
*Cinnamomi,*  
*Terebinthinae et similia.*

## OLEUM LIMONUM.

R̄. Flavedinis Limonum, radulâ ab interiori  
cortice sub Aqua separatae, Q. V.  
Aquae sufficientem quantitatem.  
Distilla et Oleum S. A. ab Aqua separa.

## OLEUM ANISI.

R̄. Seminum Anisi contusorum libras sex,  
Aquae libras quadraginta.  
Macera per biduum et distilla, ut in prae-  
dictâ operatione.  
Simili modo distillatur Oleum  
*Seminis Cymini,*  
*Foeniculi,*  
*Carvi et similia.*

## OLEUM CERAEE.

R̄. Cerae Citrinae libram unam,  
Pulveris Laterum libras duas.  
Liquefactâ Cerâ, pulverem permisce, ab  
igne separa, ut per refrigerationem fiat pasta  
è qua formentur globuli, quos ex retorta vi-  
treâ balneo arenae igne forti distillabis:  
prodibit primùm Oleum butyri formâ, quod  
per infundibulum separatum cum pulvere  
tegularum, aut Laterum iterum atque iterum



distilla donec limpidissimum et tenuissimum appareat, quod servetur ad usum.

*Dosis ad scrupulum semis.*

Simili modo distillatur Oleum.

*Saponis,*

*Pinguedinis et similia.*

### OLEUM CORNU CERVI.

**Rx.** Cornu Cervi in scobem redacti Q. V.

Distilla ut in Carbonate Ammoniacali

C. C. praescribitur; tunc sume

Hujus Olei Q. V.

Pulveris Cornu Cervi calcinati Q. S.

Fiat massa, aut globuli, quos distilla in retorta vitrea ignem augendo donec totam ferè quantitatem obtineas et serva ad usum.

*Usus externus.*

Simili modo distillatur Oleum

*Viperarum,*

*Lumbricorum,*

*Caeterorumque animalium.*

### OLEUM SUCCINI.

**Rx.** Succini triti Q. V.

Distilla ex retorta vitrea, ut in Acido Succinico praescribitur; tunc sume

Hujus Olei Q. V.

Aquae dodecuplum.

Distilla in retorta vitrea balneo arenae fere ad siccitatem; toties repete donec limpidissimum et tenuissimum Oleum obtineas;

ab Aqua per infundibulum separa et serva.

*Dosis ad guttas octo.*

## OLEUM OLIVARUM EMPYREUMATICUM.

(*Laterum.*)

R $\bar{x}$ . Laterum pulveratorum, }  
 Olei Olivarum. . . . } ana libras tres.

Immitte in retortam, igne reverberii distilla et Oleum à phlegmate separa.

## OLEUM GALBANI COMPOSITUM.

(*Galbanetum.*)

R $\bar{x}$ . Gummi Galbani, . . }  
           Hederae,                 } singulorum libram  
 Resinae Elemi,                 } unam.  
 Olei Fructuum Lauri. }

Omnia mixta in retorta vitrea balneo arenae distillantur, ignem augendo, donec nihil amplius Olei prodeat; Oleum à liquore acido separatum ad usum serva.

*Usus externus.*

## OLEUM TEREBINTHINAE SULPHURATUM.

(*Balsamum Sulphuris Terebinthinatum.*)

R $\bar{x}$ . Olei Terebinthinae libram unam,  
 Sulphuris Sublimati uncias tres.

Incipiantur in matrarium vitreum non obturatum et calore balnei arenae digerantur

diligenter movendo, donec totum Sulphur ferè dissolvatur et Oleum colorum rubrum et consistentiam Syrupi adquisiverit, Oleum per subsidentiam depuratum per decantationem separa et vase obturato ad usum serva.

*Dosis ad guttas octo.*

### OLEUM ANISI SULPHURATUM.

*(Balsamum Sulphuris Anisatum.)*

℞. Olei distillati Anisi libram unam,

Sulphuris Sublimati uncias tres,

Misce et procede ut supra.

*Dosis, ad guttas octo.*

Simili modo paratur Oleum

*Succini Sulphuratum,*

*Nucum Juglandium Sulphuratum cum*

*Oleo expresso.*

## C A P U T X X I V.

### U N G U E N T A.

#### UNGUENTUM MURIATIS HYDRARGYRI.

*(Ad Herpetes.)*

℞. Unguenti Rosarum uncias sex,

Muriatis Hydrargyri praecipitati drachm. sex.

Misce in mortario vitreo.

*Drachmae tres hujus Unguenti continent*

*Muriatis Hydrargyri praecipitati scrupulum unum,*

# UNGUENTUM MURIATIS OXYGENATI HYDRARGYRI.

(*Ad Scabiem ex Alderete.*)

R̄. Butyri Vaccini recentis uncias quatuor,  
 Terebinthinae, . . . } ana unciam unam.  
 Olei Rosarum. . . }

Igne lenissimo liquefiant: deinde agita in mortario lapideo et permisce sequentia in subtilissimum pulverem redacta:

Carbonatis Plumbi uncias duas et semis,  
 Muriatis Oxygenati Hydrargyri sublimati drachmas duas,

Sulphatis Aluminae exsiccati drachmas duas.  
 Mox adde

Vitellos Ovorum duos,

Succi Limonum uncias duas.

Misce optime.

*In singulis unciis continet Muriatis Oxygenati Hydrargyri sublimati scrupulum semis.*

# UNGUENTUM SULPHURETI HYDRARGYRI SUBLIMATI.

(*Cinnabarinum.*)

R̄. Pulveris Oxydi Plumbi semivitrificati uncias quatuor,

Muriatis Hydrargyri sublimati drachm. duas,  
 Carbonatis Plumbi unciam unam et semis,  
 Sulphureti Hydrargyri sublimati uncias duas,  
 Olei Rosarum libras duas,  
 Cerae Citrinae uncias sex.

Liqua Ceram in Oleo et reliqua prius laevigata misce agitando donec frigescant.

## U N G U E N T U M   H Y D R A R G Y R I .

( *Mercurii.* )

℞. Axungiae Suillae libras duas,  
Hydrargyri libram unam.

Fiat Unguentum S. A. in mortario lapideo pistillo ligneo per aliquot dies continuè agitando donec Hydrargyrus inconspicuus reddatur.

*In singulis drachmis continet Hydrargyri scrupulum unum.*

## U N G U E N T U M   N I T R A T I S   H Y D R A R G Y R I .

( *Citrinum.* )

℞. Hydrargyri,                    )  
Acidi Nitrici.                ) ana unciam unam.

Effunde gradatim Acidum in vas vitreum supra Hydrargyrum ad solvendum. Tunc sume Axungiae Suillae liquefactae et jam ferè spissescantis uncias decem.

Mitte in Mortarium vitreum, et solutionem nitricam sensim superaffunde, agitetur mixtura donec frigescat.

## U N G U E N T U M   C A R B O N A T I S   P L U M B I .

( *Album ex Rhasis.* )

℞. Olei Rosarum libram unam et semis,  
Pulveris Carbonatis Plumbi libram unam,  
Cerae Albae uncias quatuor.



Liquefactâ in Oleo Cerâ, Carbonatem Plumbi admisce, dein coque paululum igne lento, separa et agita usque ad refrigerationem.

### UNGUENTUM OXYDI PLUMBI ACETATUM.

(*Lithargyri, seu Nutritum.*)

R̄. Oxydi Plumbi Semivitrificati pulverati libram unam,

Olei Olivarum libras tres,

Aceti Albi optimi uncias sexdecim.

Coque Oxydum Plumbi cum Olei libra una, addendo Aquae quantum satis, ad Cerati densitatem. Huic admisce in mortario modo Oleum, modo Acetum, continenter agitando, donec Oleum omne et Acetum exhausteris, et Unguento debitam spissitudinem et candorem conciliaveris.

### UNGUENTUM PLUMBI NIGRUM.

R̄. Sulphureti Plumbi, . . .	} ana uncias
Oxydi Plumbi Semivitrificati.	

Carbonatis Plumbi,	} ana unciam unam,
Sulphureti Antimonii.	

Olei Rosarum libras tres,

Cerae Albae uncias novem.

Liqua Ceram in Oleo et reliqua optime laevigata misce, coque paululum, separa et continenter agita ad refrigerationem.

# UNGUENTUM OXYDI PLUMBI FUSCUM.

(Vulgò *de la Mere.*)

R<sup>x</sup>. Axungiae Suillae, . . . }  
 Butyri Vaccini recentis, }  
 Cerae Citrinae, } ana libram semis,  
 Sebi Hircini, }  
 Oxydi Plumbi Semivitri- }  
 ficati pulverati. . . }  
 Olei Olivarum libram unam.

Coque donec ex fusco nigrescat non intermissâ agitatione.

# UNGUENTUM OXYDI PLUMBI RUBRUM.

(*Magistrale, seu de Minio.*)

R<sup>x</sup>. Olei Rosarum libram unam et semis,  
 Pulveris Oxydi Plumbi Rubri uncias quinque,  
 Carbonatis Plumbi. . . } ana sesquiun-  
 Oxydi Plumbi Semivitricati } ciam,  
 Coque paululum continuè agitando et adde  
 Cerae Albae uncias quatuor.

Liqua, ab igne separa, agita et serva ad  
 usum.

# UNGUENTUM ACETATIS PLUMBI.

(*Butyrum Saturni.*)

R<sup>x</sup>. Acetatis Plumbi Liquidi, }  
 Olei Olivarum. . . } ana libram unam.

Misce in mortario lapideo continuè agitando pistillo ligneo ad Linimenti spissitudinem.

### UNGUENTUM ALTHAEAE.

℞. Olei Althaeae libras duas,  
 Cerae Citrinae, . . . }  
 Resinae Communis. . . } ana libram semis.  
 Liquatis et colatis, admisce  
 Terebinthinae purae uncias duas

### UNGUENTUM COLOPHONIAE PALLIDUM.

(*Basilicum.*)

℞. Cerae Citrinae, . . . }  
 Sebi Hircini, . . . }  
 Resinae Communis, . . . } ana libram unam.  
 Colophoniae. . . . }

Liqua in Olei Olivarum sesquilibra et cola.  
*Siloco Colophoniae adhibueris Picem Nigram;*  
 UNGUENTUM PICIS NIGRUM habebis.

### UNGUENTUM MEDULLAE MUCILAGINEUM.

(*Filii Zachariae.*)

℞. Cerae Albae, . . . }  
 Medullae Cruris Vaccini, . . . } ana uncias sex,  
 Axungiae Suillae. . . . }  
 Olei Seminum Lini recentis uncias quinque.  
 Liquefactis et semirefrigeratis, adde  
 Mucilaginis spissioris Seminum Lini uncias  
 sex.

Agita, donec Mucilago exactè misceatur  
 et Unguentum refrigeretur, quod repetes per  
 aliquot dies ne muscescat.

### UNGUENTUM MEDULLAE VACCINAE.

℞. Butyri Majalis recentis libram unam,

Medullae Cruris Vaccini libram semis.

Misce in mortario marmoreo, elue multoties Aquâ et materiem Aquâ Rosarum oporteam serva.

### UNGUENTUM SEBI ARCAEI.

(*Balsamum Arcaeï.*)

2. Sebi Hircini libram unam,  
Terebinthinae purae, }  
Resinae Elemi, } ana uncias decem.  
Axungiae Suillae. }  
Liqua et cola.

### UNGUENTUM ROSARUM.

1. Axungiae Suillae recens praeparatae libras duodecim,  
Petalorum Rosarum Pallidarum recentium libras sex.

Macera per triduum: deinde coque ad humiditatis exhalationem et cola cum expressione.

### UNGUENTUM SAMBUCL.

Corticum interiorum recentium Surculorum Sambuci libras duas et semis  
Foliorum ejusdem libram semis.

Contundantur et cum Axungiae Suillae libris novem macerentur per dies octo in vase fictili vitreato; coque ad humiditatis ferè consumptionem; tunc cola cum forti expressione, defaeca et ad usum serva.

# UNGUENTUM ARTHANITAE COMPOSITUM.

R̄. Olei Arthanitae Compositi recentis libras  
duas,

Butyri Vaccini,	}	ana uncias octo.
Cerae Citrinae.		

Ignē lento liquatis, adde	
Gummi Sagapeni purificati,	} ana unciam semis.
Fellis Tauri praeparati.	

Omnibus mixtis et semirefrigeratis, adde  
sequentes pulveres

Scamonii, . . . . .	}	ana unciam semis,
Radicis Jalappae,		
Fructûs Colocynthis,		
Foliorum Mecereonis,		
Aloes. . . . .	}	ana drachmas duas.
Salis Gemmae, . . .		
Gummi Euphorbii,		
Myrrhae,		
Fructûs Piperis Longi,		
Radicis Zingiberis,		
Florum Chamomillae.		

Misce S. A. et serva ad usum.

# UNGUENTUM LUMBRICORUM NERVINUM

R̄. Herbe recentis Rutae, . . .	}	ana unciam duas,
Summitatum floridarum		
Salviae,		
Najoranae,		
Rorismarini,		
Menthae,		
Chamaepityos,		
Verbasci,		
Lavendulae,		



Hyperici,  
Chamomillae,  
Meliloti. } ana uncias,  
duas,

Fructuum Lauri,  
Juniperi. } ana unciam unam.

Contusa et incisa macerentur per biduum  
in Olei Lumbricorum libris tribus; postea  
coquantur ad humiditatis consumptionem,  
Oleum colatum per expressionem defaeca et  
in colatura dissolve

Cerae Citrinae uncias novem.

Semirefrigerato unguento, adde  
Olei distillati Cerae,  
Terebinthinae } ana uncias duas,

Unguenti Althaeae uncias quatuor.

Misce exactè et serva ad usum.

### UNGUENTUM INULAE MARTIATONIS.

R<sub>x</sub>. Olei Inulae Compositi recentis libras qua-  
tuor, Cerae Citrinae libram unam,  
Axungiae Suillae uncias quatuor.

Liquatis et semirefrigeratis, adde  
Styracis Liquidae drachmas undecim,  
Pulveris Mastiches drachmas sex.

Agita ad refrigerationem et serva ad usum.

### UNGUENTUM CICUTAE DEOPILATIVUM.

R<sub>x</sub>. Foliorum Cicutae, . .  
Ap<sup>i</sup>i,  
Ebuli,  
Petroselini,  
Sabinae. . . . } ana libram unam,

Radicis Capparis, . . . . .	} ana libram semis.
Iridis Germanicae,	
Bryoniae. . . . .	

Incisa et contusa digerantur per quatri-  
duum in Olei Olivarum libris sex; dein co-  
que ad humiditatis consumptionem, cola, ex-  
prime, defaeca et igne lento dissolve  
Cerae Citrinae sesquilibram.

Semirefrigerato Unguento adde  
Pulveris Gummi Ammoniacy, } ana uncias  
Radic. Aristoloc. Long. } duas.  
Misce et fiat Unguentum S. A.

### UNGUENTUM CONYZAE AREGONIS.

R<sub>x</sub>. Olei Conyzae compositi recentis libras qua-  
tuor,

Cerae Albae libram unam,  
Axungiae Suillae uncias quatuor.

Liquatis et semirefrigeratis, adde

Pulveris Radicis Pyrethri,	} ana unciam semis.
Zingiberis,	
Fructus Piperis Nigri,	
Euphorbii,	
Mastiches,	
Thuris. . . . .	

Misceantur optimè et agita ad refrigerationem.

### UNGUENTUM BRYONIAE AGRIPPAE.

R<sub>x</sub>. Olei Bryoniae Compositi recentis libras qua-  
tuor,

Cerae Albae libram unam.

Liqua igne lento, agita paululum post semirefrigerationem et conserva ad usum.

# U N G U E N T U M M A L O R U M I N S A N O R U M .

R̄. Olei Rosarum libras tres,  
Malorum Insanorum minutim incisorum libras duas.

Coque igne lento ad humiditatis consumptionem, in colatura igne lento dissolve Cerae Citrinae uncias novem.

Adde

Oxydi Cupri Acetati laevigati sine Aqua drachmas duas.

Coque paululum ad colorem viridem conciliandum, agita et refrigeratum conserva.

# U N G U E N T U M R U T A E

(*Butyrum Rutae*),

R̄. Foliorum recentium Rutae,	} ana uncias
Absinthii,	
Menthae.	

duas,

Axungiae Suillae uncias sexdecim.

Coque ad humiditatis consumptionem et cola.

# U N G U E N T U M G E M M A R U M P O P U L I C O M - P O S I T U M .

(*Populeum*.)

R̄. Gemmarum Populi Nigrae recentium et contusarum libras tres,

Axungiae Suillae libras octo.

Misce et macera in vase fictili vitreato, ritè cooperto, donec sequentia recens collecta comparare possis, scilicet

Foliorum Hyoscyami libram unam et semis,  
 Sempervivi Majoris, }  
 Violae, } ana libram  
 Umbilici Veneris. } unam,  
 Solani libras duas.

Contusis, misce et coque igne lento, continenter agitando, ad humiditatis consumptionem. Cola, torculari exprime et defaeca.

## UNGUENTUM MYRTINUM COMPOSITUM.

(*Comitissae.*)

R $\acute{e}$ . Olei Myrti libram unam,  
 Cerae Citrinae uncias tres.

Liquatis et ab igne semotis, adde sequentia in pulverem subtilem redacta:

Gallarum immaturarum unciam unam,

Fructuum Myrti,

Cupressi,

Corticum Granatorum

} ana drachmas duas,

Foliorum Sumach unciam unam,

Mastiches unciam semis.

Agita usque ad refrigerationem et serva ad usum.

## UNGUENTUM CANTHARIDUM.

(*Epispasticum.*)

R $\acute{e}$ . Unguenti Colophoniac Pallidi uncias tres,  
 Cerae Citrinae unciam semis.

Simul liquatis, adde

Pulveris Cantharidum unciam unam et semis.

Misce igne lento continuè movendo et post refrigerationem serva ad usum.

### UNGUENTUM OXYGENATUM.

R̄. Axungiae Suillae uncias octo.

Liqua in vase porcellaneo amplo et injice Acidi Nitrici puri unciam unam.

Cum spathula lignea lento igne agita, quousque vapores rubros non exhalet; tunc ab igne statim separa, pluriesque agita, et semirefrigeratum in modulos papyraceos immitte servaque ad usum.

### UNGUENTUM OXYDI CUPRI MELLEUM.

(*Aegyptiacum.*)

R̄. Mellis optimi uncias quatuordecim,

Aceti fortis uncias septem,

Oxydi Cupri acetati pulverati uncias quinque.

Coque igne lento ad Unguenti spissitudinem.

## C A P U T X X V.

### EMPLASTRA.

#### EMPLASTRUM RESINOSUM SULPHURATUM.

(*Guillermi Servitoris.*)

R̄. Resinae communis, . . . } ana libras duas,  
Colophoniae. . . . . }



Cerae Citrinae libram unam,  
Terebinthinae uncias octo.

Liquefactis et colatis, adde  
Pulveris Zingiberis unciam unam et semis,  
Fructuum Lauri, . . . }  
Sulphuris, } ana unciam  
Seminis Anisi, } unam,  
Summitatum Pulegii, }  
Thuris, }  
Croci, }  
Mastiches. . . . . }  
Piperis Tabasci uncias duas.

Misce diligenter et fiat Emplastrum.

### EMPLASTRUM SEBI ANODINUM.

℞. Emplastri Oxydi Plumbi Mucilaginei recentis libram unam,  
Cerae Albae uncias sex,  
Axungiae Suillae uncias quatuor,  
Sebi Hircini uncias duas.

Liqua, cola et in Emplastri formam redige.

N. B. Si praedicto Emplastro addideris  
Olei Olivarum uncias quatuor, habebis CERATUM ANODINUM.

### EMPLASTRUM CARBONATIS PLUMBI USTUM.

(*Benedictum.*)

℞. Radicis Althaeae, . . . } ana uncias duas,  
Arundinis, . . . }  
Ireos uncias tres,

Incisas macera in Olei Olivarum libris tribus; dein coque ad humiditatis consumptionem. Cola et admisce Carbonatis Plumbi pulverati uncias sex, Oxydi Zinci Semivitrificati laevigati uncias tres,

Perge coquere spathulâ continenter agitando ad Emplastri mollis spissitatem. Dein adde Cerae Citrinae uncias quatuor.

Tunc decoque ad debitam densitatem, ac ab igne semotis et semirefrigeratis, affunde Balsami Nigri unciam semis.

Agita et fiat Emplastrum.

#### EMPLASTRUM CICUTAE.

Rx. Resinae Communis libras duas et uncias duas, Cerae Citrinae libram unam, Olei Olivarum uncias tres.

Liquefactis igne leni, adde Cicutae recentis contusae libras duas.

Coque ad totius ferè humiditatis exhalationem. Cola cum expressione, in ignem redige et adjice

Succi Cicutae recenter extracti et non defaecati libras quatuor.

Agita spathulâ ligneâ donec faecula Succum cum massa resinosa permisceatur; dein remove, liquoremque limpidum supernatantem et fere refrigeratum decanta: tunc massae iterum liquefactae admisce

Gummi Ammoniaci in Aceto soluti et ad Em-

plastri spissitudinem redacti uncias octo.  
Fiat Emplastrum S. A.

# EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI RUBRUM.

(*Confortativum Vigonis.*)

R. Radicum et Foliorum Symphyti,	} ana uncias quatuor,
Fructuum Myrti,	
Rosarum Rubrarum,	
Summitatum Hyperici. . . . .	

Incisa et contusa coque in Aquae libris novem ad tertiae partis consumptionem; tunc sume

Olei Olivarum libras quatuor,  
Sebi Hircini libram unam,  
Oxydi Plumbi Semivitrificati pulverati libras duas.

Coque, sensim addendo Decoctum supradictum, ad molliorem Emplastri spissitudinem. Deinde in eodem liqua  
Cerae Citrinae libram unam,  
Terebinthinae uncias tres.

Iterum coque ad justam densitatem, et Emplastro semirefrigerato, insperge sequentia in pulverem redacta, scilicet

Thuris, . . . . .	} ana uncias duas,
Myrrhae,	
Mastiches. . . . .	

Sanguinis Draconis uncias tres,  
Boli Armenicae laevigatae uncias quatuor,  
Oxydi Plumbi Rubri uncias sex.

Misce, malaxa et in cylindros serva.

# EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI MUCILAGINEUM.

(*Diachylum Simplex.*)

R. Radicum recentium Althaeae in }  
     taleolas sectarum,                    } ana libram  
 Seminum Lini. . . . . } semis.

Infusis in Aquae libris octo, leviter coque ad mucilaginis extractionem. Cola et exprime; tunc sume

Mucilaginis expressi libras tres.

Oxydi Plumbi Semivitrificati subtiliter pulverati libras duas,

Olei Olivarum libras quatuor.

Coque, sensim addendo mucilaginem, ad Emplastri soliditatem.

# EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI MUCILAGINEUM COMPOSITUM.

(*Diachylum Magnum.*)

R. Emplastri praedicti libras sex,  
 Ichthyocollae Alcoholis Vini Communis unciis duabus solutae unciam semis,

OEsypi uncias quatuor,

Resinae Communis,                    }  
 Cerae Citrinae. . .                    } ana uncias quatuor,

Terebinthinae libram semis.

Resinam, Ceram et Terebinthinam simul liquatas et colatas adde Emplastro liquato igne lento, et optimé misceantur, addendo sub finem OEsypum cum Ichthyocollae solutione in mortario prius coalitum, postremum

verò digerantur ad intimam unionem et humiditatis consumptionem,

### EMPLASTRUM OXYDI PLUMBIGUMMATUM.

(*Diachylum Gummatum.*)

R<sub>2</sub>. Emplastri supra descripti libras tres,

Gummi Galbani, . .	} ana unciam unam,
Ammoniacy,	
Bdellij,	
Sagapeni. . .	

Vini Albi libram unam.

Emplastro igne lento liquato et adhuc calenti adde Gummi in Vino soluta, colata et ad mellis spissitudinem igne lento evaporata, agitando ad perfectam mixtionem; postea lenissime coque ad humiditatis consumptionem et forma cylindros S. A.

### EMPLASTRUM RANARUM SIMPLEX.

R<sub>2</sub>. Ranas viventes quadraginta,

Radicum recentium Ebuli,	} ana sesqui
Bardanae.	

Aceti libras tres,

Aquae libras novem.

Macera per biduum et coque ad dimidias.

Tunc sume

Decocti colati et expressi libras quinque,

Olei Olivarum libras novem.

Coque ad humiditatis ferè consumptionem.

Deinde ab igne remove et adde

Axungiae Suillae libras tres,



Oxydi Plumbi Semivitrificati pulverati libras sex;

Ejusdem Decocti Q. S.

Spathulâ ligneâ permixtis, iterum coque ad debitam spissitudinem, ut digitis non adhereat; tunc adde

Cerae Citrinae libras tres,

Terebinthinae uncias duas.

Exactè permixtis et semirefrigeratis insperge

Euphorbii pulverati unciam unam.

Fiat Emplastrum S. A.

### EMPLASTRUM RANARUM CUM HYDRARGYRO,

R̄. Hydrargyri libram unam,

Terebinthinae uncias quatuor.

Agita in mortario ferreo donec Hydrargyrus inconspicuus reddatur. Cum Emplastri Ranarum libris sex et uncis octo, igne lenissimo liquati misce, et malaxatum in cylindros serva.

*In singulis uncis continet Hydrargyri drachmam unam.*

### EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI SAPONACEUM.

R̄. Olei Olivarum uncias triginta duas,

Oxydi Plumbi Rubri uncias duodecim,

Carbonatis Plumbi optimi uncias sex,

Saponis Albi recentis uncias tres,

Cerae Albae unciam unam et semis.

Plumbi praeparata in subtilem pulverem redacta cum Oleo ritè permisce: deinde adde Saponem in sufficienti Aquae quantitate solutum. Haec omnia simul mixta agita, donec Linimenti formam adquisiverint. Tunc supra mediocrem ignem. continenter agitando et humiditatem, quoties oportuerit, addendo, coque ad debitam soliditatem: humiditatis reliquum levi calore vapore; postea Ceram adjice et semirefrigerato Emplastro adde

Camphorae pulveratae unciam unam.

Misce S. A., malaxa et in cylindros serva ad usum.

## EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI EPULOTICUM.

(*Diapalmae.*)

R̄. Oxydi Plumbi Semivitrificati	} ana libras tres.
subtiliter pulverati,	
Olei Olivarum,	
Axungiae Suillae. . . . .	}

Coque cum Aquae sufficienti quantitate, spathulâ lignea continenter movendo, donec digitis non adhaereat. Adde

Cerae Albae uncias novem,

Resinae Communis uncias sex.

Coque iterum ad Emplastri spissitatem.

# EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI DIABOTANUM.

(*Resolutivum.*)

R<sub>2</sub>. Oxydi Plumbi Semivitrificati pulverati libras duas,

Olei Olivarum libras quatuor,

Aceti optimi Q. S.

Coque in Emplastri spissitudinem. Sub finem admisce sequentia simul permixta et aliquantulum liquefacta, scilicet

Inspissamenti Cicutae. . . . .	} ana uncias
Chelidonii Majoris	
Cucumer. Agrest. unciam unam,	duas,
Extracti Radicis Helenii, . .	} ana unciam
Valerianae. }	
	semis.

Iterum coque per aliquot momenta. Postea adde sequentia prius liquata et colata:

Cerae Citrinae, . . . .	} ana libram semis,
Picis Nigrae,	
Terebinthinae. . . . .	
Styracis Liquidae uncias tres.	

Massae fermè refrigeratae insperge

Pulveris Gummi Ammoniacy,	} ana uncias tres,
Galbani.	
Thuris uncias duas.	

Pulveris Mastiches.	} ana unciam unam,
Tacamahacae. }	
Fructuum Lauri, . . .	} ana drach-
Radicis Ireos,	
Hellebor. Nigr.	
Seminum Cumini. . . . }	
	mas sex,

Olei Olivarum Empyreumatici uncias tres,  
Camphorae in Oleo solutae unciam semis.

N. B. Si singulis Emplastri libris addideris Hydrargyri in Terebinthinae uncia una et semis extincti uncias tres, habebis EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI DIABOTANUM CUM HYDRARGYRO, quod *in singulis unciis continet Hydrargyri drachmam unam et semis.*

### EMPLASTRUM COLLAE AD HERNIAM.

(*Contra Rupturam de Pelle.*)

R. Fructuum Myrti contusorum, }  
Lumbricorum Vino lotorum } ana uncias sex,  
Aquae Ferrariae libras octo,

Coque ad dimidias et cola. Tunc sume  
Decocti praescripti libras tres,  
Olei Olivarum libras duas,  
Oxydi Plumbi Semivitrificati pulverati libram unam.

Frigidè in cacabo aeneo rite agitentur;  
postea coque ad humiditatis consumptionem  
et Emplastri mollis consistentiam; tunc adde  
sequentia prius liquata et colata

Cerae Citrinae libram unam,  
Picis Nigrae, . . . . . }  
Resinae Communis, } ana uncias novem.  
Colophonae. . . . . }

Agita et adde sequentia in Aceto soluta  
et ad mellis consistentiam inspissata

Gummi Galbani, . . . }  
Ammoniacy. } ana uncias quatuor.

Benè permixtis, et Emplastro ab igne semoto et semirefrigerato, paulatim misce sequentia in pulverem redacta, scilicet.

Pulveris Myrrhae, . . . .	} ana uncias quatuor,
Thuris,	
Mastiches,	
Sanguinis Hirci,	
Collae fortis.	} ana uncias tres,
Radic. Aristoloch. Long.	
Rotund.	
Consolidae Major.	
Minor.	} ana uncias tres,
Gallarum	
Boli Armenicae. . . . .	} ana uncias tres.
Pulveris Gypsi, . . . .	
Mumiae. . . .	

Assiduè agitando fiat Emplastrum S. A.

### EMPLASTRUM SILIQUARUM.

℞. Resinae Communis, } ana uncias quatuor,  
 Colophoniae. . . . }  
 Cerae Citrinae uncias sex.

Liquatis et colatis, admisce  
 Extracti Siliquarum ad mellis spissitudinem  
 redacti libram unam,  
 Mellis optimi uncias duas,  
 Emplastri Oxydi Plumbi Rubri uncias quatuor,  
 Carbonatis Ferri laevigati drachmas sex,  
 Fiat Emplastrum S. A.



**EMPLASTRUM SILIQUARUM IMPERIALE.**

℞. Emplastri Picis Nigrae Regii, } ana uncias  
 Oxydi Plumbi Rubri, } quatuor,  
 Collae ad Herniam. }  
 Resinosi Sulphurati, } ana uncias  
 Siliquarum. . . . } duas,

Oxydi Ferri Rubri unciam semis,  
 Acetatis Plumbi Crystallisati, } ana drach-  
 Camphorae pulveratorum. . . } mas duas,  
 Emplastris simul igne lento liquatis et  
 adhuc calidis adde caetera pulverata, malaxa  
 et in cylindros serva.

**EMPLASTRUM STYRACIS STHOMACHICUM.**

℞. Cerae Citrinae, . . . . } ana libras duas,  
 Thuris. . . . . }  
 Terebinthinae libras tres.

Liqua, cola et adde  
 Pulveris Styracis, . . . . . } ana uncias tres  
 Mastiches, } et semis,  
 Ladani puri minutim incisi }  
 Pulveris Benzoini uncias duas et drachmas  
 duas,

Piperis Tabasci uncias quatuor et semis,  
 Olei Distillati Menthae, } ana drachmas duas,  
 Absinthii }  
 Fiat Emplastrum lege artis.

**EMPLASTRUM STYRACIS STHOMACHICUM  
PHARMACOP. MATRITENSIS.**

℞. Cerae Citrinae libras duas et semis.  
 Terebinthinae libras tres,

Tacamahacae libras duas et semis,	
Styracis, . . . . .	} ana uncias quatuor et semis,
Mastiches,	
Ladani purificati. . .	
Benzoini, . . . . .	} ana drachmas octo- decim,
Caryophyllorum,	
Nucis Moschatae. . . . .	
Olei Distillati Menthae,	} ana drachmas duas.
Absinthii	

Syrax cum mollis sit, Ladano in mortario aeneo calefacto pistetur et misceatur, addendo si opus fuerit, liquamenti Cerae paxillum, ut massa tenuissima fieri possit, pistillo fortiter contundendo; postea cum Cera et Terebinthina simul liquatis et colatis, misceatur, addendo in finem caetera pulverata et Olea Distillata: post semirefrigeratum Emplastrum optimè malaxa et in cylindros papyro involutos ad usum serva.

## EMPLASTRUM PICIS NIGRAE REGIUM.

(*Contra Rupturam.*)

℞. Picis Nigrae libram unam et semis,  
Cerae Citrinae, . . . } ana uncias octo,  
Terebinthinae. . . . }  
Ladani purificati uncias duas.

Liquatis, adde

Hypocistidos in decocto Fructuum Cupressi  
soluti et inspissati unciam unam.

Ab igne semotis, insperge

Pulveris Mastiches, . . . . } ana drachmas  
 Radicis Consolidae }  
 Majoris. . . } duas et semis,  
 Fructuum Cupressi unciam unam,  
 Boli Armenicae, . . . . } ana se-  
 Lapidis Haematites laevigatorum } munciam.  
 Misce exactè et fiat Emplastrum S. A.

### EMPLASTRUM RESINARUM GLUTINANS.

(*Andreae à Cruce.*)

R $\acute{e}$ . Resinae Communis uncias sexdecim,  
 Elemi uncias quinque,  
 Terebinthinae, . . . . } ana uncias duas,  
 Olei Olivarum. . . . }  
 Cerae Albae unciam unam.  
 Liqua, cola et fiat Emplastrum.

### EMPLASTRUM ASSAEFOETIDAE MATRICALIS.

R $\acute{e}$ . Terebinthinae uncias duas,  
 Cerae Citrinae uncias octo.  
 Leni igne liquatis et colatis, adde  
 Galbani in Aceto soluti et ad Extracti mol-  
 lis densitatem cocti uncias tres.  
 Agita spathulâ ligneâ ad perfectam mix-  
 tionem, et semirefrigeratis, adde sequentia  
 in pulverem redacta, scilicet  
 Thuris, . . . . } ana unciam unam,  
 Assaefoetidae. . . . }  
 Myrrhae unciam semis,  
 Anime drachmas sex,

Castorei, . . . . }  
 Seminis Cumini. . . } ana drachmas tres,

Misce, fortiter agitando, et sub finem  
 adde Olei Succini drachmas duas.

### EMPLASTRUM GALBANI SIMPLEX.

R̄. Terebinthinae uncias quinque,

Cerae Citrinae uncias octo.

Liquatis et colatis, adde

Galbani in Aceto soluti et inspissati libram  
 unam.

Fiat ex Arte Emplastrum.

### EMPLASTRUM GALBANI CROCATUM.

R̄. Galbani Aceto soluti et inspissati uncias sex,

Emplastri Meliloti Compositi, } ana uncias  
 Oxydi Plumbi Mucilag. } quatuor,

Cerae Citrinae uncias duas,

Terebinthinae unciam unam,

Pulveris Croci drachmas sex.

Emplastris, Terebinthinae et Cerae simul  
 liquatis adde Galbanum et Crocum. Mate-  
 riam agita post semirefrigerationem; forma  
 cylindros et conserva ad usum.

### EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

R̄. Cerae Albae uncias quatuor,

Spermatis Ceti, . . . }  
 Emplastri Oxydi Plumbi } ana uncias duas,  
 Mucilaginei. . . . }

Olei Amygdalarum Dulcium unciam semis.

Liqua, cola et fiat Emplastrum S. A.



## EMPLASTRUM MELILOTI SIMPLEX.

Rx. Summitatum floridarum Meliloti recentium  
libras quatuor.

Incisas et contusas immite in

Sebi Hircini liquefacti libras quinque.

Coque leni igne ad totius ferè humidita-  
tis exhalationem. Cola et exprime; tunc adde  
Resinae Communis libras octo,  
Cerae Citrinae libras quatuor.

Fiat Emplastrum S. A.

## EMPLASTRUM MELILOTI COMPOSITUM.

Rx. Emplastri Meliloti Simplicis libras tres,  
Terebinthinae uncias sex.

Ignе lento liquescant et adde

Pulveris Flor. Chamomillae,	} ana uncias tres,
Meliloti. . . . .	

Radicis Ireos,	} ana unciam unam,
Althaeae	

Pulveris Croci unciam semis,

Gummi Ammoniaci,	} ana uncias duas,
Bdellii, . . .	

Seminis Foenigraeci unciam unam.

Fiat Emplastrum S. A.

## EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

(*Spispasticum, seu Vesicatorium.*)

Rx. Cerae Citrinae, . . .	} ana uncias duas,
Colophoniae,	
Terebinthinae. . . . .	

Olei Euphorbii unciam unam,

Ignе liquatis, adde



Pulveris Cantharidum uncias tres.

Fiat Emplastrum S. A.

### EMPLASTRUM GALBANI ROBORANS.

(*Scutum pro umbilico.*)

R̄. Assaefoetidae, . . . } ana drachmas duas.  
Galbani. . . . . }

Cum sufficienti quantitate Tincturae Alcoholicae Castorei misceantur et in alutam extendantur, ut fiat Scutum orbiculare.

Extemporaneè fieri debet.

### TELA EMPLASTRICA EPULOTICA.

(*Sparadrapus Pallidus.*)

R̄. Emplastri Oxydi Plumbi Epulotici libras duas,

Cerae Citrinae libram semis.

Ignē lento liquatis, immerge lintea, quae distracta, refrigerata et cultello corrasa, supra porphyritem pistillo vitreo expolies.

### TELA ICHTHYOCOLLAE GLUTINANS.

(*Vulgò Tafetan de Inghlaterra.*)

R̄. Ichthyocollae minutim sectae uncias duas.

Digere per viginti quatuor horas in Aquae libris duabus et semis. Coque, ut dissolvatur, et cola per linteum cum expressione. Vapora ad mellis consistentiam. Tunc illâ satis adhuc calenti telam sericeam rarioris texturae, probè tensam, penicillo obducito. Ichthyocollâ leni igne exsiccâtâ operationem saepius repete. Postremò Tincturâ Balsami

Tolutani Alkohole Vini extractâ eandem te-  
lam bis inunge, eamque post perfectam in  
aëre exsiccationem in cylindros convolutam  
serva.

## C A P U T X X V I.

### C A T A P L A S M A T A.

#### CATAPLASMA MICAE PANIS ANODINUM.

℞. Micæ Panis albi uncias sex,  
Lactis uncias sexdecim.

Coque igne lento ad pulmenti spissitudi-  
nem. Ab igne semotis, admisce  
Vitellos Ovorum quatuor,  
Pulveris Croci drachmam unam.

Habebis Cataplasmatidis libras duas.

#### CATAPLASMA CRUSTAE PANIS ACE- TOSUM.

℞. Crustae Panis torrefacti uncias quatuor.

Macera in Aceto optimo ad molitiem.

Pinsito in mortario lapideo. Adde

Pulveris Mastiches, . . .	} ana drachmas
Menthae,	
Fructuum Cupressi,	
Restrictivi. . . .	
	} duas,

Olei Rosati uncias tres,

His admisce sufficientem farinae Hordei  
quantitatem ut fiat Cataplasma,

## CATAPLASMA FERMENTI PANIS THERIACALE.

*(Ad singultum.)*

R̄. Fermenti Panis acerrimi uncias tres,  
 Electuarii Theriacalis Magni unciam semis,  
 Pulveris Fructuum Juniperi, } ana drachmas  
 Rosarum Rubrarum, } duas,  
 Foliorum Menthae. }  
 Caryophyllorum, } ana drachmam  
 Nucis Moschatae, } unam.  
 Macis. . . . }

Cum S. Q. Aceti Rosarum fiat Cataplasma.

## CATAPLASMA FARINAE HORDEI.

*(Farinaceum.)*

R̄. Farinae Hordei libras duas,  
 Oxymellis Simplicis libras tres,  
 Pulveris Boli Armenicae uncias quatuor.  
 Misce et igne lento calefiant, spathulâ  
 frequenter agitando.

## CATAPLASMA ALTHAEAE EMOLLIENS.

R̄. Radicis Althaeae incisae uncias decem.

Coque in Aquae Q. S. ad mollitiem. Adde  
 Foliorum Malvarum uncias quatuor.

Bulliant iterum ad humiditatis ferè consumptionem. Contunde et pulpae per setaceum equinum trajectae admisce

Axungiae Snillae uncias duas,

Vitellos Ovorum duos.

Habebis Cataplasmatibus libras duas.

## CATAPLASMA NIDI HIRUNDINIS.

℞. Nidi Hirundinis ritè pulverati uncias quatuor,  
 Radicis Althaeae, . . . . . } ana unci-  
 Foliorum recentium Malvarum. } as tres,  
 Ebuli. . . . . }

Coque in Aquae libris quatuor ad humiditatis ferè consumptionem. Contunde et per cribrum equinum pulpam trajice, sub finem addendo.

Farinae Seminis Lini, } ana uncias duas,  
 Axungiae Suillae . . . }  
 Pulveris Croci drachmam unam.

Misce ad usum.

## CATAPLASMA SINAPIS DISCUTIENS.

(*Sinapismus ad plantas pedum.*)

℞. Fermenti acris unciam unam et semis,  
 Pulveris Seminis Sinapis uncias quatuor,  
 Muriatis Ammoniaci drachmam unam,  
 Herbae recentis Rutae contusae unciam semis,  
 Aceti optimi quantum sufficiat,  
 Ut ex mixtione omnium fiat pasta mollis.

## CAPUT XXVII.

## VINA.

## VINUM ABSINTHII.

℞. Summitatum Absinthii siccarum (et incisarum uncias duas,

Vini Albi optimi libras quatuor.

Infunde per biduum et filtra.

*Dosis ab uncia ad uncias quatuor.*

Ita fiunt Vina ex aliis vegetabilibus.

## VINUM FRUCTUUM CUPRESSI COM- POSITUM,

*(Stypticum.)*

℞. Fructuum Cupressi viridium unciam unam  
et semis,

Corticis Granatorum,

Foliorum Rorismarini,

Myrti,

Florum Rosarum Rubra-

rum siccarum,

Balaustiorum. . . .

} ana unciam semis.

Contusa digere mediocri igne per biho-  
rium in Vini Rubri optimi libris duabus.  
Cola cum expressione.

## VINUM ANTIMONIALE,

*(Emeticum.)*

℞. Vini Albi optimi libram unam,

Tartratis Potassae Antimonialis scrupulum  
unum.

Dissolve. Ex tempore fieri debet.

*In singulis unciiis continet Tartratis Potassae  
Antimonialis grana duo.*

*Dosis interne ad uncias tres.*



## VINUM OXYDI ANTIMONII.

*(Emeticum turbidum.)*

Rx. Oxydi Antimonii Semivitrificati laevigati  
 uncias tres,

Vini Albi optimi libras duas.

Digere in matraccio et serva. Ad ejus  
 vero usum agitari debet, si forte in schedu-  
 lis turbidum pro clysteribus praescriptum  
 fuerit.

## CAPUT. XXVIII.

## ACETUM.

## ACETUM CAMPHORAE ANTISEPTICUM.

*(Quatuor Latronum.)*

Rx. Summitatum siccarum	} ana unciam unam et semis,
Absinthii,	
Rorismarini,	
Salviae,	
Menthae,	
Rutae, . . .	}

Florum Lavendulae siccatorum uncias duas,

Alliorum drachmas duas,

Piperis Tabasci unciam unam.

Omnia contusa in Aceti optimi libras  
 octo digere calore solis, vel igne arenae in  
 matraccio obturato per duodecim dies. Cola.  
 fortiter exprime et filtra; tunc adde  
 Camphorae Spiritu Vini solutae semiunciam.

## -ACETUM CYPERI LONGI AROMATICUM.

*(Hispalense.)*

℞. Radicis Cyperi Longi libras duas,  
 Florum Rosarum Rubrarum uncias novem,  
 Summitatum Rorismarini, } ana unciam unam  
                   Thymi,                    } et semis,  
                   Lavendulae

Seminum Meliloti libram unam et semis,  
 Piperis Tabasci uncias duas,  
 Benzoini unciam semis.

Incisa et contusa infunde in Aceti optimi libris decem. Digere, distilla ex retorta vitrea donec liquor stillans empyreumaticum spiret odorem, et vase rite clauso serva.

## ACETUM ROSARUM.

℞. Rosarum Rubrarum exungulatarum et siccarum libram unam,  
 Aceti Albi optimi libras octo.

Insola in vase leviter obturato per aliquot dies, vel si mavis, in balneo aquoso spatio aliquot horarum: cola sine expressione et adde, ne muscescat, Alkoholis Vini uncias duas.

Simili modo parantur Aceta,

*Ex Herbis,*

*Floribus,*

*Summitatibus Herbarum.*

## ACETUM SCYLLAE.

℞. Squamarum Scyllae recens exsiccatarum et in fructula incisarum libram unam,

Aceti optimi libras sex.

Immissa in vas vitreum obturatum digere leni calore per viginti quatuor horas. Li-  
quorem exprime, à faecibus per subsidentiam  
separatum decanta et adde Alkoholis Vini  
uncias tres. Repone in vase vitreo, leviter  
clauso, per quindecim dies pro conficiendo  
Oxymelle Scyllitico.

*Dosis à semuncia ad uncias tres.*

### ACETUM COLCHICI.

℞. Bulborum recentium Colchici uncias sex,  
Aceti Albi optimi libras sex.

Infunde, cola et repone ut in Aceto  
Scyllae diximus.

Pro Oxymelle Colchico conficiendo prae-  
sertim deservit.

## C A P U T X X I X.

### A L K O H O L I A.

(SPIRITUS ARDENTES DISTIL.)

ALCOHOL HELENII COMPOSITUM.

(*Spiritus Carminativus.*)

℞. Radicis Helenii, . . .	} ana unciam semis,
Carlinae. . . .	
Summitatum Rorismarini, )	} ana uncias qua-
Majoranae. )	

Fructuum Lauri, . . . .	} ana unciam unam,
Summitatum Foeniculi,	
Seminum Carvi,	
Anisi. . . . .	} ana unciam semis,
Piperis Tabasci, . . . .	
Cinnamomi. . . . .	

Flavedinis recentis Aurantium drachmas tres.

Contusis, affunde Alkoholis Vini Communis libras tres. Digere vase clauso per biduum et distilla balneo aquoso, cavendo ab empyreumate.

*Dosis à drachma ad drachmas tres.*

### ALKOHOL RORISMARINI.

*(Aqua Reginae Hungariae.*

Rx. Summitatum floridarum Rorismarini recentium libras decem,

Alkoholis Vini Communis libras viginti.

Macera per dies aliquot et distilla balneo aquoso ad libras decem.

*Dosis interne à scrupulo ad drachmam.*

### ALKOHOL COCHLEARIAE.

*(Spiritus Cochleariae.)*

Rx. Cochleariae recentis seu Foliorum Lepidii libram unam,

Alkoholis Vini libras quatuor.

Infunde per viginti quatuor horas et distilla balneo aquoso ad dimidias.

## ALKOHOL CINNAMOMI.

R̄. Corticis Cinnamomi Manilensis contusi uncias sex,

Vini optimi libras tres.

Fiat maceratio per triduum in vase bene obturato et distilla ad libram unam, quam ad usum in vase obturato serva.

*Dosis ad drachmas duas.*

## ALKOHOL MELISSAE COMPOSITUM.

(*Aqua Carmelitana.*)

R̄. Foliorum Melissa recentium uncias octo,  
 Flavedinis recentis Limonum, } ana uncias  
 Aurantiorum } duas,

Nucis Moschatae, . . . . } ana unciam unam,  
 Seminis Coriandri. . . . }  
 Cinnamomi unciam semis.

Incisa et contusa macera per viginti horas in Alkohlis Vini Communis libris quatuor et distilla balneo aquoso ad dimidias.

*Dosis à scrupulo ad drachmam.*

## ALKOHOL SALVIAE VULERARIUM.

(*Aqua Vulneraria Spirituosa.*)

R̄. Foliorum Betonicae, . . }  
 Agrimoniae, } ana libram unam,  
 Artemisiae. . }

Foliorum et Summitatum Salviae }  
 Hyperici, } ana uncias  
 Tanaceti, } octo,  
 Absinthii, }  
 Menthae. . }



Scordii, }  
Majoranae, } ana uncias  
Rorismarini } quatuor.  
Lavendulae }

Concide et digere per quatriddum loco calido in Vini Albi libris triginta duabus. Distilla balneo aquoso ad dimidias.

### ALKOHOL CORTICUM AURANTIORUM.

Rx. Flavedinis recentis Aurantiorum libras tres, Vini optimi libras sex.

Digere per triduum et distilla ad libras duas S. A.

*Dosis ad drachmas duas.*

Sic distillatur

*Alkohol Corticum Citrei et similium.*

### ALKOHOL VINI COMMUNE.

*(Aqua Vitae Rectificata.)*

Rx. Vini optimi quantum volueris.

Distilla ex alembico, donec prodiens liquor, attactu flammae non accendatur. Distillatum liquorem rectifica, excipulum aliquoties renovando. Liquores elicitos tali inter se proportionem misce, ut Alkoholis et phlegmatis partes aequales contineat.

### ALKOHOL VINI.

*(Spiritus Vini Retificatissimus.)*

Rx. Alkoholis Vini Communis libras decem.

Distilla balneo aquoso, quousque vas Aquae Distillatae unciam continens, liquo-

ris elicti drachmas sex et grana quinquaginta tria, nec amplius, capiat.

### ALKOHOL VINI CAMPHORATUM.

(*Aqua Vitae Rectificata Camphorata.*)

R $\acute{x}$ . Alkoholis Vini libram unam,

Camphorae unciam semis.

Dissolve.

### ALKOHOL CAMPHORAE SAPONACEUM.

(*Linimentum Saponaceum.*)

R $\acute{x}$ . Alkoholis Vini libram unam,

Saponis Albi uncias duas,

Camphorae drachmas sex.

Solve S. A. et serva ad usum.

### ALKOHOL SULPHURICUM.

(*Spiritus Vitrioli Dulcis.*)

R $\acute{x}$ . Acidi Sulphurici uncias quatuor,

Alkoholis Vini uncias duodecim.

Instilla Acidum Alkoholi in matraccio, et relinque in digestionem vase cooperto per octiduum identidem agitando.

*Dosis à guttis octo ad scrupulum.*

### ALKOHOL SULPHURICUM AETHEREUM.

(*Liquor Anodynus Mineralis.*)

R $\acute{x}$ . Alkoholis Vini unciam unam,

Aetheris Sulphurici uncias quatuor. Misce

*Dosis à scrupulo ad drachmam.*

## ALKOHOL MURIATICUM AETHEREUM.

*(Spiritus Salis dulcis.)*

R $\acute{e}$ . Acidi Muriatici libram unam,  
Alkoholis Vini libras duas.

Digere in retorta vitrea et distilla balneo arenae feré ad siccitatem. Liquorem iterata ad siccitatem distillatione serva.

*Dosis à guttis decem ad scrupulum.*

## ALKOHOL NITRICUM AETHEREUM.

*(Spiritus Nitri dulcis.)*

R $\acute{e}$ . Acidi Nitrici libram unam,  
Alkoholis Vini libras duas.

Procede in distillatione ut supra.

*Dosis à semisrupulo ad scrupulum.*

## AETHER SULPHURICUS.

R $\acute{e}$ . Alkoholis Vini libras sex,  
Acidi Sulphurici libras septem.

Instilla paulatim Acidum supra Alkohollem in retorta vitrea exceptum, mixturam per intervalla agitando. Retortam tubulatam in balneo arenae prius calefacto colloca. Receptaculum admove, et mediocri igne distilla liquoris uncias circiter tres: quibus semotis, apta aliud receptaculum amplum, foraminulo exactè obturato supernè pertusum, et linteo madefacto saepius renovando coopertum, seu potius duo excipula, primum cum altero posterius communicans,

Codex medic. Europ. Sect. VI. p. I. N

commissuris Micâ Panis cum Aqua subactâ rite clausis. Distilla ebullientem liquorem, donec in utrumque excipulum triginta, aut triginta duae unciae transierint; quod eveniet, antequam vapores sulphurei percipi incipiant ex foraminulo, quem identidem inter distillandum reserabis, ut gases avolent, qui Aetheris condensationem impedirent. Vasis refrigeratis liquori distillato, et ab aquâ acidulâ per infundibulum separato adde Calcis pridie Aquae ope in pulverem exstinctae unciam semis; et ex retortâ lampadis igne, seu lenissimo calore in receptaculum amplum, juncturis obseratis, distilla octodecim, vel viginti Aetheris siccissimi uncias.

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.*

N. B. Si residuo primae distillationis post refrigerationem, Alkoholis purissimi libras sex per syphonem retortae addideris et distillationem, ut antea prosequeris, libram unam Aetheris Sulphurici et libras duas Alkoholis Sulphurici Aetherei Hoffmani per rectificationem obtinebis.

### AETHER ACETICUS.

**Rx.** Acetatis Plumbi exsiccati uncias sexdecim,  
Acidi Sulphurici uncias sex,  
Alkoholis Vini uncias decem.  
Mitte Acetatem Plumbi in retortam vitream tubulatam, quam in balneo arenae collocabis, aptans illius collo recipientem



tubulatum quòcum alius communicabit, et juncturas claude Micâ Panis Aqua subactâ: Sali adde Acidum Sulphuricum per tubum retortae, deinde Alkoholem; tuncque moderato igne ad distillationem perge, cum Aquâ recipientes frigefaciendo quoad liquidi decem uncias obtinueris: hoc misce cum semiuncia Potassae Purae solutae in duabus vel tribus unciis Aquae. Distilla rursus leni igne usquedum septem, aut octo unciae Aetheris Acetici eveniant.

## C A P U T X X X.

### T I N C T U R A E.

#### TINCTURA ALKOHOLICA ALOES COMPOSITA.

(*Elixir Proprietatis.*)

R̄. Aloes optimae, . . . } ana unciam unam,  
Myrrhae. . . . . }  
Croci minutim incisi unciam semis,  
Alkoholis Vini libram unam et semis.

Digere per octiduum in vase vitreo ritè obturato, identidem vas agitando. Tincturam filtra.

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.*

#### TINCTURA ELASTICA.

Vide *PRAEPARATA EX FERRO.*

#### TINCTURA VINOSA FERRI TARTARISATA.

R̄. Limaturae Ferri nitidae uncias octo,  
N 2



Tartari uncias sexdecim,  
Aquae libras sexdecim.

Coque in vase ferreo, assiduè spathulâ  
agitando per horas duodecim et addendo  
Aquae ferventis quod sufficiat. Tunc liquo-  
rem decanta, filtra et in vase fictili vitreato  
ad Extracti mollioris spissitudinem vapora.  
Tunc sume

Hujus massae salinae uncias tres,  
Vini Albi libram unam,  
Alkoholis Vini Communis unciam semis.

Digere per octiduum et filtra.

*Dosis à drachma ad drachmas duas.*

## TINCTURA ALKOHOL-SULPHURICA GEN- TIANAE COMPOSITA.

*(Elixir Vitrioli Dulcis.)*

R̄. Cinnamomi Manilensis, . . . ana unciam  
Flavedinis Aurantium siccatae } unam,  
Radici Gentianae uncias duas,

Pulveratis, adde

Alkoholis Sulphurici libram unam.

Digere per quatrimum et filtra.

*Dosis à guttis octo ad scrupulum.*

## TINCTURA AQUOSA LACCAE.

R̄. Laccae purae tritae unciam unam,  
Sulphatis Aluminae unciam semis,  
Aquae Rosarum libras duas.

Digere in vase vitreo et liquorem, ubi  
rubicundissimus apparebit, filtra.

## TINCTURA ALKOHOLICA LACCAE.

*(Laccae Spirituosa.)*

℞. Laccae purae tritae unciam unam,  
 Sulphatis Aluminae in Aqua soluti drachmam  
 unam et semis,  
 Alcoholis Cochleariae, aut Lepidii uncias  
 octo.  
 Digere in vase circulatorio. Tincturam  
 saturatè rubentem filtra.

## TINCTURA ALKOHOLICA OPII.

*(Paregorica.)*

℞. Opii secti uncias duas,  
 Croci minutim incisi unciam semis,  
 Cinnamomi Manilensis contusi drachmas duas,  
 Alcoholis Vini Communis, } ana uncias duode-  
 Aquae. . . . . } cim.

Digere per octiduum et filtra.

*Dosis ad scrupulum.*

*In singulis scrupulis continet Opii grana duo.*

## TINCTURA VINOSA OPII SYDENHAMI.

*(Laudanum Liquidum.)*

℞. Opii electi incisi, aut contusi uncias duas,  
 Croci unciam unam,  
 Cinnamomi, . . . . . }  
 Caryophyllorum Aromati- } ana drachmam  
 corum. . . . . } unam.

Omnia contusa mitte in matracium vi-  
 treum et digere per mensem in Vini Albi

optimi libra una et semis, dein cola et vase diligenter obturato serva.

*Dosis à guttis sex ad scrupulum.*

### TINCTURA AQUOSA RHABARBARI.

Vide *DECOCTIONES*.

### TINCTURA ALKOHOLICA OPII SAPONACEA.

(*Balsamum Anodynum.*)

℞. Saponis Albi unciam unam,

Opium unciam semis,

Camphorae drachmas sex,

Croci drachmam unam.

Incisa digere vase clauso per octiduum in Alkoholis Vini Communis sesquibrâ et cola.

*In singulis unciiis continet Opii grana sexdecim.*

### TINCTURA CORTICUM AURANTIORUM COMPOSITA.

(*Elixir Stomachicum.*)

℞. Flavedinis Aurantium, } ana unciam unam  
Quinae. . . . . } et semis,

Summitatum Absinthii, }  
Florum Chamomillae, } ana unciam unam,  
Piperis Tabasci. . . . }

Coccinellae drachmam semis.

Tere et in Aquae libra una et semis, Alkoholisque Vini Communis unciiis quatuor digere per triduum et filtra..

*Dosis à semidrachma ad drachmam.*

## TINCTURA ALKOHOLICA SUCCINI.

R. Succini Flavi subtilissimè pulver. uncias duas,  
Alcoholis Vini uncias duodecim.

Digerè in vase vitreo optimè clauso, donec Tinctura extrahatur. Filtra.

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.*

Simili modo fit Tinctura

*Castorei,*

*Myrrhae,*

*Assaefoetidae,*

*Benzoini,*

*Ligni Aloes*

*Kermes,*

*Aloes et similia.*

## TINCTURA VINOSA OPII ANTICOLICA.

(*Anticolica ex Palacios.*)

R. Opii secti uncias duas,

Radicis Zedoariae unciam unam,

Carlinae, . . . . } ana unciam semis,  
Galangae. . . . }

Acori Veri, . . . . . } ana drach-  
Flavedinis Aurantiorum, } mas duas,  
Citrei, siccorum. . . }

Seminis Anisi, . . . . } ana drachmas  
Carvi, } duas.  
Florum Chamomillae. . . }

Caryophyllorum Aromaticorum, } ana semi-  
Fructuum Lauri, } drachm.  
Juniperi. . . . }

Macis drachmam unam.



Contusa macerentur in matraccio vitreo per dies octo in Vini Albi optimi libris tribus; postea filtra et serva.

*Dosis ad scrupulos duos.*

### TINCTURA RADICIS PYRETHRI ODN- TALGICA.

℞. Radicis Pyrethri drachmas sex,  
Scobis Ligni Guajaci uncias duas,  
Sassafras unciam unam,  
Foliorum Nicotianae drachmas tres,  
Summitatum Thymi, . . } ana drachmas duas,  
Origani. . . }  
Caryophyllorum Aromaticorum drachmam  
unam,  
Camphorae, . . . }  
Opii. . . . . } ana semidrachmam.

Incisa et confusa macerentur per duodecim dies in Alkoholis Vini Communis libris tribus; postea cola et usui serva.

*Usus externus.*

### TINCTURA ALKOHOLICA CANTHARIDUM.

℞. Pulveris Cantharidum unciam semis,  
Coccinellae drachmam unam,  
Alkoholis Vini libras tres.

Digere per dies octo continuè agitando; dein adde

Ambrae Gryseae drachmiam semis,  
Alkoholis Cinnamomi uncias tres.

Digestio continuetur per dies tres et filtretur ad usum.

*Usus externus.*



## TINCTURA ALKOHOLICA HYPERICI VULNERARIA.

(*Balsamum Catholicum.*)

℞. Florum Hyperici seminibus onu-  
storum et siccorum, } ana unciam  
Radiceis Acori, contusorum. } semis,  
Alcoholis Vini Communis libras tres.

Digere loco calido in vase clauso per aliquot dies, identidem agitando. Tunc adde sequentia trita:

Benzoini uncias tres,  
Styracis, . . . . . }  
Balsami Tolutani. . . } ana uncias duas,  
Gummi Myrrhae unciam semis.

Digere iterum et cola.

*Usus plerumque externus.*

*Dosis interne à guttis sex ad scrupulum semis.*

## TINCTURA ALKOHOLICA QUINAE COMPOSITA.

(*Alexipharmaca Huxham.*)

℞. Quinae Loxae pulveratae uncias duas,  
Flavedinis Aurantiorum semiunciam,  
Radiceis Serpentariae Virginianae drach. tres,  
Croci scrupulos quatuor,  
Coccinellae scrupulos duos,

Contusa macerentur vase clauso per dies quatuor in Alcoholis Vini Communis unciis sexdecim; postea filtra et serva ad usum.

*Dosis ad semunciam.*

## TINCTURA VINOSA EXTRACTI ABSINTHII COMPOSITA.

(*Elixir Bals. Temp. Hoffm.*)

℞. Extractorum Absinthii, . . . . } ana unciam  
                   Cardui Benedicti. } unam,  
       Extractorum Centaurii Minoris, } ana unciam  
                   Radiciſ Gentianae, } unam.  
 Flavedinis Aurantium uncias quatuor,  
 Vini optimi libras duas,  
 Alcoholis Corticum Aurantium uncias duas.

Digerantur per dies tres, materiem agitando ad solutionem Extractorum; poſtea filtra et ſerva.

*Dosis à drachma una ad drachmas duas.*

## TINCTURA ALKOHOLICA MYRRHAE UTERINA,

(*Essentia Antihisterica.*)

℞. Myrrhae electae, . . . . }  
       Assaefoetidae,                   } ana drachmam  
       Crocī,                               } unam et semis,  
       Castorei. . . . . }  
       Camphorae drachmam unam,  
       Carbonatis Ammoniaci Crystallisati drachmas duas,  
       Olei Distillati Succini drachmam semis,  
       Alcoholis Vini uncias octo.

Fiat omnium Tinctura S. A. quam filtra et usui ſerva in vase ritè clauso.

*(Dosis à guttis duodecim ad viginti.)*

## TINCT. ALKOHOLICA CORTIC. AURANTIOR. WHIT.

(Roborans Whit.)

R̄. Flavedinis Aurantium uncias quatuor,  
 Quinae Loxae uncias duas,  
 Radicis Gentianae unciam unam.

Contusa macerentur per horas viginti-quatuor in Alkoholis Vini libris duabus; postea filtra et serva ad usum.

*Dosis ad drachmas duas, vel quatuor.*

## TINCTURA ALKOHOLICA PICIS GRAECAE COMPOS.

(Balsamum de Salazar.)

R̄. Picis Graecae unciam semis,  
 Thuris optimi, . . . }  
 Mastiches, } ana unciam unam.  
 Aloes Succotrinae. }

Contusa digerantur matraccio vitreo satis amplo, optimè clauso per dies viginti in Alkoholis Vini libris quinque; postea filtra et serva.

*Usus externus.*

## CAPUT XXXI.

## AQUAE,

## AQUA CORTICUM CITREI.

R̄. Flavedinis Citrei, seu Limonis libram unam,  
 Aquae libras sex.

Macera per biduum et distilla ad libras tres.

Eodem modo distillatur Aqua  
*Corticum Aurantiorum.*

### AQUA ROSARUM.

R̄. Petalorum recentium Rosae Pallidae libras sexdecim,

Aquae libras quadraginta.

Macera per biduum, aut quousque fermentescere incipiat et distilla ad libras viginti. Adde Alkoholis Vini unciam unam.

Pari ratione distillantur Aquae

*Florum Aurantiorum,*  
*Sambuci et similium.*

### AQUA CINNAMOMI LACTICINOSA.

R̄. Cinnamomi crassiusculè triti uncias octo,  
Aquae libras tres,

Alkoholis Vini uncias tres,

Digere in vase vitreo rite clauso per viginti quatuor horas. Adde Aquae libram unam. Distilla libras tres.

*Dosis à drachma ad semunciam.*

### AQUA CORTICUM CITREI LACTICINOSA.

*(Essentialis.)*

R̄. Flavedinis recentis Citrei, seu Limonis libras tres,

Aquae libras sex,

Alkoholis Vini uncias quatuor.

Digere per biduum et distilla balneo aquoso ad libras tres.

Ita distillatur Aqua Lacticinosa

*Corticum Aurantiorum,*

*Seminum Anisi,*

*Foeniculi et similia.*

### AQUA ACIDI CARBONICI.

R. Phialam vitream libris sex Aquae Distillatae repletam. Manu orificium comprime, invertē et apparatus hydro-pneumatico subijce. Tunc Acido Carbonico è Creta Alba, seu ex Marmore per Acidum Sulphuricum Aquosum extracto, praedictae phialae cavitatem imple ad duas tertias partes, depulsâ interea tantidem Aquae mensurâ, seu libris quatuor, ut gas ejus locum repleat. Remove dein et agita donec Aqua Acidum Carbonicum absorbeat. Postea mitte Aquam phialae in aliud excipulum vitreum (trium Aquae librarum capax) gase acido carbonico repletum; agita ut permisceantur et in vase idoneo ritè obturato in frigido loco serva.

### AQUA ACIDI CARBONICI CAMPHORATA.]

R. Aquae Acidi Carbonici libras duas,  
Câmphorae tritae grana sex.

Agita par intervalla ad Câmphorae solutionem et serva ut in Aqua praecedenti praescribitur.



## AQUA CARBONATIS POTASSAE ACIDULA.

*(Lithontriptica.)*

℞. Carbonatis Potassae neutri drachmas tres.

Immitte in Aquae Acidi Carbonici libras duas et agita ad solutionem.

AQUA SULPHATIS FERRI ET MAGNESIAE.  
ANTIMONIALIS.*(Ex Bañares.)*

℞. Sulphatis Magnesiae drachmas tres,

Tartratis Potassae Antimonialis gr. unum,

Sulphatis Ferri grana sex,

Tartratis Potassae et Sodae scrupulum semis,

Aquae libras quatuor.

Solve et filtra S. A. Extemporaliter fieri debet.

*Dosis semilibra.*

## AQUA SUCCORUM VEGETABILIVM VULNERARIA.

*(Pontificalis.)*℞. Succi Betonicae, } singulorum uncias sex,  
Millefolii. }Succi Origani, . . }  
Pimpinellae, }  
Sempervivi, } singulorum uncias sex,  
Saniculae, }  
Verbenae. }

Mari Cortusi uncias tres,

Carbonatis Potassae Tartari, }  
Salis Communis. . . . } ana unc. sex,

Tartratis aciduli Potassae uncias quatuor,  
 Aloes Succotrinae unciam unam,  
 Aceti Distillati libram unam.

In Aceto solve Aloem, in Succo Betonicae Salem Communem, in Succis Millefolii et Verbenae Carbonatem Potassae et in Pimpinellae Succo Tartratem acidulum dilue. Tunc misceantur omnia in retorta vitrea, suoque cum receptaculo, commissuris clausis, digere per dies tres, dein distilla ad siccitatem. Liquor elicited cum residuo prius pulverato dilue, iterumque distilla. Id ubi ter perageris, liquorem distillatum tantisper empyreumaticum in vase vitreo servabis ad usum.

### AQUA SULPHATIS ALUMINAE.

(*Aluminosa.*)

℞. Aquae Rosarum libram unam et semis,  
 Sulphatis Aluminae drachmam unam.  
 Dissolve. Extemporaliter fieri debet.

### AQUA CUPRI AMMONIACALIS.

(*Caelestis.*)

℞. Aquae Distillatae libram unam,  
 Muriatis Ammoniaci, . . . . } ana drachmam  
 Carbonatis Potassae Tartari } unam.

Solve et in pelvi aenea relinque, donec colorem caeruleum adquisierit. Filtra et vase vitreo rite obturato serva.

## AQUA MURIATICO MERCURIALIS RUBRA.

*(Phagedaenica.)*

R̄. Muriatis Oxygenati Hydrargyri Sublimati  
scrupulum unum,

Carbonatis Potassae Tartari drachm. unam,  
Aquae Distillatae libram unam.

Tere in mortario vitreo et sensim affunde  
Aquam. Extemporaliter fieri debet.

## AQUA SULPHATIS ZINCI ALUMINOSA.

*(Styptica.)*

R̄. Sulphatis Zinci, . . . } ana unciam semis,  
Aluminae. }

Aquae Rosarum libram unam.

Dissolve et filtra. Extemporaliter fieri  
debet.

## AQUA ACETATIS PLUMBI.

*(Vegeto-mineralis.)*

R̄. Acetatis Plumbi liquidi drachmam unam,  
Alkoholis Vini drachmas duas,  
Aquae Distillatae libram unam.

## AQUA CALCIS.

R̄. Calcis recentis libram unam.

Sensim affunde

Aquae libras duodecim.

Post ebullitionem completam et debitam  
subsidentiam liquorem decanta et vase vitreo  
diligentissimè obturato serva, renovandum,  
simulac inefficax deprehendatur.

## C A P U T X X X I I .

### M I X T U R A E .

#### MIXTURA OPII ASTRINGENS SYLVII.

(*Ad Vomitum Sanguinis.*)

R̄. Aquae Distillatae uncias duas et semis,  
Aceti Distillati unciam semis,  
Opii puri pulverati grana duo.

Dissolve et adde

Corallii Rubri laevigati drachmam semis,  
Pulveris Catechu scrupulum semis,  
Syrupi Simplicis unciam unam.

*Dosis uncia semis per intervalla iteranda.*

*In singulis unciis continet Opii granum semis.*

#### MIXTURA CARBONATIS POTASSAE ABSINTHII.

(*Antiemetica.*)

R̄. Aquae unciam unam,

Lacticinosae Cinnamomi drachmam  
unam,

Carbonatis Potassae Absinthii drach. semis,  
Succi Limonum recentis drachmas. sex.

Misce et sumat Aeger vigente adhuc Mix-  
turae effervescentia.

*Pro unica Dosi.*

#### MIXTURA RESINAE COPAYBAE D. FULLER.

(*Mixtura Balsamica.*)

R̄. Resinae Copaybae unciam semis,

Codex medic. Europ. VI. p. I.

O

Vitellorum Ovorum duo,  
 Vini Albi optimi uncias octo,  
 Syrupi Simplicis uncias duas.

Resina cum Vitellis Ovorum in mortario  
 diu agitetur Vinum paulatim iustillando; post-  
 ea adde Syrupum, ut fiat optima mixtura,  
 Emulsionis instar; cola et conserva.

*Dosis ad uncias duas.*

### MIXTURA MOSCHATA.

*(Julapium Moschatum.)*

℞. Florum Naphae, . . .	} ana scrupulum unum.
Caryophyllorum Aromatic.	
Croci minutim incisi. . . .	

Infunde per horam in Aquae libra una.  
 Colaturae adde

Moschi, et Ambrea Gryseae cum Carbonatis  
 Ammoniaci Cornu Cervi grano uno si-  
 mul tritorum ana grana duo,  
 Confectiones Santalorum Cordialis drachmas  
 duas;

Syrupi Simplicis unciam unam et semis.

*Dosis unciae tres per intervalla iterandae.*

### MIXTURA CAMPHORATA.

*(Julapium Camphoratum.)*

℞. Aquae Melissae uncias sex,  
 Camphorae grana sex,  
 Mellis Sambuci unciam unam et semis.  
 Misce S. A.

*Dosis ab unciis duabus ad tres.*



## MIXTURA GUMMI AMMONIACI.

*(Emulsio Brunneri.)*

R̄. Gummi Ammoniaci drachmam unam et semis,  
 Aquae Hyssopi uncias quatuor,  
 Vini Albi optimi uncias duas.

Subige, dissolve in mortario et cola.

*Dosis pro duobus haustibus.*

## MIXTURA CARBONATIS POTASSAE ABSINTHII STHOMACHICA.

*(Julapium Sthomachicum.)*

R̄. Aquae Corticis Citrei, )  
 Absinthii, ) ana uncias quatuor,  
 Menthae. . . )

Cinnamomi uncias duas,

Carbonatis Potassae Absinthii scrupulos quatuor,

Tincturae Ligni Aloes drachmas duas,  
 Syrupi Corticum Citrei unciam unam.

Misce S. A.

*Dosis Cochleatim.*

## MIXTURA SULPHATIS FERRI GUMMOSA.

R̄. Sulphatis Ferri sesquidrachmam,  
 Gummi Arabici unciam unam,  
 Aquae bullientis libram.

Dissolve et cola.

*Dosis à drachma ad semunciam.*

## CAPUT. XXXIII.

## INJECTIONES.

Huc Diaclysmata, Collyria liquida, Garga-

rismata, Colutiones, Clysteres, Errhina liquida et alia hujusmodi subjici debent, quia ratione usûs analogâ sunt.

### INJECTIO SULPHATIS ZINCI.

(*Astringens.*)

℞. Aquae Distillatae uncias sex,  
Sulphatis Zinci grana sex.  
Dissolve ad usum.

### INJECTIO QUINAE ANTIPUTRIDA.

℞. Quinae Loxae contusae unciam semis,  
Aquae sesquilibram.  
Coque ad libram unam. Adde  
Myrrhae liquidae drachmam unam.

### INJECTIO LACTIS OPIATA.

(*Anodyna.*)

℞. Lactis recenter emulcti uncias sex,  
Syrupi Meconii unciam unam.  
Misce ad usum.

*In septem unciis continet Extracti Opii aquosi  
grana circiter duo.*

### INJECTIO MURIATIS HYDRARGYRI CAMPHORATA.

(*Collyrium ex Fernandez.*)

℞. Terebinthinae unciam semis,  
Vitellorum Ovorum num. duo,  
Muriatis Hydrargyri praecipitati drachmam  
semis,

Sulphatis Aluminae, . . . }  
 Alcoholis Sulphurici aetherei, } ana drachmam  
 Camphorae. . . . . } unam,  
 Aquae libras duas.

Omnia misceantur S. A. in mortario vi-  
 treo, per linteum cola cum expressione, et  
 inter utendum continuè agitari debet.

### DIACLYSMA RADICIS PYRETHRI ODON- TALGIC.

Vide *TINCTURAE*.

### GARGARISMA NASTURTII COMPOSITUM.

(*Antiscorbuticum.*)

℞. Radicis Rubiae Tinctorum unciam unam,  
 Herbarum Nasturtii, }  
       Salviae, }  
       Becabungae, } singulorum drach-  
       Aquilegiae, } mas duas,  
 Radicis Pyrethri, }  
 Corticis Winteranei. }

Aquae Calcis recentis libras duas et semis.

Coque in vase obturato per quadrihorium  
 igne lento; colaturae adde  
 Alcoholis Cochleariae semiunciam,  
 Mellis Rosarum uncias quatuor.

### CLYSTER CORTICUM GRANATORUM.

(*Astringens.*)

℞. Corticum Granatorum contusorum unciam  
 unam.

Coque in Aqua ad libras duas, et cola.

## CLYSTER AMYLI ANODYNUS.

R̄. Amyli drachmas duas,  
Aquae libram unam.

Subige et coque, donec dissolvatur. Refrigerato liquori admisce Vitellos Ovorum duos.

CLYSTER FOLIORUM MALVARUM  
EMOLLIENS.

R̄. Decocti Malvarum emollientis uncias decem,  
Mellis, . . . . . } ana uncias duas.  
Olei Olivarum. . . . . }  
Misce ad usum.

## CLYSTER VINI ANTIMONIALIS IRRITANS,

R̄. Vini Oxydi Antimonii uncias quatuor,  
Aquae uncias octo.  
Misce ad usum.

*Pro Dosi unica.*

## CAPUT XXXIV.

## ACIDA.

## ACIDUM BORACICUM.

*(Sal Sedativus Homberg.)*

R̄. Boratis Sodae uncias quatuor,  
Acidi Sulphurici uncias duas.

Solve Boratem in Aquae libris quatuor et filtra; postea vapore ad tertiae partis consumptionem, et adhuc ferventi adde Acidum

paulatim et vapore balneo arenae ad pelliculam; postea ab igne remove, et semirefrigerato liquore, Acidum Boracicum in squamarum forma crystallisatum ab eo per linteum separa, triplo Aquae ponderis ablue, sicca et serva ad usum.

*Dosis ad grana octo.*

### ACIDUM NITRICUM.

*(Spiritus Nitri Acidus.)*

Rx. Nitratis Potassae purificati et pulverati libras duas,  
Acidi Sulphurici libram unam,  
Aquae libram semis.

Procede, uti in extractione Acidi Muriatici

N. B. Acidum Nitricum numquam ferè in officinis nostris conficitur; sed quia Acido Sulphurico et Muriatico à Mercatoribus miscetur et adulteratur, sequenti modo purificari debet;

Rx. Acidi Nitrici communis Q. V.

Instilla paulatim Nitratis Argenti liquidi Q. S. donec nulla Muriatis Argenti nebula appareat; postea per decantationem separa; distilla ut supra, et in vase opaco serva.

*Dosis ad guttas octo Aquâ dilutus.*

### ACIDI SULPHURICI COMMUNIS PURIFICATIO.

Acidum Sulphuricum in officinis nostris nunquam conficitur et quia à Mercatoribus nigrum, impurum et Aquâ supersaturatum



nobis venditur; tunc sequenti modo dealbatur et concentratur.

**Rx.** Acidi Sulphurici communis Q. V.

Mitte in vas vitreum, amplum et in balneo arenae vapora, donec ita diaphanum et concentratum appareat, ut vas eò plenum, dimidium Aquae pondus vix capiat; post refrigerationem serva ad usum.

### ACIDUM SULPHURICUM AQUOSUM.

(*Spiritus Vitrioli Acidus.*)

**Rx.** Aquae Distillatae uncias octo,

Acidi Sulphurici unciam unam.

Mitte Aquam in phialam vitream et instilla Acidum guttatim, continuè movendo cavendo ne vas calore rumpatur et serva ad usum.

### ACIDUM MURIATICUM.

(*Spiritus Salis Communis; seu Marini.*)

**Rx.** Muriatis Sodae pulverati libras duas,

Acidi Sulphurici libram unam,

Aquae Distillatae libram semis.

Sali in retortam vitream tubulatam immisso Acidum paulatim affunde, atque ex balneo arenae in excipulum, in quod Aquam antea immiseris, distilla donec nulli amplius vapores appareant.

*Dosis à guttis quatuor ad decem.*

N. B. Quia apud Mercatores Acidum Muriaticum purum non semper existit, et adul-

teratum nobis aliquando venditur, cautè et non sine nova distillatione usurpari debet.

## ACIDUM MURIATICUM OXYGENATUM AD CONTAGIA.

(*Fumigatio Acidi Muriatici Oxygenati,*  
*Vulgó ex Morveau.*)

R̄. Oxydi Manganesii unciam semis,  
Muriatis Sodae uncias duas,  
Acidi Sulphurici, . . . } ana unciam unam.  
Aquae. . . . . }

Oxydo et Muriati pulveratis in vase figulino crustâ vitri lactei coloris obducto adde Aquam; postea Acidum injice in cubiculo clauso, ut gas Acidum Muriaticum eliciat.

## ACETUM DISTILLATUM.

R̄. Aceti optimi Q. V.

Distilla in retorta vitrea ex arena, et cessa simulac tres quârtas circiter Aceti partes prodierint, seu antequam empyreuma contrahat.

## ACIDUM ACETICUM.

(*Acetum Radicale.*)

R̄. Acetatis Cupri pulverati libram unam.

Distilla vehementi igne in retorta vitrea ex arena S. A. Liquorem rursus distilla leniori calore ferè ac siccitatem.

## ACIDUM OXALICUM.

R̄. Acidi Nitrici libras octo,

Sacchari albissimi pulverati libram unam.

Mitte in vas vitreum amplum loco calido, et Saccharum paulatim superaffunde et digere per dies duos; postea vapora in vase vitreo ad libras duas; repone loco frigido, ut crystalli concrecant; liquorem per decantationem à crystallis separa, rursus vapora et procede ut antea, donec uncias sex, plus minusve, Acidi crystallisati obtinearis. Omnes crystallos Aquâ Distillâta dissolve et crystallisa S. A.

*Dosis ad scrupulum unum.*

### ACIDUM BENZOICUM.

*(Flores Benzoini.)*

℞. Benzoini electi crassiusculè triti Q. V.

Mitte in ollam figulinam capitello tympaniformi aut chartae cono instructam. Sublima igne leni; flores collige et sublimare perge, donec nulli amplius flores ascendant. Tunc eorum uncias duas dissolve in Aquae ferventis libris tribus, filtra et refrigerato liquore, in vase patulo concrecant crystalli, quas exsicca et serva.

*Dosis à granis sex ad semisrupulum.*

### ACIDUM SUCCINICUM LIQUIDUM ET CRYSTALLISATUM.

*(Sal Volatilis, et Spiritus Succini.)*

℞. Succini triti libras duas.

Distilla ex retorta fictili, vel vitrea lorica, ignem sensim augendo, donec nihil amplius ascendat. Oleum à Liquore Volatili

per chartam bibulam, priùs Aquâ madefactam, ope infundibuli separa et ex Aqua rectifica. Acidum concretum in collo retortae cum duplo Aquae Distillatae pondere coque et repone, ut fiant crystalli. Acidum Liquidum etiam per evaporationem crystallisetur. *Dosis Acidi Liquidi à semiscrupulo ad semidrachmam. Acidi Crystallisati à granis decem ad grana viginti. Olei à guttis quatuor ad guttas octo,*

## C A P U T X X X V.

### A L C A L I A E T T E R R A E.

#### AMMONIACUM LIQUIDUM.

(*Alkali Volatile Fluidum, seu Spiritus Salis Ammoniaci.*)

℞. Muriatis Ammoniaci libram unam,

Calcis pridie cum Aquae pauxillo extinctae libram unam et semis.

Seorsim pulverata immitte alternatim in retortam vitream, permisce et affunde sensim Aquae libram unam et semis, saepius agitando. Adapta receptaculum amplum, in quod antea immiseris Aquae Distillatae uncias sex, et juncturas claudè micâ panis cum Aqua subactâ. Leni igne ex arena, foraminulum receptaculi aliquoties sub initium distillationes reserando, ne vasa disrumpantur,



distilla donec liquoris uncias decem, aut undecim obtinueris. Vasis refrigeratis, liquorem distillatum cautè per infundibulum in phialam vitream angustioris colli effunde, quam exactissimè obtura.

*Dosis à scrupulo ad drachmam.*

### POTASSA PURA, SEU CAUSTICA.

*(Lapis Causticus.)*

℞. Calcis recentis libras duas,  
Carbonatis Potassae Tartari libram unam.

In vase fictili paulatim affunde Aquae libras sexdecim, saepius agitando, ut fiat lixivium. Filtra. Colaturam vapore in vase vitreo, aut fictili non vitreato ad siccitatem. Funde in crucibulo, massamque supra lapidem calentem effusam et adhuc lentescentem seca in frustula et in vase vitreo diligenter obturato repone.

### MAGNESIA PURA.

*(Calcinata.)*

℞. Carbonatis Magnesiae Q. V.

Igni forti per duas horas in crucibulo impone, et adhuc tepidam vasi ritè obturato committe.

*Dosis à scrupulo ad drachmam.*

Simili modo paratur

*Calx pura.*



---

## C A P U T   X X X V I.

### S A P O N E S.

#### SAPO POTASSAE TEREBINTHINACEUS.

(*Tartareus Starkei.*)

℞. Terebinthinae Abietis unciam unam.

Liquatae in vase fictili misce Potassae Causticae et liquidae unciam semis, vel Q. S. ut quaevis massae particula in Aqua solvi queat. Agita per intervalla ad Saponis spissitudinem.

*Dosis à granis sex ad scrupulum semis.*

#### SAPO SODAE MEDICINALIS.

(*Sapo Venetus.*)

℞. Carbonatis Sodae libram unam,

Calcis recentis libras duas,

Aquae libras triginta.

Omnia in vase ferreo coquantur per horas duas, spathulâ continuè agitando; postea filtra per infundibulum amplum prius arenâ lotâ obturatum, vel per ollam fictilem non vitreatam foraminulo inferius instructam, omnem materiem superaffundendo, et sufficientem quantitatem Aquae residuo addendo ad omnes salsedinis extractionem; deinde liquorem vapora ad dimidias, vel quousque turbidus appareat; ab igne semotus quiescat,

et per decantationem liquorem à residuo calcareo separatum iterum vapora ad consistentiam Syrupi tenuioris, vel quousque vas uncia unâ Aquae Distillatae repletum, drachmas novem ponderis hujus lixivii capiat quod *Lixivium Saponariorum* vocatur; tunc sume.

Hujus Lixivii libram unam,  
Olei Olivarum optimi libras duas.

Misce in vase ferreo et coquantur igne lento, spathulâ continuè materiem agitando, ad Emplastri consistentiam; materiem semirefrigeratam mitte in modulos papyro involutos et serva ad usum. Cognoscitur benè confectum esse, quando in Aqua solvitur sine Olei nota et consistentiam Emplastri refert.

*Dosis ad semidrachmam.*

Simili modo paratur Sapo Potassae addendo Lixivium Potassae, Carbonate Potassae et Calce paratum.

### SAPO AMMONIACALIS.

℞. Olei cujuscumque plantae per expressionem, aut decoctionem parati uncias quatuor, Ammoniacy Liquidi semiunciam.

In mortario vitreo agita, donec albedinem et consistentiam Unguenti tenuis adquirat.

Extemporaliter fieri debet.

*Usus externus.*

---

## MYRRHA LIQUIDA.

( *Oleum Myrrhae per deliquium.* )

℞. Ova Q. V.

Coque ad duritiem, per medium transversim seca et vitellos exime. Albuminum cavitates Myrrhâ pulveratâ reple, eorum medietates medietatibus adjuuge, filo leviter connecte, et sacculo lineo immissas humido loco appende, ut in subjectum vas Myrrhae dissolutio defluat.

## CAPUT XXXVII.

## SALIA.

## CARBONAS POTASSAE TARTARI.

( *Sal Tartari.* )

℞. Tartari crassiusculè triti Q. V.

Corniculis papyraceis include: horum singula utraque manu apprehende, Aquae immerge, furno accenso stratum super stratum cum carbonibus constituendo immitte, ure ad albedinem, elixa in sufficienti Aquae quantitate, filtra et in vase ferreo ad siccitatem vapore.

*Dosis à semisrupulo ad semidrachmam in Aqua Distillata.*

N. B. Si unciam Carbonatis Potassae Tartari in semiuncia Aquae Distillatae solveris, Carbonatem Potassae Liquidum (Oleum Tar-

tari per deliquium ab antiquis vocatum) obtinebis.

### CARBONAS POTASSAE ABSINTHII.

O. Herbae floridae Absinthii mediocriter siccæ Q. V.

Combure in aëre libero sensim in cineres albos, quos Aquâ ferventi elixa. Filtra, vapore ad siccitatem, ad albedinem ure et, si opus fuerit, solutionem filtrationem et evaporationem repete.

Simili modo paratur Carbonas Potassae

*Cardui Benedicti,*

*Centaurii Minoris et similia.*

*Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.*

### CARBONAS SODAE.

*(Sal Sodae.)*

R̄. Sodae libras quatuor.

Solve in Aquae Q. S. ut fiat lixivium: filtra per chartam, vapore in vase ferreo ad siccitatem et serva ad usum.

### CARBONAS AMMONIACI CRYSTALLISATUS.

*(Sal Volatilis Ammoniaci, seu Alkali Volatile Concretum.)*

R̄. Muriatis Ammoniaci libram unam,

Marmoris, aut Cretae Albae libras quatuor.

Mitte in retortam vitream cum recipienti amplo, juncturisque obturatis, balneo arenæ distilla; salem in collum retortæ et recipientis crystallisatum collige, in phialâ iterum

sublima balneo arenae et conserva ad usum in vase obturato.

*Dosis ad semiscrupulum.*

# CARBONAS AMMONIACI C. C. CRYSTALLISATUS.

*(Sal Volatilis Cornû Cervi.)*

R̄. Cornû Cervi in frustula dissecti Q. V.

Imple retortam vitream loricatam aut fictilem non vitreatam, et excipulo amplo aptato distilla calore gradatim aucto. Ascendent successivè Liquor, Sal et Oleum. Hæc omnia inde in matracium et appposito capitello leni igne Salem sublima. Postea cum duplo Cretae Albae pulveratae pondere rursus sublima, donec candidum obtineas. Liquorem, seu Cârbonatem Ammoniacalem Cornû Cervi Liquidum ab Oleo per infundibulum separatum, ad alios usus, iterata distillatione ex balneo arenae rectifica et vase optimè clauso conserva.

*Dosis à granis quatuor ad scrupulum.*

Simili modo parantur

*Carbonas Ammoniaci Viperarum,*

*Lumbricorum et  
similium.*

# CARBONAS AMMONIACI C. C. LIQUIDUS.

*(Spiritus Cornû Cervi.)*

R̄. Cornû Cervi in frustula dissecti Q. V.

Imple retortam et distilla S. A. uti in Carbonate Ammoniacali C. C. Crystallisati.

Codex medic. Europ. Sect. VI. p. I.

P



Liquorem ab Oleo per infundibulum vitreum separatum mitte in retortam vitream, igne arenae distilla in excipulum ad siccitatem et in vaso obturato ad usum conserva.

*Dosis ad drachmam.*

## CARBONAS MAGNESIAE.

*(Lac Terrae.)*

R $\acute{x$ . Sulphatis Magnesia $\acute{e}$ , . . . } ana libras duas.  
Carbonatis Potassae Tartari }

Utrumque seorsim dissolve in Aquae libris decem et filtra. Misce, coque paulisper spathulâ agitando, et liquorem adhuc calentem rursus cola per filtrum; super quod persistabit pulvis albus, quem Aquâ calidâ lotum, exsiccatum et per setaceum trajectum laxè in vase rite obturato conserva.

*Nota.* Si loco Carbonatis Potassae Tartari Carbonatem Sodae adhibueris, pariter succedit operatio.

## NITRAS POTASSAE CUM SULPHURE FUSUS.

*(Sal Prunella.)*

R $\acute{x$ . Nitratis Potassae libras duas et semis.

Mitte in ollam fictilem non vitreatam, igni impositam. Liquefacto per vices adjice Florem Sulphuris unciam semis.

Absolutâ deflagratione et ollâ parum refrigeratâ, materiem fluentem in pelvim effunde, continuo versandam, ut illa expandatur. Dein exime et conserva.

*Dosis à semisrupulo ad scrupulos duos.*

## SULPHAS POTASSAE,

(*Tartarus Vitriolatus, Arcanum Duplicatum,  
Sal Polychrestus.*)

R̄. Carbonatis Potassae Tartari libram unam,  
Aquae libras sex.

Dissolve in vase vitreo et instilla paulatim Acidi Sulphurici Aquosi Q. S. ad perfectam saturationem. Liquorem post levem ebullitionem ex balneo arenae filtra, vapore ad pelliculam et repone, ut crystalli concrecant. Liquoris residuum effunde, et vaporationes ad pelliculam repete, quamdiu crystallos exhibeat, quas exsiccatas serva.

*Dosis à semiscrupulo ad semunciam.*

## SULPHAS ALUMINAE ACETATUS.

(*Lapis Medicamentosus.*)

R̄. Oxydi Ferri Rubri uncias duas,  
Oxydi Plumbi Semivitrificati, } ana uncias quatuor.  
Boli Armenicae, }  
Sulphatis Aluminae. . . }

Pulveratis et in ollam terream immissis, superaffunde

Aceti optimi Q. S. ut duos digitos emineat.

Vase obturato macera per biduum, aut triduum, materiem identidem agitando. Tunc adde

Nitratis Potassae uncias octo,

Muriatis Ammoniaci uncias duas.

Vapora ad siccitatem et vehementi igni per horam impone.

## SULPHAS CUPRI ALUMINOSUS CAMPHORATUS.

(*Lapis Divinus, seu Ophthalmicus.*)

R̄. Sulphatis Cupri, . . . } ana uncias sex.  
 Sulphatis Aluminae. . . }

Pulvera, misce, mitte in vas fictili et li-  
 qua igne lento. Tunc adde

Camphorae pulveratae drachmas duas.

Materiem refrigeratam effracto vase exi-  
 me et serva.

## MURIAS CALCIS.

R̄. Acidi Muriatici libram unam,  
 Aquae libras octo.

Misce in vase vitreo et adde  
 Marmoris Albi pulverati Q. S. ad satura-  
 tionem.

Cochleatim pulvis injiciatur usquedum  
 effervescentia sit finita, agitando materiem  
 continuè, ut fiat perfecta saturatio et Aci-  
 di Carbonici simul exhalatio: postea coque,  
 donec liquor salinus sit bene saturatus, quod  
 cognoscitur, quando Tincturam, vel Syrupum  
 Violarum *Caeruleum* non immutet; filtretur,  
 in vase vitreo evaporetur ad siccitatem, spa-  
 thula lignea agitando, et vase vitreo obtura-  
 to et sicco ad usum servetur.

*Dosis ad scrupulum.*

Simili modo parantur crystallisationes  
 ope Salia sequentia:

*Murias Potassae,*

*Sodae,*

*Barytae et similia.*

## ACETAS POTASSAE.

(*Terra Foliata Tartari.*)

**Rx.** Carbonatis Potassae Tartari uncias quatuor,  
Acedi Distillati uncias sexdecim.

Affunde Sali Acidum in vase vitreo. Sedatâ effervescentiâ vapora leni igne, et plus Acidi diversis vicibus adjice, donec, priori quantitate per evaporationem ferè absumptâ, nova Acidi quantitas addita nullam cieat effervescentiam, seu potius donec materia salina Syrupi Violarum *Caerulei* colorem non immutet: quod fiet consumptis Acidi libris circiter septem. Tunc lentè exsicca et Salem obscurioris coloris lenissimo igne aliquantisper liqua, in Aquâ solve et per chartam filtra. Liquorem lenissimè vapora ex vase vitreo, minimè profundo, materiam salinam, dum arescit, assiduè movendo, ut citiùs ad siccitatem perveniat; quam vase obturato serva, candidissimam scilicet, purissimam, totamque tum Aquâ, tum Alkohole Vini solubilem, nullis faecibus relictis.

*Dosis à granis decem ad scrupulum,*

## ACETAS AMMONIACI LIQUIDUS.

(*Spiritus Mindereri.*)

**Rx.** Ammoniaci Liquidi Q. V.

Paulatim instilla in phiala vitrea, subin-



de agitando, Acidi Acetosi Q. S., donec Syrupi Violarum *Caerulei* colorem non immutet.

*Dosis à scrupulo ad drachmam.*

### TARTRAS ACIDULUS POTASSAE.

(*Cremor Tartari.*)

℞. Tartari libras decem,

Argillae purificatae libram unam,

Aquae libras octoginta.

Coque in vase terreo per horas duas, et liquorem adhuc ferventem per linteum cola, repone in loco frigido, ut fiant crystalli, quas Aquâ frigidâ ablutas, et terrâ aluminosâ expoliatas, iterum solve et procede ut antea, quamdiu crystallos candidissimas obtineas.

### TARTRAS POTASSAE.

(*Tartarus Solubilis.*)

℞. Carbonatis Potassae Tartari libram unam,

Aquae libras octo.

Solve, ac solutioni ebullienti paulatim injice Tartratis Aciduli Potassae pulverati Q. S. ut Sal perfectè saturatus effervescere cesset, et Syrupi Violarum *Caerulei* colorem non immutet. Refrigeratum liquorem filtra et in vase vitreo vapore leni igne ad pelliculam, ut crystallos obtineas: quas, si minùs purae fuerint, denuo solve, filtra et vapore. Quoties verò vaporationes iteraveris, toties num liquor salinus saturationem retineat, explorabis.

*Dosis à scrupulo ad semunciam.*



## TARTRAS POTASSAE ET SODAE.

(*Tartarus Solubilis de Seignete.*)

R̄. Carbonatis Sodae libram unam,  
Tartratis Aciduli Potassae Q. S. ad perfectam saturationem,  
Aquae libras duodecim.

Procede, ut in Tartrate Potassae diximus.

*Dosis ad drachmam unam.*

## TARTRAS POTASSAE FERRUGINOSUS.

(*Tartarus Chalybeatus Solubilis.*)

R̄. Tartratis Potassae uncias quatuor,  
Tincturae Vinosae Ferri Tartarisatae libram unam.

Coque in vase vitreo igne arenae ad siccitatem.

*Dosis à semiscrupulo ad scrupulum.*

## SUCCINAS AMMONIACI LIQUIDUS.

(*Spiritus C. C. Succinatus.*)

R̄. Carbonatis Ammoniaci Cornû Cervi liquidi Q. V.

In phialam vitream inmisso, affunde paulatim

Acidi Succinici Crystallisati in mortario vitreo pulverati Q. S. ad perfectam saturationem.

*Dosis à guttis quatuor ad guttas duodecim.*

---

## CAPUT XXXVIII.

### PRAEPARATA EX ZINCO.

#### OXYDUM ZINCI SUBLIMATUM,

(*Flores Zinci.*)

R̄. Zinci puri quantum libuerit.

Immitte in crucibulum triangulare, cui superimpone aliud simile crucibulum, sed inversum ita, ut anguli utriusque alternentur. Colloca inter carbones accensos. Zincum igne forti liquatum flammam concipiet, et sublimabuntur Flores Albi, qui utrumque crucibulum implentes flammam exstinguent. Tunc rutabulo ferreo Flores remove, ut Zincum denuo exardeat: quod repete, donec omnis Zinci portio in Flores sit conversa: quos, si satis albi non sint, in aliud crucibulum candens paulatim injice, et ure ad perfectam oxydationem.

*Dosis internè à granis sex ad decem.*

#### SULPHAS ZINCI.

(*Vitriolum Album.*)

R̄. Zinci puri quantum libuerit,

Acidi Sulphurici Aquosi Q. S. ad dissolutionem.

Filtra et post debitam evaporationem crystallisa S. A.

*Usus plerumque externus.*

## CAPUT XXXIX.

### PRÆPARATA EX FERRO.

#### SULPHAS FERRI.

(*Sal, seu Vitriolum Martis.*)

℞. Limaturae Ferri purae et nitentis libram  
unam,

Aquae libras quatuor,

Acidi Sulphurici libram unam.

Misce in vase vitreo capaci saepius agitando, et post effervescentiam calefac paulisper, ac per chartam filtra. Solutionem ad tertiae partis consumptionem vapore, et in frigido loco ad crystallisationem repone. Separatis crystallis, effusum liquorem denuo vapore et procede, ut antea dictum est, quoad nullae appareant crystalli.

*Dosis à granis tribus ad semiscrupulum.*

#### SULPHATIS FERRI EXSICCATIO.

(*Vitrioli Martis Calcinatio, Vulgò Chalcitis.*)

℞. Sulphatis Ferri Q. V.

In vase terreo non vitreato igne moderato humiditatem vapore, donec in massam cineream redigatur.

#### OXYDUM FERRI RUBRUM.

(*Colcothar.*)

℞. Sulphatis Ferri Q. V.

In vase terreo non vitreato igni vehementi expone, donec vapores non emittat et colorem rubrum adquisiverit; postea laeviga et serva ad usum.

*Usus externus.*

### CARBONAS POTASSAE ET FERRI LIQUIDUS.

*(Tinctura Elastica.)*

℞. Limaturae Ferri nitidae uncias duas,  
Carbonatis Potassae Tartari uncias octo.

Misce et liqua in crucibulo igne vehementi in massam. Hanc in mortario ferreo, aut lapideo in pulverem redige, et vase fictili patulo exceptam aëri humido expone. Facesset in liquorem. Filtra.

*Dosis ad drachmam unam in libris quatuor  
Aquae pro potu per intervalla.*

### ACETAS FERRI LIQUIDUS.

*(Vitriolum Liquidum Martis.)*

℞. Limaturae Ferri non rubiginosae libram unam,

(Aceti optimi libras duodecim.

Digere in matraccio per dies octo; postea filtra et serva ad usum.

*Dosis ad semiunciam.*

### GLOBULI FERRI TARTARISATI.

*(Pyri Martiales.)*

℞. Limaturae Ferri purae uncias octo,  
Tartari pulverati uncias duodecim.



Misce in cucurbita terrea et affunde  
 Alcoholis Vini Communis, } partes aequales ad  
 Aquae. . . . . } digiti eminentiam.

Digere et leni calore liquorem vapore.  
 Massae exsiccatae, ac pulveratae Aquam et  
 Alkoholem denuo affunde, digere et vapore;  
 idque pluries repete, quousque massa exsic-  
 cata velut resinosa appareat. Tunc ex ea glo-  
 bulos pyri minoris magnitudine efforma.

### CARBONAS FERRI.

(*Crocus Martis Aperiens.*)

℞. Limaturae Ferri purae libram unam.

Aëri expone, et Aquâ Distillatâ saepius  
 humecta, donec in rubiginem abeat. Tere in  
 mortario ferreo, et affusâ Aquâ pulverem  
 subtilissimum simul cum illa per inclina-  
 tionem effunde et sicca. Residuum verò rur-  
 sus humecta, aëri diutius expone, denuo  
 in mortario tritum abluere et sicca.

*Dosis à granis quinque ad scrupulum.*

### OXYDUM FERRI NIGRUM.

(*Aethiops Martialis.*)

℞. Limaturae Ferri splendentis Q. V.

Aquae Distillatae Q. S. ad octodecim digi-  
 torum eminentiam.

Mitte in matrarium et digere per duorum,  
 vel trium mensium spatium, identidem agi-  
 tando, donec Ferrum pulveris nigerrimi for-  
 mâ tolum ferè appareat; addendo, si opus  
 fuerit, S. Q. Aquae ad aëris attactum prae-



cavendum. Postea agita, et Aqua turbida per decantationem separata per subsidentiam praestabit Ferrum ad minimum oxydatum in pulverem subtilissimum, quem leni calore exsiccatum in vase vitreo diligenter serva.

*Dosis ad scrupulos duos.*

## C A P U T X L.

### PRAEPARATA EX ANTIMONIO.

#### ANTIMONIUM PURUM.

*(Regulus Antimonii.)*

℞. Sulphureti Antimonii libras duas,  
Tartari libram unam et semis,  
Nitratis Potassae uncias octo.

Seorsim pulverata misce et in crucibulum ignitum cochleatim immitte. Peracta detonatione, materiem liqua et refrigerato crucibulo, Metallum in fundo haerens â scoriis separa et lava.

#### MURIAS OXYGENATUS ANTIMONII,

*(Butyrum Antimonii.)*

℞. Antimonii puri uncias quatuor,  
Muriatis Oxygenati Hydrargyri Sublimati  
uncias duodecim.

Seorsim pulverata et cautim mixta in mortario lapideo inde in retortam vitream brevioris et latioris colli: apta receptaculum

amplum, et commissuris clausis distilla igne per horae spatium leni, deinde gradatim aucto. Ascendet in receptaculum liquor primo tenuis, mox crassior, postremo Sal crystallisatus, quem, si retortae collo adhaeserit, carbone admoto liquabis et in vase rite clauso servabis.

*Usus externus.*

## OXYDUM ANTIMONII SEMIVITRIFICATUM.

(*Hepar Antimonii.*)

℞. Sulphureti Antimonii in }  
     pulverem triti,                }  
 Nitratis Potassae pulve- } ana libram unam,  
     rati. . . . . }  
 Muriatis Sodae unciam unam.

Misce, per intervalla in crucibulum candefactum injice et calorem augendo liqua. Effunde et frigefactam massam à scoriis separa.

## OXYDUM ANTIMONII SULPHURATUM RUBRUM.

(*Kermes Minerale.*)

℞. Sulphureti Antimonii subtilissimè pulverati uncias quatuor,  
 Carbonatis Potassae Tartari libras quatuor,  
 Aquae Distillatae libras viginti duas.

Dissolve Salem in Aqua et filtra. Ebullienti liquori in vase ferreo per vices adjice Sulphuretum. Bulliat per horam saltem et liquorem adhuc ferventem filtra. Pulvis ruber

per refrigerationem subsidebit, quem, dissolutione decantata, Aquâ Distillatâ frigidâ edulcora, leni calore exsicca et pulveratum serva.

*Dosis à grano uno ad grana quinque cum aequali Sacchari quantitate.*

### TARTRAS POTASSAE ANTIMONIALIS.

(*Tartarus Emeticus.*)

℞. Tartratis Aciduli Potassae, }  
 Oxydi Antimonii Semivitri- } ana uncias sex,  
 ficati laevigati et loti. }  
 Aquae Distillatae libras sex,

Coque leniter in vase vitreo per horam spathulâ ligneâ movendo. Liquorem filtratum vapora leni igne ad siccitatem. Dissolve iterum quam possis minima Aquae Distillatae ferventis quantitate, filtra et repone, ut fiant crystalli. Vaporationes et crystallisationes repete, donec crystallos non obtineas.

*Dosis à granis duobus ad grana sex.*

### OXYDUM ANTIMONII ALBUM.

(*Antimonium Diaphoreticum Usuale.*)

℞. Sulphureti Antimonii semilibram,  
 Nitratiss Potassae libram unam et semis.

Seorsim pulveratâ misceantur exactè, et in crucibulum candens cochleatim injiciantur, ut per vices detonentur; peracta combustione, ignis augeatur per horam; postea crucibulum separa ab igne, et cautè in Aquam ferventem mitte, ut materies cum fragore

dissolvatur, continuè agita Aquam lactescen-  
tem, ut omnis à crucibulo separetur materi-  
es: tunc per setaceum cola et post subsi-  
dentiam Aquam per inclinationem separa,  
multoties pulverem album ablue, sicca in  
umbrâ et serva ad usum.

*Dosis ad drachmam semis.*

N. B. Si lotiones evaporantur in vase vi-  
treo ad siccitatem, massam salinam obtine-  
bis, Potassâ, Antimonii Oxydo et Nitrate  
Potassae constantem, quae *Nitrum Stibiatum*,  
ab antiquis vocabatur.

## C A P U T X L I.

### PRAEPARATA EX CUPRO.

#### ACETAS CUPRI CRYSTALLISATUS.

(*Crystalli Veneris*.)

**Rx.** Oxydi Cupri Acetati pulverati libram unam,  
Aceti Distillati libras octo.

In matraccio vitreo digere continuè agi-  
tando, ut dissolvatur; tunc filtra et balneo  
arenae in vase vitreo vapora ad pelliculam,  
in loco frigido repone, ut concrecant cry-  
stalli, quae servantur ad usum.

*Usus externus.*



## C A P U T X L I I.

### PRAEPARATA EX PLUMBO.

#### ACETAS PLUMBI CRYSTALLISATUS.

(*Sal, seu Saccharum Saturni.*)

R̄. Carbonatis Plumbi Albi, vel Oxydi Plumbi  
Semivitrificati libram unam,  
Acedi Distillati libras octo.

Coque simul balneo arenae,, donec Acidum saturetur. Filtra, ad pelliculam vapora et sepone, ut fiant crystalli. Residuum liquorem exhala denuo; idque repete, dum crystallos praebuerit.

*Usus externus.*

#### ACETAS PLUMBI LIQUIDUS.

(*Acetum Plumbi, seu Saturni.*)

R̄. Oxydi Plumbi Semivitrificati libram unam,  
Aceti Albi optimi libras quatuor.

Digere in vase vitreo leni calore per aliquot dies, saepius agitando. Quiescat liquor; quem per inclinationem transfunde, aut filtra et in vase clauso serva.

#### SULPHURETUM PLUMBI FACTITIUM.

(*Plumbum Ustum.*)

R̄. Plumbi in frustula Q. V.

Funde in vase terreo patulo et adde cochleatim, continenter agitando, sufficientem



sufficientem quantitatem Sulphuris pulverati, donec in pulverem nigrum redigatur; postea in porphyrite laeviga.

## C A P U T X L I I I.

### PRAEPARATA EX HYDRARGYRO.

#### HYDRARGYRI EXTRACTIO.

R $\xi$ . Cinnabaris Nativae Q. V.

Pulvera et procede, ut in Hydrargyri purificatione.

#### HYDRARGYRI PURIFICATIO.

R $\xi$ . Hydrargyri Q. V.

Ex retorta ferrea, aut fictili non vitreata vehementi igne distilla in receptaculum, cuius medietatem Aqua repleat.

#### AMALGAMA STANNI.

(*Amalgama, seu Pasta Jovis.*)

R $\xi$ . Stanni uncias duas,

Hydrargyri puri uncias tres.

Hydrargyrum, tandiu in crucibulo calefactum, donec in fumos abire incipiat, affunde Stanno, in alio crucibulo liquefacto; postea ab igne remove et materiem agita spathulâ ligneâ in mortario marmoreo, addendo Murialis Sodae pauxillum, et Aquâ ablue ad dulcedinem: dein linteo exsicca et serva.

#### OXYDUM HYDRARGYRI SACCHARATUM.

(*Saccharum Vermifugum.*)

R $\xi$ . Hydrargyri puri uncias duas,

Sacchari Albi pulverati uncias quatuor.

Tere utrumque in mortario lapideo cum Aquae S. Q., ut fiat massa mollis, quam tandiu subige, donec Hydrargyrus penitus sit exstinctus.

*In singulis drachmis continet Hydrargyri scrupulum unum.*

*Dosis à granis sex ad scrupulum.*

### SULPHURETUM HYDRARGYRI NIGRUM.

*(Aethiops Mineralis.)*

℞. Hydrargyri puri uncias duas,  
Sulphuris Sublimati uncias quatuor.

Tere simul in mortario vitreo, aut marmoreo, quousque globuli visum effugiant.

*In singulis drachmis continet Hydrargyri scrupulum unum.*

*(Dosis à semiscrupulo ad drachmam.)*

### SULPHURETUM HYDRARGYRI SUBLIMATUM.

*(Cinnabaris Factitia.)*

℞. Sulphuris libram unam.

Liquefacto in vase fictili adjice sensim Hydrargyri libras tres.

Agitentur continuo, donec exactè unita appareant et nigrescant. Frigefactam et pulveratam materiem forti igne sublima ex phiala vitrea in massam rubram, phialae orificium chartâ obturando: postea laeviga et serva ad usum.

*Dosis ad grana octo.*

### OXYDUM HYDRARGYRI NITRATUM RUBRUM.

*(Mercurius Praecipitatus Ruber.)*

℞. Acidi Nitrici, . . }  
Hydrargyri puri } ana libram unam.

Misce in vase vitreo balneo arenae ad solutionem. Liquorem vapora ad siccitatem. Materiem pulveratam immitte in vas fictile non vitreatum latioris fundi et valido igni expone, spathulâ ferreâ continenter agitando,

donec rubrum colorem acquirat: postea in porphyrite tandiù tere, aut laeviga sine Aqua, donec subtilissimus pulvis appareat.

*Usus externus.*

### MURIAS HYDRARGYRI PRAECIPITATUS.

*(Mercurius Praecipitatus Albus.)*

℞. Hydrargyri puri uncias quatuor,  
Acidi Nitrici purificati uncias sex,  
Muriatis Sodae uncias quatuor,  
Aquae Distillatae libras tres.

Hydrargyrum in Acido dissolve in matracio vitreo, loco frigido. Muriatem Sodae solve quoque in Aqua et filtra. Dissolutionem Hydrargyri effunde in Muriatis Sodae solutionem. Tunc adde Aquae Distillatae uncias sexdecim. Pulverem album subsidentem decantato liquore supernatante, Aquâ Distillatâ pluries elue, in umbrâ exsicca et vase opaco serva.

*Usus externus.*

### MURIAS OXYGENATUS HYDRARGYRI SUBLIMATUS.

*(Mercurius Sublimatus Corrosivus.)*

℞. Hydrargyri puri libras duas,  
Acidi Sulphurici uncias triginta,  
Muriatis Sodae exsiccati libras quatuor.

Hydrargyrum in Acido Sulphurico dissolve vase ferreo, et usque ad siccitatem vapora: in mortario lapideo pulvera; cum Muriate Sodae pulverato misce et in phiala vitrea, quod triplo capacius sit, leni igne sublima. Ex frigida, fractaque phiala exime accuratè massam salinam, superiori vasis parti adhaerentem.

*Usus plerumque externus.*

*Interius cautissimè ad octavam grani partem in Aqua Distillata propinatur.*

## MURIAS HYDRARGYRI SUBLIMATUS.

*(Mercurius Mitis, seu Dulcis.)*

R̄. Muriatis Oxygenati Hydrargyri Sublimati  
 uncias octo,  
 Hydrargyri puri uncias sex.

Tere Muriatem Oxygenatum in mortario lapideo cum Aquae pauxillo, Hydrargyrum purum paulatim addendo, donec reddatur inconspicius. Materiem exsiccatam sublima igne arenae in phiala vitrea. Salem superiori vasis parti adhaerentem separa et sublima quoties opus fuerit, donec parum materiae in Aqua calcis tritum omnino nigrescat. Tunc pulvera, in porphyrite laeviga et Aquâ Distillatâ ferventî lava, sicca et vase opaco ad usum serva.

*Dosis à granis sex ad semidrachmam.*

## CAPUT XLIV.

## PRAEPARATA EX ARGENTO.

## NITRAS ARGENTI FUSUS.

*(Lapis Infernalis.)*

R̄. Argenti puri unciam unam,  
 Acidi Nitrici uncias tres.

Mitte in vas vitreum, et dissolve lento igne. Solutionem adhuc calentem decanta et in vase vitreo balneo arenae vapore ad siccitatem. Massam Salinam cautè exime et per vices in vase ferreo funde, donec ampullae non appareant. Materiem penitus liquefactam effunde in modiolum ferreum (hispanicè *Riclera*), calefactum et sebo illitum. Refrigeratas virgulas exime et in vase clauso repone.

*Usus externus.*



COPIES

MEMORANDUM  
FOR THE RECORD

SECTION - 1

MEMORANDUM FOR THE RECORD

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM



C O D E X  
M E D I C A M E N T A R I U S  
E U R O P A E U S.

---

S E C T I O   S E X T A.

---

P H A R M A C O P O E A M  
H I S P A N I C A M  
E T  
L U S I T A N I C A M  
C O N T I N E N S.

---

T O M U S   I I.  
P H A R M A C O P O E A   L U S I T A N I C A.

---

L I P S I A E   E T   S O R A V I A E  
A P U D   F R .   F L E I S C H E R .  
1 8 2 2 .

C O D E X  
M E D I C A M E N T A R I U S  
S E U  
P H A R M A C O P O E A  
L U S I T A N I C A

---

---

L I P S I A E E T S O R A V I A E  
A P U D F R. F L E I S C H E R.  
1 8 2 2.

COPY

RECEIVED

W. A. M. W. C. O. F. T.

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

---

**E**xhibemus interpretationem latinam Pharmacopoeae lusitanicae, quae titulo: *Pharmacopeia geral para o Reino e dominios de Portugal, publicada por ordem da Rainha fidelissima D. Maria I. Tom. I. Elementos de Pharmacia. Tom. II. Medicamentos simplicis, preparados e compostos*, prodiit Lisboae 1794. in forma octava, complectens 128 et 247 pag. Cui cum etiamnum adstricti sint pharmacopolae lusitanici, nec seriore cognoscamus, hac contenti esse debemus.

C. Sprengel.





P A R S I.

MATERIA PHARMACEUTICA

SEU

DE MEDICAMENTIS SIMPLICIBUS.

PAGE 2

STATISTICAL PUBLICATIONS

DEPARTMENT OF COMMERCE

ABSINTHIUM VULGARE.      LOSNA.      Herba.

*Artemisia Absinthium* L.

Locus. Habitat in locis siccis arenosis Lusitaniae: colitur in hortis. Floret Iunio et Iulio.

Perennis.

Forma. Caules teretes, duos aut tres pedes longi, sulcati, ramosi, foliosi, incani. Folia petiolata, alterna, satis magna, mollia, viridiusculonescentia, bipinnatifida, laciniis multifidis.

Proprietas. Odor aromaticus fortis. Sapor amarissimus.

CETOSSA.      AZEDAS.      Herba rec.

*umex Acetosa* L.

Locus. Habitat in pratis Europae et Lusitaniae: colitur in hortis. Floret per totam aestatem.

Perennis.

Forma. Folia oblonga, sagittata, carnosiuscula, magna, acuta, utrinque glabra, margine unilobata, inferiora petiolata, superiora sessilia, summa linearia.

Propriet. Odor nullus. Sapor acidus, gratus. Folia tenera masticata salivam viridi colore imbuunt. Siccorum sapor herbaceus, vix ullo acore conspicuo.

Codex medic. Europ. Sect. VI. p. 2.

A 2

**ACETOSELLA.** TREVO AZEDO. Folia recentia  
*Oxalis Acetosella* L.

**Locus.** Habitat in nemoribus, ad declivia sal-  
tuum, in vallibus umbrosis humidis Lusitaniae, Hi-  
spaniae, Brasiliae. Floret a Martio ad Octobrim.

Perennis

**Forma.** Folia ternata, foliola obcordata, apice  
ad petiolum verso, pilosiuscula, ciliata, flavido-vi-  
ridia.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor grate acidulus

**ACETUM.** VINAGRE. Sal acidus liquidus

**Forma.** Acetum est sal acidus aquosus liquidus  
pellucidus, hyalinus aut subrutilans, fermentatio-  
ne vini productus.

**Propriet.** Odor habet aliquid spirituosus, fra-  
grantis: sapor est acidus. Praeter qualitates ac-  
dorum communes maiorem habet affinitatem erga  
terram ponderosam, quam erga alcalia, calcer  
magnesiumque. Connubia cum his substantiis non  
nullisque metallis constituunt neutrales substantia  
particulares, in spiritu vini solubiles.

**N.** Aceti fabricatores adulterant acetum acid  
vitrioli. Ea fraus detegitur addita solutione terra  
calcareae in aqua, quo facto lacteus color nascitur  
terra acido vitrioli saturata, gypsum fit fundumque  
petit. Pharmacopoeiae est, operam dare omnem  
ut nullo alio utatur aceto, nisi e vino parato.

**ACIDUM VITRIOLI.** OLEO DE VITRIOLO. Sal ac-  
idus mineralis

**Locus.** Semper iunctum reperitur cum alca

ibus, terris, metallis quibusdam, cum phlogisto, unde ope peculiaris extrahitur operationis.

**Forma.** Acidum vitrioli est sal acidus liquidus, um purus, pellucidus et aquae instar clarus, sed ulgo nigrescens ob sordes: olei more fluit, digisque tractatum pariter oleosum videtur: hinc illeitime appellatur oleum vitrioli.

**Propriet.** Nullus odor. Sapor satis stypticus et acidissimus. Pondus specificum duplum fere est aquae destillatae, quia vitrum unciae unius quae capax, unciam unam et  $\frac{7}{8}$  partes huius acidii continet. Corrodit et destruit materies flagrantiae capaces ad ignis instar, in verum carbonem eas reducens. In cucurbita calefactum perdit rotinus aquae partem, concentratur, partim in apores volatile abit, et si colore insigne esset, colorem amittit ac clarescit. Aëri expositum attrahit ere duplum ponderis humorum, quibus demitur et roboris et causticae vis plurimum. Unitur aquae cito, cum fervore magnoque aestu, idque connu-rium nec frigore congelascit, nec aquae congelationem permittit. Quodsi vero omni aqua priatum est, congelascit ad 12 — 13 gradus sub puncto congelationis thermometri Reaumuriani. Unitur alcalibus, terris quibusdam et metallis, unde varia existunt corpora neutra.

ACONITUM.

ACONITO.

Folia.

*Aconitum Napellus* L.

**Locus.** Habitat in locis humidis inundatis ac montosis Europae. Floret a Iunio ad Augustum.

Perennis.



**Forma.** Folia sunt palmata, quinquefida, laciniis linearibus incisis, nervo subtus prominulo supra lucidis, glaberrimis, saturrime viridibus.

**Propriet.** Odor gravis, nauseosus. Sapor foliorum recentium, postquam manducaveris, evidenter acris, siccorum insipidus. Succus saporis est acris, odoris ingrati: qui cum in extractum abit, salitus fit et acriusculus, odoremque habet virosum,

**ALLIUM.**

**ALHO.**

**Radix**

*Allium sativum* L.

**Locus.** Habitat in Sicilia, colitur in Lusitania  
Biennis

**Forma.** Radix est bulbosa, ceparum more subrotunda, e multis bulbillis composita, arcuatis acutis, interiori latere concavis, extus convexis, lateribus planis, quibus iunguntur: duplici serie vel triplici dispositis, pellicula alba, sicca, chartae ac instar, obtectis. Parenchyma est album, carnosum, spongiosum, succo pellucido plenum.

**Propriet.** Odor peculiaris, fragrans, gravis nauseosus. Sapor acris. Manducatum allium halitui oris impertit odorem suum peculiarem fragrantissimum, diu persistentem. Succus e bulbis sectis extractus, digitis frictus siccatusque splendorem iis inducit, quo si chartam albam unxeris, si ea rigida diaphana, postquam siccuerit, velut oleum tincta,

## ALOË SUCCOTRINA.

AZEVIRE SUCCOTRINO.

Gummi-resina.

*Aloë perfoliata* β. *americana* L.*Aloë elongata* Murr.

Locus. Habitat in Jamaica, Barbados, Br-  
 illia, Capite bonae spei. Perennis.

Forma. Gummi-resina, aut succus inspissatus  
 in frustis solidis sed fragilibus, coloris nigricantis  
 purpurascens, lucidis, subdiaphanis, maculis aut  
 punctis auratis: quae fracta in frustula disiliunt  
 ab altera parte plana aut convexa, concava ab al-  
 tera.

Propriet. Odor nauseosus. Sapor amarissi-  
 mus, fellis more, nauseosus. Pulveratur facile, pul-  
 vis est aureo-lutescens: flammae admotus spumat,  
 accenditur, ardet, protinus vero ut ab igne remo-  
 vetur, subsidit, fumumque spissum odoris peculia-  
 ris emittit, denique in carbonem abit. — Aloë  
 minus pura, coloris obscurioris, nomine *hepati-  
 cae* venit: nigra, arida, minusque graveolens vo-  
 catur *caballina*.

## ALTHAEA.

MALVAISCO.

Radix.

*Althaea officinalis* L.

Locus. Habitat in locis humidiusculis per totam  
 Europam. Floret a Maio ad Iunium. Perennis.

Forma. Radix est magna, teres, longa, ramo-  
 sa, ramis teretibus, digitum aut pollicem crassis,  
 extus coloris cinereo-albidi, subrugosis: parenchy-  
 mate carnosio, albo, quod, transversim sectum,  
 fibris insignitur albidioribus, radiatim a centro ad

ambitum et annulo incarnato medullam amb-  
eunte.

Propriet. Nullus odor. Sapor subdulcis, ad-  
modum mucilaginosus.

ALUMEN. PEDRA HUME. Sal neuter terreus  
*Alumen commune* L.

Locus. Invenitur in Aegypto, Insula Melo, Sar-  
dinia, Hispania, Lusitania, Brasilia, in variis for-  
mis: nimirum nativum, variis peregrinis rebus mix-  
tum, in pyritis superficie, in pulvere et striis sub-  
tilissimis, aliquando etiam in fontibus mineralibu-  
solutum.

Forma. Alumen est sal neuter terreus, e con-  
nubio acidi vitriolici cum terra aluminosa natus  
quem videmus in frustis grandibus crystallinis, al-  
bis subdiaphanis, quorum crystalli, dum regulare  
sunt, octaëdram habent formam.

Propriet. Nullus odor: sapor insigniter sty-  
pticus, subdulcis. Aëri expositus tegitur pulvere  
aut farina quadam, qua demitur pelluciditas. Ad  
ignem liquefcit, perdit aquam crystallis idoneam  
turgescit insigniter, tandem mutatur in substantiam  
siccam, spongiosam, levem, albam, satis friabi-  
lem et admodum stypticam, quae *Aluminis usti*  
nomine venit. In aqua frigida parum solvitur  
iuxta Kirwanium enim quindecies tantum aquae  
quae temperiem 60 graduum Fahrenh. habet, po-  
scitur ad solutionem. Aqua fervida vero dimidian-  
fere sui ponderis partem solvit.

AMBRA. AMBAR.

*Ambra ambrosiaca* L.

**Locus.** Invenitur in superficie maris circa insulas Moluccas, Madagascar, Sumatrae, ad oras Coromandel, Brasiliae, Africae, Chinae, Japoniae: saepenumero inter faeces aut in intestinis *Physeteris macrocephali*.

**Forma.** Substantia mollis, glutinosa, ad cerae instar, coloris cinerei, punctis flavicantibus aut nigris sparsa: frustis irregularibus, quandoque rotundatis, quae stratis componuntur squamatis, plus minusve crassis: continent saepe frustula concharum, pisciumque spinas.

**Propriet.** Odor moschatus, fragrantissimus: dum calefit aut fricatur, aliis rebus facillime impertitur. Sapor nullus. Manducata dentibus adhaeret: funditur, sine ebullitione nec spuma, si in cochleari metallico ad flammam candelaere cereae admovetur. Ferro calido nec adhaeret, nec solvitur spiritu vini, nec subit aquam. Haec est optima: plurima autem venalis adulterata esse solet.

AMYGDALAE AMARAE. AMENDOAS AMARGOSAS.

Nuces.

*Amygdalus communis* L.

Arbor.

**Locus.** Habitat in Lusitania, Hispania.

**Forma.** Fructus est ovatus, utrinque planiusculus, acutus, putamine rubicundo, rugoso, sulcato, striato: parenchymate candido, glaberrimo, solido, bipartibili.

**Propriet.** Sapor amaricans, oleosus, farin-



fus. Masticatae in frusta abeunt, salivam lacteam reddunt.

### AMYGDALAE DULCES.

AMENDOAS DOCES.

Nuces.

*Amygdalus communis* L.

Arbor.

Locus. Habitat in Hispania, Lusitania.

Forma. Fructus priori similis, sed grandior.

Propriet. Sapor dulcis, oleosus, farinosus. Manducatae in frusta abeunt, salivam lacteam reddunt.

### ANGELICA SATIVA.

ANGELICA.

Radix.

*Angelica Archangelica* L.

Locus. Habitat in alpibus Lapponiae, Austriae, in Pyrenaeis Cataloniae et in Lusitania. Floret Iunio et Iulio.

Biennis.

Forma. Radix recens fusiformis cylindrica, pollicem et quod excurrit, crassa: rugosa, coloris cinerei parumper rufi, cincta radiculis aut fibrillis longis, teretibus, crassis. Parenchyma recens est carnosum, albidum, succo flavicante scatens, dum siccescit, spongiosum.

Propriet. Odor aromaticus, fragrans, gratus. Sapor aromaticus, fortis. Manducata protinus habet dulcis aliquid, dein calefacit, acris fit, auget salivam, linguam et palatum vellicat ac calefacit.

### ANISUM.

HERVA DOCE.

Semina.

*Pimpinella Anisum* L.

Locus. Habitat in Italia, Sicilia, Aegypto aliisque Orientis regionibus. Colitur in Gallia. Floret Iulio.

Annua.



**Forma.** Semina sunt ovato-oblonga, turgida, gemina, hinc plana, inde convexa, longitudinaliter striata, coloris exalbidi aut cinereo-virescentis, longitudine lineam aequant.

**Propriet.** Odor aromaticus, suavis. Sapor quoque aromaticus, subdulcis, suavissimus et grate acriusculus.

### ANISUM STELLATUM.

ANIS ESTRELLADO.

Fructus.

*Illicium anisatum* L.

Arbor.

**Locus.** Habitat in Tataria, China et insulis Philippinis.

**Forma.** Fructus compositus ex octo aut pluribus capsulis ovatis horizontaliter stellatim dispositis, ovato-oblongis, rugosis, duris, compressis, ferrugineis, inferius convexis, apice dehiscentibus: in quarum cavitatibus singulis semina ovata, planiuscula, cortice coriaceo lucida, medulla albida.

**Propriet.** Odor capsularum similis Anisi: sapor congruit, dulcis, suavis. Odor saporque corticis seminum consentit cum illo, sed debilior. Medulla est oleosa, odoris saporisque fortis.

### ANTIMONIUM.

ANTIMONIO.

Semimetallum

sulfure minerae indolem adeptum.

*Stibium striatum* L.

**Locus.** Habitat in Gallia, Hungaria, Lusitania etc.

**Forma.** Semimetallum, quod sulfuris ope minerae formam et indolem adeptum est, compositum acubus aut laminis plus minusve longiusculis

et crassis, parallele ad se invicem appositis, fragilibus, lacidis, nigrescentis aut coerulescentis coloris. Eligenda sunt frusta pura ea forma, ut acubus longis, latis, bellis splendentibusque appareant, ut facile frangantur pondereque insignia sint.

**Propriet.** Nec odor nec sapor ullus. Fractum autem aut frictum protinus sulfur redolet. Facillime funditur, tubulo fusorio expositum fumat, funditur super pruna, quam penetrat et penitus evanescit, exceptis floribus, quos circinnatim deponit. Lente sensimque calcinatum, largitur calcem cineream, quae ad ignem in scoriam ferrugineam et fere diaphanam vertitur: in acidis facile solvitur, in aqua regia sola pars metallica, sulfure separato, superficiem patente.

**ARISTOLOCHIA LONGA.**      **ARISTOLOQUIA LONGA.**  
Radix.

*Aristolochia longa* L.

**Locus.** Habitat in Europa australi et Lusitania. Floret Aprili ad Iunium usque. Perennis vulgaris.

**Forma.** Radix sicca cylindrica, obtusa, pollicem crassa, palmum longa, extus sulcata, rugosa, coloris cinerei, dura, subfragilis, intus flavicans seu exalbida.

**Propriet.** Odor subnauseosus: sapor aromaticus, amaricans et acris.

**ARNICA.**      **ARNICA.**      Radix, folia, flores.  
*Arnica montana* L.

**Locus.** Habitat in montibus et pratis Europae borealis: etiam in Lusitania. Floret Maio et per totam aetatem. Perennis.

**Forma.** Radix fibrosa, mole pennae anserinae, extus variegata, intus alba. Folia ovato-oblonga, integerrima, molliter ciliata, supra scabra, subtus laevia, trinervia. Flores lutei, compositi flosculi disci hermaphroditis, tubulosi, quinquefidis, radii femineis lingulatis tridentatis.

**Propriet.** Odor radiceis subaromaticus: sapor suavissime amarus et acris, foliorum subsalsus et amaricans, florum amarus et acris.

**ARTEMISIA.****ARTEMISIA.****Folia.**

*Artemisia vulgaris* L.

**Locus.** Habitat in locis cultis et ruderalibus Europae et Lusitaniae. Floret per totam aestatem.

**Perennis.**

**Forma.** Folia pinnatifida, plana, supra viridia, glabra, striata; subtus tomentosa incana: fissa in lacinias oppositas lanceolatas acutas, iterum partitas in lacinulas lineari-lanceolatas acutiusculas dentatas.

**Propriet.** Odor subfragrans. Sapor amarus, subaromaticus.

**ARUM.****ARRO.****Radix recens.**

*Arum maculatum* L.

**Locus.** Habitat in nemoribus, vallibus, locisque umbrosis Lusitaniae totiusque Europae. Floret a Maio ad finem aestatis.

**Perennis.**

**Forma.** Radix est tuberosa, ovata, mole pollicis vel ovi fere columbini, cincta tuberculis, velut bulbillis rotundis, et radiculis, maxime basi apice gerit squamas multas albas, velut pelliculas,

intra quas latet denticulus segregatus, acutus, sub-  
arcuatus. Parenchyma est carnosum, album, la-  
cteum succo scatens. Sicca radix est dura, fragilis,  
subdiaphana, farinosa, albissima.

**Propriet.** Nullus odor. Sapor acris, ardens.  
Manducata vellicat et urit linguam: quae quidem  
acrimonia sensim minuitur, ut radix siccescit.

**ASA FOETIDA. ASSAFETIDA. Gummi-resina.**

*Ferula Asa foetida* L.

**Locus.** Habitat in Persia. **Perennis.**

**Forma.** Gummi resina in granis aut lacrimis  
albidis, flavidis, aut in frustis maioribus glutinosis  
flavidis, quae constant lacrimis albidis, flavicanti-  
bus aut rutilis, lucidis. Eligenda est in lacrimis,  
aut, nisi hae adsint, in frustis puris et lacrimas ex-  
albidas continentibus.

**Propriet.** Odor fortissimus, alliaceus. Sapor  
acris, amaricans. Manducata protinus glutinosa  
est, dein sensim in saliva solvitur, quam lacteam  
facit. Trita cum aqua frigida solvitur, licet haud  
omnino, aquaeque lacteum impertit colorem. Di-  
gesta in aqua loco tepido, protinus tota superficies  
albescit, continuata dein digestionem, reducitur in  
substantiam cretaceam, parte gummosa soluta red-  
dente aquam pallide rutilam.

**AURANTIUM HISPALENSE. LARANJERA, AZEDA.**

Folia, flores, cortex exterior aut flavidus,  
succus denique fructus.

*Citrus Aurantium* L.

**Locus.** Habitat in India orientali: colitur in Hi-  
spania, Lusitania et Brasilia. Floret Martio. Arbor.



**Forma.** Folia coriacea, ovato-oblonga, acutiuscula, subserrata, laevia, utrinque subluclida, saturrime viridia, petiolis basi teretibus, apicem versus auriculatis. Flores albi, carnosì, quinque petalis oblongis, planis. Fructus est bacca subrotunda, cortice crasso, flavissimo subrutillante, innumeris punctis seu foraminulis obsito; intus albo, spongioso. Parenchyma, seu medullam dixeris, flavicans, octo aut duodecim nucleos segregatos continens, qui ope pellicularum albarum distinguuntur. Has autem cingunt vesiculae cylindricae acutae, succo pellucido scatentes.

**Propriet.** Odor foliorum est aromaticus, maxime dum manibus fricantur; florum aut petalorum fragrantissimus, aromaticus, suavis; corticis flavi pariter aromaticus, gratus. Sapor foliorum aromaticus, subamaricans: florum leviter amarus, corticis flavi acris, aromaticus, amarus, succi acidulus, nullo odore.

AVENA.

AVEA.

Semina.

*Avena sativa* L.

**Locus.** Habitare in Insula Juan Fernandez Ansonius testatur: pariter in Asia. Colitur in Lusitania.

Annua.

**Forma.** Semina sunt oblonga, hinc convexa, illinc plana, utrinque acuta, lateris plani sulco longitudinali exarata, oblecta pellicula subcinerea, flavicante aut nigricante, medulla aut parenchymate albissimo, farinoso. Eligenda sunt, quae pellicula vel grysea vel flavicante gaudent, turgida et ponderosa.



Propriet. Odor nullus: sapor insipidus, mucosus, farinosus, vix dulcis.

### BALSAMUM COPAIVAE f. BRASILIENSE.

BALSAMO OU OLEO DE COPAIVA. Resina.  
*Copaifera officinalis* L.

Locus. Habitat in Brasilia, praesertim ad Maranhão et in Guiana. Arbor.

Forma. Resina liquida, ad olei instar, et coloris expers, dum ex arbore fluit, sed tempore spissescit, colorem pallide flavum acquirit.

Propriet. Odor fragrans, balsamicus, gratus. Sapor acris, amaricans, aromaticus. Tritum aqua hanc turbidam reddit lacteamque, sed paullo post guttae sparsae in superficie aquae coeunt, hancque relinquunt limpida. Alioquin iungitur aqua ope vitelli aut albuminis ovi aut mucilaginis, unde emulsionis species nascitur. Solvitur in oleis tum essentialibus tum fixis, in his vero difficiliter. In spiritu vini pariter omnino solvitur, solutione pellucida et fragrante.

### BALSAMUM PERUVIANUM. BALSAMO PERUVIANO. Balsamum.

*Myroxylon peruiferum* L. Arbor.

Locus. Habitat in Peru, Brasilia et Mexico.

Forma. Balsamum minus liquidum quam mel spissum, colore nigricante subrutilante, opaco: sed protinus ut in vitro panditur, pellucidum rutilumque.

Propriet. Odor fragrans, suavis, Vanillam aemulans. Sapor acris, aromaticus, subamari-

cans. Ad flammam ardet. Tempore in vasis, quò continetur, fundo cryſtalli ſalinae efflorefcunt, quae ſolutae in aqua floribus Benzoës ſimiles ſunt. In ſpiritu vini rectificato facile ſolvitur, pariter in oleis eſſentialibus, nequaquam in fixis aut in adipe. In aqua frigida ſubito ſubſidit, iungitur tamen cum ea ope mucilaginis aut vitelli ovi: nihilo- minus aqua trita cum hoc baſſamo ipſi odorem adimit.

**BALSAMUM S. THOMAE.****BALSAMO DE TOLÚ?**

Refina.

Ignotum genus plantae, unde ſumatur.

**Locus.** Invenitur in Inſula S. Thomae. **Arbor.**

**Forma.** Refina liquidior melle ſpiſſo aut terebinthina: coloris aurei aut pallide flavi, glutinoſa, pellucida.

**Propriet.** Odor fragrans, gratus. Sapor acris, amarus. Manducatum haud ſolvitur in ſaliva, ſed dentibus adhaeret: ad flammam accenditur, ſed protinus liqueſcit, guttatim deſluit et extinguitur. In ipſo aeſtu ignis omnino funditur, ad flammam autem vivide accenſum ſumum ſpargit gratum. Solvitur omne in ſpiritu vini rectificato, facillime miſcetur oleis eſſentialibus, aegerrime fixis adipique. In aqua haud ſolvitur, ſed ebulliens cum ea, odorem impertit, quadantenus iungitur ope mucilaginis aut vitelli ovi.

## BARDANA.

## BARDANA.

## Radix.

*Arctium Lappa* L.

**Locus.** Habitat in locis cultis Lusitaniae. Floret a Iunio ad Septembrem. Perennis vulgaris.

**Forma.** Radix fusiformis, teres, pedem longa, radiculis cincta, cortice cinereo aut nigricante. Parenchyma album, transversim sectum prodit medullam spongiosam orbicularem. Siccata est dura fragilis, coloris sordidi.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor subdulcis amaricans. Manducata mollescit in ore, comminuitur, nec ingrata est.

## BDELLIUM.

## BDELLIO.

## Gummi-resina

Ignotum genus plantae.

**Locus.** Invenitur in Arabia et India. Arbor

**Forma.** Gummi-resina in lacrimis aut granis ceraforum maiorum mole, angulatis, extus rugulosis, subdiaphanis, segregatis aut secum cohaerentibus, coloris obscure rufi, fragilibus: fracta haec frusta plana sunt, laevia, sublucida.

**Propriet.** Odor haud ingratus, subfragrans sapor amaricans, leviter vellicans. Calore manu sine negotio mollitur: manducatum dentibus adhaeret. Ad ignem nec funditur nec mollitur sed ad flammam admotum accenditur et ardet, licet haud sine difficultate, flamma est clara cum odore balsamico: simul crepitans disilit, e superficie exsudante liquore: superest denique carbo niger, subsordidus, splendens, fragilis. Haudquam solvitur in oleis fixis nec in essentialibus, sec

mollitum tingit ea colore flavido. In aqua frigida mollescit, in fervida ad dimidiam partem solvitur: quod superest resinofum, solvitur in spiritu vini, cui tamen odoris sui nihil impertit. Communicat eum cum aqua, cum qua destillatur.

BENZOË.

BEJOIM.

Balsamum solidum.

*Styrax Benzoin Dryandr.*

Locus. Habitat in Sumatra, Java, Siam. Arbor.

Forma. Balsamum solidum in offis maioribus, quae laminis componuntur rufis seu viridiusculis, intersparsis granis, velut nucleis amygdalarum, diversae molis, albis, fragilibus, sublucidis.

Propriet. Odor fragrans, suavis, praecipue cum fricatur aut calefit. Sapor subdulcis, balsamicus. Manducatum inter dentes abit in frustula, sed haud solvitur: admota flamma ardescit cum fulgore et fumo: superest carbo niger, splendens, fragilis, manus inquinans. Ad ignem funditur, spumat, fumumque spargit odoris grati. In spiritu vini omnino solvitur, solutione flavicante subrutila. Aqua agitatum huic lacteum largitur colorem, quod lac vocatur *virgineum*. Nec in fixis solvitur oleis nec in essentialibus, nec in aqua: huic tamen, ope digestionis, impertit fragrantem odorem et saporis aliquantum. Blandissimo calore evaporatum salem largitur essentialem acidum, similem ii, quem e Benzoë, ope sublimationis, nanciscimur, *flores Benzoës* vocatum, acubus longiusculis constantem.



## BISTORTA.

BISTORTA. Radix.

*Polygonum Bistorta* L.

Locus. Habitat in montibus Europae, Lusitaniae, etiam in pratis. Floret per totam aestatem.

Perennis.

Forma. Radix subcylindrica, torta, flexuosa, digitum crassa, extus cinerea, annulata, per totam superficiem fibrillis cincta. Parenchyma recentis est carneum, exalbidum; siccae solidum, fragile, pallidum aut rufum.

Propriet. Odor radicis recentis Nasturtio aquatico similis, siccae nullus. Sapor recentis satis stypticus, siccae multo minus.

## BOLUS.

Bolo.

Terra pinguis.

*Argilla Bolus* L.

Locus. Invenitur in Lusitania, aliisque regionibus.

Forma. Terra argillacea frustis variae molis, particulis constans subtilissimis, ad tactum unctuosus: fracta parum splendet, colore gaudet albo, flavicante, rutilo. Eliguntur frusta pura a sordibus et arenis, tactu suavia, nitentia, facillime in pulverem fatiscientia, linguae labiisque adhaerentia.

Propriet. Nullum habet odorem, nullum saporem. Aqua agitata sorbet eam, quod et accidit, dum ori admovetur: igne durefcit et aspera fit, ut aliae terrae argillaceae.



**BORAX.**      **TINCAL.**      **Sal neuter imperfectus**  
*Borax Tincal* L.

**Locus.** Reperitur in regno Tibet, in fundo lacus Neibal, in cavernis nonnullis Persiae, in Ceylona, Tataria magna, in Saxonia, in vicinia Halberstadii et, ut fertur, in provincia Bahia ad flumen *das Contas*.

**Forma.** Borax est sal neuter imperfectus, natus e connubio salis acidi boracici aut salis sedativi et alcali fixi mineralis. In dictis locis invenitur in crystallis crassis gryseis, pinguedine quadam tectis, quarum forma constans refert prismata plana hexaëdra, terminata pyramidibus obtusis triëdriis, aut crystallos exiguas, irregulares, albidas, diaphanas, immerfas substantiae aut massae unctuosae, rancidae, coloris cinerei aut virescentis, in frustra secedentis. Hac forma vocatur *Borax crudus*: is depuratus, ubi nomen verum *Boracis* obtinet, crystallis constat formosis, diaphanis, albis, parallelepipedis, rectangulis, marginibus omnibus truncatis, aut pyramidibus tetraëdriis, longitudine interdum duorum pollicum.

**Propriet.** Saporem habet parum salsum et stypticum. Aëri expositus pulvere albo obtegitur, quo pelluciditas perditum it: ad ignem funditur, turget, et mutatur in massam spongiosam, levem, quae dicitur *Borax calcinatus*: denique abit in vitrum diaphanum, neque amplius mutatur, amissa aqua crystallis idonea. Syrupum violarum viridi tingit colore. Solvitur in duodecim partibus aquae frigidae, fervidae sex; in quam solutionem

si acidum vitriolicum instillatur, hoc unitur cum alcali minerali, et sal sedativus aut acidum boracicum in crystallos abit squamatas aut foliola magis pellucida ac splendentia, quod etiam contingit ope acidorum aliorum.

## CACAO.

## CACAO.

## Semina.

*Theobroma Cacao* L.

**Locus.** Habitat in locis umbrosis Americae meridionalis et Mexico.

**Arbor.**

**Forma.** Semina mole et figura amygdalarum, pellicula chartacea, membranacea, cinerea subrutila, medulla aut parenchymate unctuofo, nigricante, aut rufescente, quod secedit in plures lobulos irregulares, tortos, pellicula tenerrima cinctos.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor subunctuosus, stypticus, amarus, gratus. Manducata in frustula discedunt, paullatim consumta in ore. Flammae admota ardent clara flamma sine fumo.

## CALAMUS AROMATICUS.

## CALAMO AROMATICO.

## Radix.

*Acorus Calamus* L.

**Locus.** Calamus vulgaris habitat in lacubus stagnisque Europae; asiaticus in locis humidis, etiam in siccis altisque Indiae orientalis ac Brasiliae: hic colitur in Europa.

**Perennis.**

**Forma.** Radix recens est cylindrica, subelongata, ramosa, digitum crassa, articulata aut nodosa, oblecta cortice stupeo cinctaque radiculis innumeris, velut fibrillis albis, basi prodeuntibus,

quae iterum fibrillis aliis capillaribus cinguntur. Parenchyma carnosum, album, quod, transversim sectum, totum foraminulis cribratum apparet, sicut et medulla ovalis, quae praeter foraminula punctula prominula ferruginea habet. At radix sicca exstat in frustis longiusculis, extus asperis, cum punctis prominulis gryseis aut pallidis, intus albidis, parenchymate farinoso, albido, fragili. Radix calami asiatici est singularis, tenerior, durior, magis nodosa, colore rufo in cinereum abeunte, intus albicans, spongiosa.

**Propriet.** Odor fragrans. Sapor aromaticus, acris, leviter amarus. Quae quidem qualitates pariter in sicca ac in recenti radice observantur, acrior tamen est recens. Radix calami asiatici praestat omnino europaea.

**CALX VIVA.** CAL VIVA, OU VIRGEM. Lapis calcareus purus recens ustus.

**Locus.** Invenitur circa montes ignivomos: sed usitatus est arte factus.

**Forma.** Calx viva est in frustis albis, satis fragilibus, facillime in pulverem farinosum, candidum fatiscentibus.

**Propriet.** Sapor acris, aestuans, urinosus. Aëri exposita turget, finditur, volumine aucto, calescit, abit denique in pulverem subtilem, albissimum, qui calx ad aërem extincta appellatur: quo facto amittit causticam indolem, attracto humore, simul acquirit potestatem, effervendi cum acidis, quae ante haud attrahebat, quod fit, sorbito ex

aëre atmosphaerico acido aëreo seu mephitico. Syrupum violarum viridi tingit colore, pariter etiam crotonis tincturam. Solvitur in septingenties tanto ponderis aquae, hanc calefacit, dum cum ea miscetur. Solutio inde nata vocatur aqua calcis, cuius proprietates eadem sunt ac calcis vivae. Igni fortissimo exposita, neque mutatur neque funditur, nisi cum aliis rebus terreis aut salinis mixta.

## CAMFORA.

## ALCANFOR.

*Laurus Camfora* L.

Locus. Habitat in Japonia, insulis Borneo, Sumatra etc. Arbor inculta.

Forma. Resina? depurata in frustis hemisphaericis, foratis media parte, hinc concavis, illinc convexis, albissimis, subdiaphanis, levibus, subfragilibus. Haec secedit ope sublimationis e camfora cruda, quae specie granorum flavicantium habetur, extractorum tum ex arbore illa, tum ex aliis plantis, nimirum e Zedoaria, Melissa, Rorremarino et Salvia.

Propriet. Odor singularis, fragrantissimus, fortis. Sapor acris, aromaticus, subamaricans, in lingua sensum frigoris excitans. Manducata dentibus adhaeret. Est adeo volatilis, ut aëri exposita avolet omninoque evanescat. Celeriter exardescit, comburitur flamma alba, vivida, relictis nec carbone nec cinere. Haudquaquam in aqua solvitur, sed huic odorem suum impertit, comburitur etiam in superficie eius. Protinus solvitur in spiritu vini,



pariter in acidis concentratis, e quibus tamen ope aquae iterum, haud mutata, secedit. Solvitur denique in oleis fixis et volatilibus; adiuvante calore: ex his separatur, vix refrigerescens, gradatim, specie crystallorum aut filorum subtilissimorum, quae hactenus disposita sunt, ut plumam referant.

CANTHARIDES. CANTHARIDAS. Insectum.

*Meloë vesicatorius* L. *Lytta vesicatoria* Fabr.

Locus. Habitat in Fraxinis, Sambucis, Ligustris et Caprifoliis totius Europae.

Forma. Insectum quadrialatum, cuius alae superiores durae sunt, viridissimae, splendidae, auratae, flexiles et striatae, inferiores cinereae. Corpus longiusculum, viride, coerulescens, antennae nigrae.

Propriet. Odor peculiaris, nauseosus. Sapor fatis acris.

CARDAMOMUM MINUS. CARDAMOMO MENOR.  
Fructus.

*Amomum Cardamomum* L.

Locus. Habitat in locis humidis Indiae orientalis, maxime in Java. Perenne.

Forma. Fructus est capsula aut folliculus verticaliter conicus, subrotundus, dimidium circiter pollicem longus, trigonus, obtusiusculus, saepe acutiusculus, levissime striatus, pallidus, ope dissepimentorum membranaceorum divisus in tres loculos, qui continent semina multa, dura, angulata, subquadrangula, rugosa, coloris fusci, medulla alba submucilaginosa.



**Propriet.** Odor fragrans, aromaticus, gratus. Sapor grate aromaticus, subamaricans, camforam quadantenus aemulans. Hae qualitates insigniores sunt in seminibus, quibus praecipue utimur.

**CARDUUS BENEDICTUS. CARDO SANTO. Folia.**  
*Centaurea benedicta* L.

**Locus.** Habitat in Hispania, Lusitania. Floret Maio et Iunio. **Annua.**

**Forma.** Folia sunt oblonga, longitudine sex aut septem pollicum, obtusa, rugosa, aspera, subtus arachnoidea, transversim sinuato-laciniata, spinosa, glutinosa, ciliato-spinulosa ambitu: inferiora petiolata, superiora sessilia erecta.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor amarissimus, diu persistens. Folia per aliquod tempus in aqua frigida macerata, huic impertiunt saporem amaricantem gratum, qui vero perit, cum maceratio continuatur aut dum effervesceat, fit enim tunc sapor nauseosus. Macerata in spiritu vini, huic quoque amaritudinem largiuntur, sed gratiorem aqua illa.

**CARYOPHYLLUS AROMATICUS. CRAVO DA INDIA.**  
**Flores siccati.**

*Caryophyllus aromaticus* L.

**Locus.** Habitat in Moluccis, colitur in Cayenna, Martinica et Hispaniola. **Arbor.**

**Forma.** Caryophylli aromatici, apud nos venales, sunt flores clausi, sicci, duri, ferruginei aut obscure fusci, longitudine dimidii pollicis, caryo-

phyllis haud abfimiles, fere quadranguli, rugulofi. In vertice habent quatuor dentes lanceolatos, acutos, concavos, ftellatim difpofitos, in quorum centro colliculus eft, fquamis exiguis imbricatis confians, quae cum hiant aut aperiuntur, monftrant filamenta plurima rubicunda. Eligendi funt bene nutriti, graviores, oleofi, fragiles, coloris fupra indicati, qui fordes nullas linquunt, ac, dum colliculus ille aperitur, exfudant humorem oleofum, qui denique odore faporeque fortibus gaudent.

Propriet. Odor fragrans, validus, aromaticus, fuavis. Sapor aromaticus, fortis, calidus, fubacris, amaricans; manducati calefaciunt palatum et linguam.

## CASCARILLA.

## CASCARILHA.

## Cortex.

*Croton Cascarilla* L.

Locus. Habitat in Jamaica, Peru, Paraguay.

Arbor.

Forma. Cortex venum it fruftis convolutis tubulorum more, longitudine aliquot pollicum, diametro dimidii aut integri pollicis, lineam craffis, furis, fragilibus, coloris cinereo-fufci, obtectis pellicula alba, rugulofa, tranfverfim ftriata, faefiffime mufcis abundante, qua demta ilico color mufcus corticis prodit.

Propriet. Odor aromaticus, debilis: accensus ardet flamma vivida, odore fparfo fragrante. Sapor amarus pariter ac aromaticus.

CASSIA FISTULA.      CANA FISTULA.      Fructus.

*Cassia Fistula* L.

Locus. Habitat in India, Aegypto, Brasilia.

Arbor.

Forma. Legumen tubulosum, cylindricum, dimidium cubitum longum, pollicem crassum, vel rectum vel arcuatum, capitulo aut tuberculo subrotundo. Cortex sublignosus, fragilis, nigrescens, glabriusculus, sutura longitudinali ab altera parte magis conspicua, ab altera sutura clausa instructus. Cavitas interna transversim dividitur, ope dissepimentorum parallelorum, in loculos, repletos pulpa mellea nigricante, subnitida: quivis loculus continet semen unicum, phaseoli mole, ovatum, obtusum, utrinque planum, durum, lucidum, ferrugineum. Eligenda sunt legumina grandiora, crassiora, pondere praestantia, integra: quae manibus tractata semina intus haud percipere sinunt: quae extus nigrescunt, splendent, ac pulpam continent dulcem boni odoris, nulloque modo acidam.

Propriet. Sapor pulpae est dulcis, subacidulus, nonnunquam nauseosus. Omnino fere in aqua solvitur, nequicquam in spiritu vini.

CASTOREUM.      CASTOREO.

*Castor Fiber* L.

Locus. Habitat in Lapponia, Sibiria, Canada.

Animal quadrupes.

Forma. Castoreum est substantia pinguis, mollis et subliquida, dum recens est: sed sicca est dura,

nigrescens, pelliculis subtilissimis mixta, inclusa folliculis duobus aut vesicis coriaceis, contiguis, ad basin urethrae Castoris sitis, cum qua coniunguntur ope peculiaris foraminis.

**Propriet.** Odor est fortis, aromaticus, gravis. Sapor acris, amarus, nauseosus. Solvitur partim in spiritu vini et aethere, partim in aqua. Haec solutio evaporata largitur salem, cuius natura etiamnum ignota est. Ex analysi chemica efficitur, esse castoreum refinam cum mucilagine animali aut gelatina et sale quodam iunctam.

**CATECHU.**      **CATO.**      **Extractum gammoso-resinosum.**

*Mimosa Cate Murr.*

*Mimosa Catechu Linn.*

**Locus.** Habitat in India orientali et montibus Rota, Pallamor et aliis regionibus altioris Bengaliae.      **Arbor.**

**Forma.** Gummi-refina in frustis siccis, duris, fragilibus, coloris extus rufo-nigricantis, intus obscure rubicundi. Fragmentorum forma est irregularis, facile reducitur in pulverem obscure rubicundum. Saepenumero mixta est scobibus ligneis.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor substypticus, amarus, denique dulcis. Manducata comminuitur ac omnis in ore dissolvitur, cum pura est, salivam rubro tingit colore. In aqua penitus solvitur, exceptis sordibus: solutio rubra, cum perfrigit, mucosa videtur: pariter partim in spiritu vini solvitur, sed absque coaguli mucosi collectione post



refrigeratam solutionem. Ad flammam haud accenditur: sed in carbonem vertitur, fumo edito. In vase ferreo supra ignem mollescit, flammae admota accenditur, ardet flammula flavida, superstitute carbone sicco, nigro, fragili, splendido, parum inquinante.

**CENTAURIUM MINUS.** **CENTAUREA MENOR.** Herba cum summitatibus florentibus.  
*Gentiana Centaurium* L.

**Locus.** Habitat in terra sabulosa Lusitaniae totiusque Europae. Floret a Iunio ad Augustum.

Annua.

**Forma.** Caules plurimi ex eadem radice, recti, teretiusculi, ancipites, glabri, simplices. Folia radicalia caespitosa, spathulata, oblonga, integerrima, glabra, subcarnosa, petiolis brevibus: caulina sunt opposita, linearia, angusta, obtusa. Flores terni, in corymbum dispositi; corollae rubrae, infundibuliformes, quinquepartitae, in calycibus pariter quinquepartitis.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor amarissimus.

**CERA.** **CERA.** Oleum fixum solidum.

**Locus.** Invenitur in antheris florum, unde apes colligunt, peculiarique modo parant, ut ea forment favos et domicilia muniant: nec minus in floribus, fructibus et foliis plantarum quarundam reperitur.

**Forma.** Cera est in offis aut panibus solidis, oleosis, opacis, unctuosus, colore plus minusve flavicante.



**Propriet.** Nec odor nec sapor ullus. Manducata mollescit, dentibus adhaeret, sed haudquaquam in ore solvitur. In teneris laminis aëri exposita aut rori, albescit, sed dura simul fit et fragilis, dicta tunc *Cera alba*: id fieri etiam potest ope acidi marini dephlogisticati. Ad lenem ignem mollescit, funditur, abitque in fluidum oleosum, pellucidum, quod, ut perfrigit, in pristinum statum redit. Cum quodam gradu exaestuatur, accenditur et ardet flamma vivida. Nec in aqua nec in spiritu vini solvitur; sed solvitur in alcalinis, cum quibus hactenus iungitur, ut in aqua solvatur. Pariter in oleis solvitur.

**CEREFOLIUM.****CEREFOLIO.****Herba.**

*Scandix Cerefolium* L.

**Locus.** Habitat in campis Europae australis. Colitur in Lusitania. Floret Maio. **Annua.**

**Forma.** Caulis est teretiusculus, subangulatus, striatus, glaber, nodosus, viridiusculus. Rami, e nodis prodeuntes, solitarii, alterni, cauli similes. Folia, pariter e nodis nascentia, sunt alterna, petiolata, undique glabra, tenera, grate viridia, bipinnata, pinnulis elongatis, foliolis ovatis, acutis, incis, margine tenerrime ciliatis, nervis utrinque molliter pubescentibus, petiolis convexo-planis, sulcatis aut striatis.

**Propriet.** Odor plantae recentis gratus, aromaticus, dum fricatur: is perditum it, cum siccat. Sapor aromaticus, anisum parumper redolens, gratus, siccae herbae debilior.

## CHAMAEDRYS.

CAMEDRIOS.

Herba.

*Teucrium Chamaedrys* L.

Locus. Habitat in locis siccis Lusitaniae. Floret Iunio, Iulio. Perennis.

Forma. Folia sunt ovato-oblonga, obtusa, opposita, utrinque pubescentia, incisa, crenata, breviter petiolata.

Propriet. Odor leviter fragrans. Sapor amarus.

## CHAMOMILLA VULGARIS.

MARCELLA GALEGA.

Herba cum flore.

*Matricaria Chamomilla* L.

Locus. Habitat in locis incultis cultisque. Floret a Maio ad Iulium. Annu.

Forma. Caules sunt teretes, leviter striati, glabri, superne ramosi: Rami alterni, recti, foliis instructi sessilibus, alternis, subcarnosis, bipinnatis, multifidis, foliolis tenerrimis, acutis, viridibus. Flores sunt terminales, pedunculati, fastigiati, compositi flosculis disci flavis, tubulosis, radii semiflosculis ligulatis, albis. Omnes cinguntur calyce communi hemisphaerico, squamis longiusculis, velut tegulis, imbricato: margine apiceque squamae sunt scariosae, pellucidae.

Propriet. Odor fragrans, gratus. Sapor aromaticus, acris, amarus. In floribus magis conspicuae hae qualitates: siccatis nec his nec herba aliquid perditum it.

CHAMOMILLA ROMANA. MARCELLA ROMANA.  
Flores.

*Anthemis nobilis* L.

Locus. Habitat in pratis Europae totius et Lusitaniae. Floret a Maio ad Iulium. Annua.

Forma. Flores sunt compositi, radiati; flosculis disci hermaphroditis, tubulosis, margine incisis, utrisque; flosculis radii femineis ligulatis, albis: hiamen interdum desunt. Omnes continentur calyce communi hemisphaerico, leviter pubescente, sulcato, squamis margine scariosis, angustis imbricato. Squamae superiores paullo maiores sunt, obtusae, rotundatae, margine pariter scarioso.

Propriet. Odor fragrans, fortis, gratus. Sapor similis, amarus, acris. Hae quidem qualitates potentiores sunt Chamomilla vulgari, cui igitur praefenda est.

CHELIDONIUM MAIUS. CELIDONIA. Radix.  
Herba.

*Chelidonium maius* L.

Locus. Habitat in locis incultis Lusitaniae. Floret per totam aestatem. Perennis.

Forma. Radix recens est cylindrica, palmum longa, subramosa, fibrillis seu radiculis extus rugis (nigris, dum siccescunt), obtecta pellicula nitricante: parenchymate subcarnoso, flavicante, quod succum luteum fundit, dum transversim secatur. E radice surgunt caules plures, subquadranguli, asperiusculi, pubescentes, inferne simplices, apophylli, superne ramosi; ramis furcatis foliosis,

Codex medic. Europ. Sect. VI. p. 2.

C

sparsis, teretibus, pubescentibus. Folia pinnata, supra glabra, subtus pubescentia; foliola opposita, petiolata, ovata, obtusa, venosa, lobis obtusis serratis, sinuatis.

Propriet. Odor radices recentis parum foetet. Sapor est amarus, acris. Manducata salivam flavo tingit colore. Odor herbae parumper foetidus; sapor leviter amarus, acris. Planta sicca est magis amara, minus acris.

## CHINCHINA.

## QUINA.

## Cortex.

*Cinchona officinalis* L.

Locus. Habitat in Peru, maxime in montibus Loxae, in vicinia Rio Bambae, Cuença, Quito etc.

Arbor.

Forma. Cortex venit in frustis variae longitudo, convolutis aut planis: tener est, duriusculus, fragilis, extus rugulosus, asper, fissuris transversalibus, obtectus subinde muscis exalbidis, colore fusco-cinereo: intus cinnamomi colore, aut ferrugineo et rutilo. Fractus extrema ostendit glabra, aut fibrosa ac aspera.

Propriet. Odorem habet mucidum, saporem amaricantem, blande stypticum, denique parum aromaticum.

## CHINA RUBRA.

## QUINA VERMELHA.

## Cortex.

Haud exploratum habemus, cui arbori debeamus eum corticem, sed persuasum, eiusdem generis esse ac China vulgaris.

Locus. Habitat in iisdem locis ac regionibus quibus China vulgaris, praeterea quoque in Brasilia.

Arbor



**Forma.** Cortex in maioribus, crassioribus et maioris ponderis frustis, quam China vulgaris, intus cavis, duas lineas crassis, extus asperis, transversim fissis, saepe obtectis, lichene flavicante aut rubido. Sub prima tunica est stratum compactum, fragile, obscure rufum, sub hac autem aliud stratum rubrum, fibrosum, lignosum.

**Propriet.** Odorem habet vel mucidum, vel nullum. Sapor magis stypticus et amarus, quam praecedentis. Maiorem resina copiam haec continet, quam China vulgaris, quae maiore scatet extracti gummosi copia: quapropter China rubra potius vino et alcohole, vulgaris aqua paratur.

**ICHORIUM SYLVESTRE.** ALMEIRÃO. Radix.  
*Ichorium Intybus* L.

**Locus.** Ad vias et ubivis fere per totam Europam. Colitur etiam in hortis. Floret Iunio.

Bienne, vulgare.

**Forma.** Radix recens est fusiformis, teres, digitum crassa, palmum aut sesquipalmum longa, apiculis seu radiculis tecta. Cuticulam habet leviter fuscam, cum parenchymate albo, quod, transversim sectum, medullam teretem, duriusculam, radiatam, corticem vero carneum, lactescentem prodit.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor amarus, initio abdulcis.



## CICUTA MAIOR.

CIGUDE.

Herba.

*Conium maculatum* L.

Locus. Habitat in locis humidis et incultis Lusitaniae reliquaeque Europae. Floret a Maio ad Iulium.

Biennis

Forma. Caulis tri- quinquepedalis, crassus cylindricus, fistulosus, ramosus, foliosus, glaber viridis, maculis fuscis, rufisve notatus. Folia ampla, tripinnata, cum foliolis acuta, laciniis elongatis, dentatis, obscure viridibus, subnitidis.

Propriet. Odor foetidus, murinus. Sapor subaromaticus, herbaceus, nauseosus.

## CINNAMOMUM.

CANELLA.

Cortex

*Laurus Cinnamomum* L.

Locus. Habitat in Ceylona, colitur in Sumatra, Java, Malabaria, Brasilia.

Arbor

Forma. Cortex siccus est tener, convolutus tubulis longiusculis, glabris, fragilibus: qua frangitur, apparet fibrosus, asper, planus, colore pallide rubro, intus magis pallido. Eligendus est tenuissimus, flexilis, ruber, subdulcis, acriusculus reiicienda frusta dura, crassa, fusca, linguam vellicantia. Hic est, cuius sapor caryophyllos indicos refert, sequente sapore styptico, amaro aut viscoso.

Propriet. Odor fragrans, aromaticus, suavisimus. Sapor subdulcis, aromaticus, gratus, deinde acris, calefaciens, persistens.

COCHLEARIA. COCHLEARIA. Herba recens.

*Cochlearia officinalis* L.

Locus. Habitat in locis humidis, maritimis Galliae, Helvetiae, et borealium regionum Europae. Colitur in Lusitania. Floret Aprili et Maio.

Annua.

Forma. Caules sunt octo aut decem pollices longi, glabri, teneri, leviter angulati, ramosi, debiles; plurimi ex una radice surgunt. Folia radicalia congesta, longe petiolata, subrotunda, corollata, glabra, viridia, carnosae, succulenta, concava, ad cochlearis instar. Folia caulina subsessilia aut breviter petiolata, subangulata, summa amplexicaulia, ovata, acuta, utrinque unidentata. Corymbi florum terminales, simplices, fastigiati, pedunculis sparsis, asperis.

Propriet. Odor recentis fricatae penetrans, ingratus. Sapor acris, vellicans, amarus: uterque emulatur Nasturtium aquaticum, dum recens est planta. Siccata folia vix amara sunt.

COLCHICUM. COLCHICO. Radix recens.

*Colchicum autumnale* L.

Locus. Habitat in pratis totius Europae. Floret Septembri et Octobri. Perennis.

Forma. Radix subrotunda, bulbosa, hinc gibbosa, illinc plana aut concaviuscula. Obtegitur tunica coriacea, fusca, nervosa: haec autem cingitur pellicula teneriore, flavicante. Parenchyma est solidum, carnosum, album, succulentum: hoc magis insigne est autumnno quam vere. Ad latus

adnexus est bulbus minor, anno sequenti florens, priori sensim destructo. Si forte vere legitur radix, bulbi haud sumendi sunt, qui elapso anno floruerunt.

Propriet. Odor foetidus, subhircinus. Sapor acris, nauseosus. Manducata radix vellicat et calescit linguam ac palatum: dissecta haud lactescit sed succum fundit albescentem, amylo mistum cultro adhaerentem.

COLOCYNTHIS.      COLOQUINTIDAS.      Fructus  
*Cucumis Colocynthis* L.

Locus. Habitat in insulis Archipelagi, in insula S. Michaëlis, in Orientis locis maritimis.

Perenni

Forma. Fructus est pomum subglobosum, pugni mole, glabrum, viridiusculum, aut albescenti flavidum, dum maturum est: satis leve, cortice tenero, duriusculo aut coriaceo, qui ambit pulpam spongiosam albam. Ex Aleppo autem venier pomum est sine cortice, siccum, spongiosum, album, molle, chartaceum, in sex loculos divisum in quibus nidulantur semina ovata, obtusa, utrinque plana, glabra, flavicantia.

Propriet. Odor nidoris, ingratus. Sapor amarissimus, nauseosus, subacris.

COLOMBO.      CALUMBA.      Radix  
Genus plantae ignotum.

Locus. Habitat in Asia.

Forma. Radix sicca venit taleis orbicularibus quarum diametrus semipollicem ad tres pollices

aequat, longitudine quadrantis pollicis ad duos, cortice admodum rugoso, crassiusculo, virescente, medulla aut parenchymate flavido, centro subfusco, radiis medullaribus nigricantibus, punctisque luteis.

**Propriet.** Odor leviter aromaticus: sapor amarus acriusculus. Manducata mollescit, in saliva fere solvitur, quam colore luteo tingit, vellicat linguam palatumque quadam amaritudine, quae diu persistit.

**CONTRAYERVA. CONTRAHERVA. Radix.**

*Dorstenia Contrayerva* L.

**Locus.** Habitat in Mexico, Peru, insula S. Vincentii et Brasilia. Perennis.

**Forma.** Radix unum ad tres-pollices longa, nodoso-squamata, fibrillis aut radiculis longis, ramosis munita, quae undique, maxime inferne prodeunt: colore extus fusco, intus albido.

**Propriet.** Odor fragrans, ficuum folia aequans. Sapor acris, amarus, aromaticus. Fibrae nullum paene habent odorem neque saporem, hinc radix crassa eligi debet.

**CORNU CERVI. Corno de veado.**

*Cervus Elaphus* L.

**Locus.** Habitat in Europa. Animal quadrupes.

**Forma.** Cornua sunt grandia, teretia, arcuata, ramosa, rugosa, extus fusca, intus alba: transversim secta, videntur duplici substantia constare, altera media, cuius fibrae remotiusculae, al-



tera peripherica, cuius fibrae adeo implicitae sunt, ut haud distinguantur.

**Propriet.** Nullum habet odorem, nec saporem. Sed in aqua bulliens, glutinosam partem huic impertit, aut gelatinam, quam continet, relictæ terrea parte.

**CROCUS.**

**ACAFRÃO.**

**Stigmata.**

*Crocus sativus officinalis* L.

**Locus.** Habitat in montibus Helvetiae, Pyrenaeis, Thraciae, Lusitaniae. Colitur in Hispania et hortis Lusitaniae.

**Forma.** Stigmata sunt ligulata, pallida, aurantiaca, incisa, lobis pallidis aut luteis. Eligenda sunt recentissima, longiuscula, integra, subalbida, coloris lucidi, bene nutrita, subglutinosa, fragilia, pistu difficilia, humecta manus luteo colore tingentia.

**Propriet.** Odor singulariter fragrans, subaromaticus. Sapor aromaticus, subamaricans. Manducatus mollior, glutinosus videtur, salivam luteo colore afficit. Pistitur difficulter, nisi prius ignis calore siccuerit.

**CUPRUM.**

**COBRE.**

**Metallum imperfectum.**

**Locus.** Invenitur in terrae penetralibus, varia forma; nimirum 1. *virgineum* s. *nativum*; 2. ope sulfuris in mineram reductum et mixtum cum aliis metallis aut semimetallis; 3. *salinum*, iunctum acido vitriolico aut marino; 4. *calcis* forma.

**Forma.** Metallum rubicundum, solidum; fractum splendet: satis sonorum ac elasticum.



**Propriet.** Odor est ingratus, dum raditur: sapor stypticus, nauseosus. Pes cubicus cupri pondere aequat 545 libras: gravitas specifica est 77,880. *Briffon.* Malleo pulsatum in laminas teneras extenditur, e quibus ducuntur fila adeo tenuia iuxta ac fortia, ut filum cupreum, cuius diametrus aequat decimam pollicis partem, sustineat 299 libras cum quatuor unciiis, neque rumpatur. Aëri expositum mutatur, nigrescit, obtegitur rubigine viridi. Igni admotum coerulescit, tunc flavescit, denique rubescit. Postquam probe excanduit, funditur, quo facto aëris contactus in calcem mutat superficiem, atque squamas producit rubras nigrescentes. Laminae super prunis extensae flammae largiuntur colorem coeruleum, viridiusculum. In aqua omnino pura haud mutatur, nisi vaporibus soluta sit. Solvitur in omnibus acidis, e quo connubio varii sales existunt neutri metallici, coloris viridis aut coerulei: nec minus in oleis, liquoribus animalibus et unguinosis, in alcalibus, maxime volatili, quod ipsum coeruleum facit, solvitur.

**CYDONIA.**      **MARMELO.**      **Fructus, semina.**  
*Pyrus Cydonia* L.

**Locus.** Habitat in Pannonia, colitur in vineis hortisque Lusitaniae. Floret Martio.      **Arbor.**

**Forma.** Fructus est pomum subglobosum, aut pyriforme, apice umbilicato, cincto foliis quinque; cortice flavo, pubescente, aut albido-tomentoso, carne seu parenchymate solido, flavo, capsula quinqueloculari, seminibus ovatis acutius-

culis, hinc planis, illinc convexis, putamine ferrugineo aut fusco, medulla alba.

Propriet. Odor fructus maturi est fragrans. Sapor stypticus, acidulo-dulcis, cum nondum maturuit, admodum stypticus, acidus. Sapor seminum succulentus, mucilagineus.

**DIGITALIS.****DEDALEIRA.****Folia.**

*Digitalis purpurea* L.

Locus. Habitat in sylvis montosis, terrisque sabulosis, rupestribus Lusitaniae aliarumque Europae regionum. Floret aestate. Annuæ (sic!).

Forma. Folia sunt ovalia, ovali-lanceolata, acuta, dentata, viridia, supra subrugosa, subtus incana subtomentosa.

Propriet. Sapor amarus, subacris.

**DULCAMARA.****DOÇAMARGA.****Rami et folia.**

*Solanum Dulcamara* L.

Locus. Habitat in terris humidis umbrosis Lusitaniae. Colitur in hortis, floretque per totam aestatem. Frutex.

Forma. Caules sunt flexuosi, debiles, teretiusculi aut angulati, rugulosi, asperi, ramosi. Folia ovata, petiolata, acuta, glabra: inferiora integra, superiora hastata, petiolis glabris, subtus convexis, supra canaliculatis.

Propriet. Odor caulium foliorumque recentium est subfoetidus, nauseosus, siccorum nullus. Sapor amarus, denique subdulcis.

**EBULUS.** ENGOS. Radix, cortex interior, folia,  
flores, baccae, semina.

*Sambucus Ebulus* L.

**Locus.** Habitat in locis humidis umbrosis Lulitaniae. Floret Maio et Iunio. Perennis.

**Forma.** Radix est alba, subcarnosa, teres, digitum et quod excurrit, crassa. Caulis herbaceus, orgyalis, teretiusculus, glaber, striatus, sulcatus, nodis planiusculis, superne ramosus. Folia ampla, impari-pinnata: foliola lanceolata, basi inaequalia, acuta, supra glabra, subtus pubescentia, margine serrata, aequalia, impari maiori. Flores albi, corymbosi, corollis rotatis monopetalis, laciniis quinque lanceolatis acutis. Baccae globosae, apice planiusculae, calyce quinquesido coronatae, nigrescentes, glabrae, nitidae, parenchymate succulento puniceo. Semina ovata, subtrigona, rugulosa.

**Propriet.** Odor radices debilis, vel nullus; corticis et foliorum foetidus; florum gratior, baccarum nullus. Sapor radices corticisque amarus, nauseosus, ingratus; foliorum protinus ingratus, sed manducatorum satis amarus, nauseosus, saliva rubro viridiusculo colore tincta. Florum sapor admodum amarus; baccarum acidus, amarus, seminum etiam amarus.

**ELEMI.** ELEMI. Refina.  
*Amyris elemifera* L.

**Locus.** Habitat in nova Hispania et Brasilia.

Arbor.

**Forma.** Resina in massis solidis, pallidis, maculis varii coloris, flavi, viridis: in granis albidis seu flavis, aliis opacis, aliis subdiaphanis, fusco-maculatis. Cum recens est, mollitiem cereae habet, etiam magis, cum dentibus manducata molli-  
tur ipsisque adhaeret. Frigore tamen durescit et fragilis fit. Scinditur cultro, quaque id fit, mol-  
lis est.

**Propriet.** Odor fragrans, haud admodum gratus. Sapor est subingratus, amarus, aromaticus. Manducata molli-  
tur, in massas abit, neque dentibus adhaeret, neque solvitur ore. Igni in vase ferreo exposita accenditur, ardetque flamma clara, lucen-  
te. Quamvis in aqua haud solvatur, particeps tamen fit aqua frigida, in qua iacet, odoris saporisque.

ENULA CAMPANA. ENULA CAMPANA. Radix.  
*Inula Helenium* L.

**Locus.** Habitat in pratis umbrosis, pinguibus et montosis, Lusitaniae, Galliae etc. Perennis.

**Forma.** Radix est grandis, crassa, superne ramo-  
sa, extus fusca aut cinerea, intus alba, radicu-  
lis aut fibris capillaribus undique cincta. Paren-  
chyma carnosum, medulla alba, annulo punctato  
coronata, cuius ambitus est incarnatus, radiatus.

**Propriet.** Odor fragrans, violaceus. Sapor  
acris, subamarus, aromaticus.

EUPHORBIIUM. EUPORBIO. Gummi-resina.  
*Euphorbia officinarum* L. et antiquorum Ej.

**Locus.** Habitat in Aethiopia, aliisque partibus  
Aethiopiae aestuosis. Arbusculum.



**Forma.** Gummi-resina in grandibus lacrimis aut offis variae molis, subglobosis aut longiusculis, siccis, fragilibus, subinde fere ramosis, pluribus foratis, flavidis aut rufis et exalbidis, similibus cereae flavae, sed haud lucidis, nisi duntaxat glabris.

**Propriet.** Odor debilissimus aut nullus. Sapor protinus haud percipitur, sed postea fit acris, vellicans, ardens, nauseosus diuque inhaerens. Manducatum aut in ore contentum solvitur in saliva, inflamat corroditque partes, unde et diu fauces ea sensatio affligit, quo magis aqua frigida eluuntur. Igni admotum accenditur, ardetque flamma vivida, fumo fuligineque ortis. Tantum in spiritu vini quantum in aqua solvitur, unde aequalem esse gummosam ac resinosa partem, efficiamus. Pisti pulvis subtilis spiritus impedit, unde et mortarium contegi et oris nariumque aditus muniri expedit.

**FARFARA.**

**TUSSILAGEM.**

**Folia.**

*Tussilago Farfara* L.

**Locus.** Habitat in locis humidis, lutosis totius Europae. Floret Martio et Aprili. **Perennis.**

**Forma.** Folia radicalia, longe petiolata, cordato-subrotunda, sublobata, rubro-denticulata, grandia, plana, supra lanuginosa, venosa, subtus tomentosa, incana. Petioli subtus convexi, supra plani, subtomentosi.

**Propriet.** Odor plantae siccae debilis, sapor amaricans.



**FERRUM.**      **FERRO.**      Metallum imperfectum.

**Locus.** Invenitur per totum orbem ac in omnibus naturae regnis. Fossile, quo statu abundat, reperitur metallicum, nativum aut virgineum, calcinatum, aut ope sulfuris aliarumque rerum in mineram redactum.

**Forma.** Metallum durissimum, fusco-cine-reum, subcoeruleus, fractum monstrat facieculas aut particulas subsibrosas, splendidas.

**Propriet.** Nullum habet odorem, neque saporem, nisi radatur aut candescat: tunc enim odor peculiaris sentitur et sapor stypticus. Praeter stannum levius est caeteris metallis: cum pes cubicus ferri fabricati pondere aequet 545 libras, fusi pondus specificum sit 72,070. *Briffon.* Cum friget, parum aptum est fundi malleoque pandi, ope vero ignis omnes formas qualescunque obtinet, atque in fila subtilissima duci potest, quae adeo fortia sunt, ut filum, cuius diametrus decimam habet pollicis partem, sustineat 450 libras, neque rumpatur. Est maxime elasticum sonorumque omnium metallorum. Fortiter rasum vel secum, vel magnetis ope, virtutem magneticam acquirit, ferrum igitur attrahit, trahiturque magnete. Aëri, praesertim humido, expositus, vertitur et superficies et interna fabrica in pulverem ferrugineum aut rubiginem, quae *Crocus ferri* aut *martis aperiens* vocatur. Limatura diu in aqua macerata in pulverem subtilissimum satiscit, coloris nigricantis, *Aethiops martialis Lemerii* vocatum. Ignis violentus, sine aëris contactu, fundit ferrum omnino, demum

abit facillime in calcem, variis coloribus, ab nigro inde ad puniceum. Si bene ardet, scintillas proiicit cum flamma lucidissima. Solvitur in omnibus acidis; in acido vitrioli aqua diluto solvitur sine negotio et cum fervore, quo facto prodeunt vapores inflammabiles, gaz aut aër inflammabilis. Solutio viridis, colata, in crystallos abiens, *Vitriolum viride* aut *ferri* exhibet. In acido nitri facillime solvitur, calore et fervore insignibus, vaporibus rubris simul prodeuntibus, quae gaz aut aërem nitrosus constituunt. Solutio haec flava in crystallos haud abit, cum aëris humores attrahat, quod pariter accidit, si ad siccitatem usque evaporata fuerit. In acido marino bene solvitur, avolantibus vaporibus inflammabilibus (eodem modo, quo solutio in acido vitrioli agit): solutio haec viridis est. Denique solvitur, licet aegrius, in acidis vegetabilibus: ex omnibus his solutionibus ferrum nigrescens praecipitatur, si pars plantarum adstringens additur. Alcalia fixa pura aut volatile, aqua diluta, manifesto in ferrum agunt, nam, postquam per aliquot dies digestio continuata fuerit, liquores turbidi fiunt, ferri parte, forma Aethiopis, fundum petente. Iungitur facillime cum sulfure, dum funditur, ac cum omnibus metallis ligatur.

**FOENICULUM.** FUNCHO. Radix, herba, semina.  
*Anethum Foeniculum* L.

**Locus.** Habitat in rupestribus Lusitaniae. Floret a Iunio ad Augustum. Biennis.

**Forma.** Radix est fusiformis, tenera, alba, ra-

mosa, dum senescit. Caulis cylindricus, ramosus, orgyalis, undique striatus, viridis, nodosus. Folia e nodis prodeunt, alterna, bi-tripinnata, multifida, foliola filiformia: petioli teretes, striati, basi vaginantes, vagina cylindrica, concava, sulcata, caulem amplexante. Semina subovalia, alata aut marginata, hinc convexa, illinc plana, utrinque striata, coloris obscuri.

Propriet. Odor saporque totius plantae Anisum aemulantur. Radix vero gratius olet magisque dulcescit, dum recens est, quam ceterae partes: sicca debilior est. Folia, nisi fricentur, debilius olent; cum vero digitis tractantur, aromaticum gratumque habent odorem, saporem aromaticum subdulcem. Similis odor est seminum, sed suavior: sapor etiam aromaticus, dulcis, vellicans, gratus: destillata oleum largiuntur essentielle.

## FUMARIA.

## FUMARIA.

## Herba.

*Fumaria officinalis* L.

Locus. Habitat per totam Europam, in hortis, locis cultis, campis et vineis. Floret ab Aprili inde ad Iunium, et ipso autumno. Annua, vulgaris.

Forma. Caules teneri, ramosi, diffusi, glabri, succulenti, subangulati, octo aut decem pollices longi. Folia alterna, petiolata, bipinnata, glabra, mollia, pallide viridia, ambitu triangularia: foliola ovalia, subcuneata, laciniis incis, longiusculis, obtusis.

Propriet. Odor nullus. Sapor amarus, magis etiam, dum siccat.

GALBANUM. GALBANO. Gummi-resina.

*Bubon Galbanum* L.

Locus. Habitat in Africa. Arbusculum. Perenne.

Forma. Gummi-resina, aut potius Resinagumma in lacrimis et frustis siccis, flavis, lucidis, variae molis: aut in massa glutinosa, inter dentes, velut cera, mollita, ad quos arcte adhaeret. Color recentis albidus aut flavus aut luridus, dum vetusta est, lacrimis aut frustulis fragilibus mista. Eligi debet, quae in lacrimis est et gravissime olet, aut, dum haec deficit, ea saltem seligenda, quae a sordibus pura, quae lacrimis abundat et spiritum vini aureo colore imbuunt. Haec, quae solvitur, sumenda, reiecta impura coloris fusci et cereae spissitudinis.

Propriet. Odor fortis, ingratus, gummi ammoniacum referens. Sapor subamarus. Manducatum vix in saliva solvitur. Aquam, in qua teritur, lacteam reddit, sed haud penitus in ea solvitur: neque in vino, neque in spiritu vini, neque postremo in aceto. Ea solutio fieri duntaxat potest, terendo Galbanum in mixtura e duabus partibus spiritus vini unaque aquae. Unde efficitur, inesse duas partes resinae unamque extracti gummosi. Haud solvitur in oleis, olea destillata vix tingit colore flavo. Igne accenditur, ardetque flamma alba, fumo plurimo aromatico.

GALLAE TURCICAE. GALHAS. Nidus insectorum.

*Quercus Cerris* L.

Locus. Habitat in ea arbore aut quercubus aliis Barbariae et totius Europae australis.

Codex medic. Europ. Sect. VI. p. 2.

D



**Forma.** Gallae sunt tubercula subrotunda, variae molis, partim glabra, partim spinulis aspera, plerumque latere forata, extus cinereo-incana aut viridiuscula, aut fusco-nigrescentia. Parenchyma est solidum, fragile, exalbidum aut fuscum, aut nigrescens intus, cum centro vacuo.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor admodum stypticus. Manducatae linguam faucesque valde adstringunt.

**GENTIANA RUBRA.** **GENCIANA.** **Radix.**  
*Gentiana lutea* L.

**Locus.** Habitat in montibus Pyrenaeis, Helvetiae, Germaniae et Lusitaniae. Floret a Maio ad Iulium. **Perennis.**

**Forma.** Radix est cylindrica, ramosa, rugosa, pedalis, digitum aut pollicem crassa, fungosa aut spongiosa, extus obscure fusca, intus lutea.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor amarissimus.

**GLYCYRRHIZA.** **ALÇAÇUZ.** **Radix.**  
*Glycyrrhiza glabra* L.

**Locus.** Habitat in locis arenosis, sabulosis Italiae, Hispaniae, Lusitaniae. Floret Iulio.

**Perennis.**

**Forma.** Radix recens est longa, ramosa, ramis teretibus: extus ferruginea, pennam anserinam, digitum minimum aut pollicem demum crassa, fibris radiculisque munita. Parenchyma carnosum, flavidum, quod, transversim sectum, duos monstrat circulos aut annulos concentricos, punctatos, radiatos, quorum interior magis flavet.



Eliguntur radices siccae digiti minimi aut pollicis mole, sed nunquam teneriores.

Propriet. Odor nullus. Sapor satis dulcis cum levissima amaritudine. Manducata mollior ac mucilaginea videtur.

GRAMEN.

GRAMA.

Radix.

*Triticum repens* L.

Locus. Habitat ubique, praesertim in locis arenosis. Floret Junio. Perennis.

Forma. Radix elongata, teres, tenera, subramosa, glabra, alba: nodosa aut articulata, radiculis capillaribus e nodo quovis prodeuntibus.

Propriet. Odor nullus. Sapor dulciusculus.

GRANATUM. ROMEIRA. Flores, cortex, fructus.

*Punica Granatum* L.

Locus. Habitat in terris siccis Africae, Hispaniae, Lusitaniae. Colitur in hortis. Floret Junio, Julio. Arbor.

Forma. Flores (*Balaustiorum* nomine) plicati sunt, constant petalis multis puniceis, ovalibus, subrotundis, calyci crasso, carnosio, coriaceo innatis, qui in quinque lacinias lanceolatas acutas finditur. Cortex fructus est coriaceus, crassus, subrugosus, intus flavido-viridis, extus ruber aut omnino ruberrimus, dum siccat.

Propriet. Odor nullus. Sapor satis stypticus, praecipue corticis.

**GUAIAACUM.** GUAIACO. Cortex, lignum, gummi.  
*Guaiacum officinale* aut *sanctum* L.

**Locus.** Habitat in insulis Antillis, Jamaica, Hispaniola, Portorico, Mexico, Brasilia. **Arbor.**

**Forma.** Cortex durus, lignosus, lineam circiter crassus, multis stratis compositus, facile separandis, fissuris plenus directione variis, insulas fere varias formantibus squamosas, maculis conspersus rufis subcinereis aut luteis, intus exalbidus aut luteus. Lignum durissimum, satis ponderosum, vel taleis longitudine fissis obscure viridibus, undis obscurius viridibus, maculisque longiusculis, nigris, aut flavidis ad ligni buxei instar, sine undis punctisque; vel taleis transversim sectis, quarum centrum obscurius viride, pallidius alburnum. Gummi, alias resina aut gummi-resina, prostat in offis variae molis, fragilis, semi-pellucida: qua frangitur, lucet, colore gaudet obscure-luteo, subrutillante aut viridiusculo in eodem frusto, composita granis variae molis varique coloris.

**Propriet.** Odor corticis lignique est subaromaticus, si raditur aut calefit. Sapor est subacris, aromaticus et amarus. Quae qualitates magis in cortice percipiuntur. Resinae odor est fragrans, sapor aromaticus, acris, amarus. Solvitur fere penitus in spiritu vini, pauxillum in aqua.

**GUMMI AMMONIACUM.** GOMMA AMMONIACO.

Gummi-resina.

Ignotum genus plantae, quae id exhibet.

**Locus.** Habitat in Aegypto.

**Forma.** Gummi-refina in granis et lacrimis separatis, puris, turis specie, fragilibus, splendentibus, albidis aut flavis. Haec est optima species. Aut venit in massis et frustis maioribus, glutinosa, molliuscula, viridis, sparsa lacrimis aut granis albidis, laevibus, lucidis, amygdalarum more.

Propriet. Odor fragrans, fortis gratior Galbani: sapor subdulcis, amarus, acris, nauseosus. Calore mollitur, frigore durescit, fragileque fit. Manducatum mollitur, dentibus adhaeret, maxime ea, quae in lacrimis venit, denique in saliva solvitur, eamque reddit lacteam. Aqua trita vertitur in liquorem lactei coloris, e quo resina plurima fundum petit, clarescente quod supernatat. Solvitur tritum cum aceto, vino, cerevisia, tingiturque spiritum vini colore rufo in luteum vergente. In oleis haud solvitur, nisi molliatur in destillato aut essentiali, cui luteum impertit colorem. Facile funditur aut liquefcit in vase ferreo igni imposito: flammae admotum accenditur ardetque flamma vivida, alba cum fumo et fuligine.

GUMMI ARABICUM. GOMMA ARABIA. Gummi.  
*Mimosa nilotica* L.

**Locus.** Habitat in Arabia, Aegypto et Senegalia. **Arbustum.**

**Forma.** Gummi in frustis variae molis, iam subrotundis, iam longiusculis, siccis, aliis albis, aliis flavidis, diaphanis, hyalinis, sed extus subrugosis. Eligitur album, vitri specie pellucidum, purum, penitusque in aqua solubile.

**Propriet.** Nullo gaudet odore, nullo sapore. Manducata duritiem aliquam protinus ostendit et frangitur: dein vero mollitur, dentibus adhaeret, ac salivae ope in mucum vertitur. In aqua penitus solvitur, solutione clarissima, insipida, mucilaginea. Nec spiritus vini, nec olea solvunt. Mucilago tamen eius potis est corpora cum aqua miscere, quae alioquin id connubium respuunt, nimirum olea, adipem, balsama, resinas, gummi-resinas, tincturas, ipsumque hydrargyrum. Flammae admotum nec funditur nec ardet: sed turget, panditur, ac in carbonem mutatur, qui ignem servat, denique in cinerem redactus.

**GUMMI GUTTAE.**      **ROM.**      Gummi-resina.  
*Cambogia Gutta L.*

**Locus.** Habitat in Malabaria et Ceylona.

**Arbor.**

**Forma.** Est gummi-resina, in offis aut frustis rotundatis, flavido-rutilantibus, duriusculis, fragilibus: qua frangitur, planis, lucidis et opacis.

**Propriet.** Nullum habet odorem. Sapor succosus, acris. In saliva vix solvitur, quam aureo tingit colore. Dentibus facile frangitur, dum manducari pergitur, dentibus adhaeret, priusquam solvatur. Flammae admotum, ardet vivida flamma scintillante, cum fuligine, relictis cineribus. In aqua iuxta ac alcohole penitus solvitur: tinctura vero est aurea: solutio aquosa pallide flava turbida, quae ut perfrigit, resinam multam deponit. Melius solvitur in lixivio alcali vegetabilis frigido: ea



solutio est saturior, neque aliquid ex ea praecipitatur. Nec solvitur in oleis fixis, nec ullam mutationem cum iis patitur; oleis destillatis impertit colorem rubrum, si cum iis digeritur, quamvis haud penitus solvatur.

## HEDERA TERRESTRIS.

HERA TERRESTRE.

Herba.

*Glechoma hederacea* L.

Locus. Habitat in vallibus Lusitaniae et Europae omnis. Floret ab Aprili inde ad Iunium.

Perennis.

Forma. Caulis est tetragonus, reptans, pubescens, scaber: palmum longus, ramosus, ramis oppositis, cauli similibus. Folia reniformia, crenata, ciliata, rugosa, supra scabra, subtus punctis concavis notata, nervis pubescentibus; petiolis teretiusculis, asperis, stria longitudinali.

Propriet. Odor subfragrans, sed fortior, dum fricantur. Sapor amaricans, aromaticus, acris.

## HELLEBORUS NIGER,

HELLEBORO NEGRO.

Radix.

*Helleborus niger* L.

Locus. Habitat in alpibus et montibus circa Nicaeam, in locis rupestribus Lusitaniae. Floret a Martio ad Maium.

Perennis.

Forma. Radix est teres aut bulbosa, crassa, e qua prodeunt rami brevissimi, articulati: ex his vero radiculae plurimae, longiusculae, carnosae, teretes, quae siccatae rugosae sunt, teneriores, fragiles, extus nigrae, intus albae.



Propriet. Odor est foetidus. Sapor acris, nauseosus, subamarus, persistens: eae qualitates minus in radice sicca observantur.

## HORDEUM.

CEVADA.

Semina.

*Hordeum vulgare et distichon* L.

Locus. Colitur in Lusitania. Annum, vulgare.

Forma. Semina sunt ovali - oblonga, media parte crassiora, utrinque attenuata, glabra, pallida, latere convexo - sulcata, subangulata, aristae vestigio in apice. Parenchyma album, farinosum.

Propriet. Odor nullus. Sapor farinosus, mucilagineus.

## HYOSCYAMUS.

MEIMENDRO.

Folia.

*Hyoscyamus niger* L.

Locus. Habitat ad margines viarum, in terris incultis, ruderatis et in muris vetustis per totam Europam. Floret aestate. Biennis.

Forma. Folia sunt alterna, sessilia, amplexicaulia, ovato-lanceolata, mollia, villosa, pallide viridia, sinuato-laciniata. Caulis est erectus, teres, bipedalis, lanuginosus, viscidus, superne ramosus, ramis alternis erectis.

Propriet. Odor est foetidus, sapor mucilagineus, acris. Folia sicca prunis imposita scintillas proiciunt, crepitant, detonant nitri more, fumo simul, velut tabaci, edito.

HYSSOPUS.      HYSOPO.      Folia et summitates.  
*Hyssopus officinalis* L.

Locus. Habitat in terris montosis Europae. Colitur in Lusitania. Floret Iulio et Augusto.

Frutex; perennis.

Forma. Caulis est erectus, pedalis, ramosus, nodosus, tetragonus, scaber, mollissime pubescens. Rami alternatim oppositi, superne canaliculati. Folia lanceolata, angusta, obtusa, integerrima, pollicaria, viridia, interdum subaspera, nonnunquam glaberrima, subciliata, punctata.

Propriet. Odor fragrans, aromaticus, fortis. Sapor aromaticus, amaricans, camforam aemulans. Manducata herba recens stimulat ac calefacit linguam et fauces, camforae ad instar, sed blandius.

JALAPPA.      JALAPPA.      Radix.  
*Convolvulus Jalappa* L. *Conv. Lavradio* Elem.  
bot. *Mirabilis dichotoma* L.

Locus. Habitat in Mexico et Brasilia. Perennis.

Forma. Radix sicca orbiculis advehitur longiusculis, solidis et ponderosis, aut tuberibus integris scissisve ad longitudinem, extus rugulosis, fuscis aut nigrescentibus, intus cinereis, venosis, annulis concentricis nigricantibus, centro nigro-punctato. Eligenda est, quae taleis grossis, aut tuberibus pyriformibus ponderosis constat, quae venis et annulis insigniuntur, fractu difficilibus, pistu facilibus, coloris cinerei, saporis acris.

Propriet. Nullus odor. Sapor acris, nauseosus. Manducata vellicat et irritat fauces. Igni admotum frustum, accenditur et funditur resina, mox extinguitur fumo.

IPECACUANHA. IPECACUANHA. Radix.  
*Psychotria emetica* L.

Locus. Habitat in Mexico et Brasilia. Perennis.

Forma. Radix est cylindrica, pennae anserinae mole, cinerea, varie torta, annulata, annulis approximatis. Parenchyma fragile, fuscum; filum centrale ligneum, a quo facile cortex secedit.

Propriet. Odor subnauseosus. Sapor acriusculus, amarus, minus fili centralis, quod insipidum est. Pista in mortario excitat pulverem subtilissimum, qui nares irritat sternutationemque producit.

IPECACUANHA ALBA. IPECACUANHA BRANCA.  
Radix.

*Viola Ipecacuanha* L.

Locus. Habitat in Brasilia. Perennis.

Forma. Radix est cylindrica, sensim versus finem attenuata, sulcis transversalibus semicircularibus, vario modo torta, exalbido-cinerea. Parenchyma durum, fragile, filo centrali ligneo, flavicante, quod transversim sectum ostendit fibras stellatas aut radios.

Propriet. Odor habet aliquid aromatici, nauseosi. Sapor subaromaticus, nauseosus, acris, haud ingratus.

## IUNIPERUS.

ZIMBRO.

Fructus.

*Iuniperus communis* L.

Locus. Habitat in locis incultis, siccis, arenosis, rupestribus Lusitaniae reliquaeque Europae. Floret Aprili et Maio.      Arbustum vulgare.

Forma. Fructus est bacca subglobosa, parva, principio viridis, ut maturescit, coeruleo-nigricans, scatens liquore oleoso viscido rubro, continens semina tria aut quatuor triangularia.

Propriet. Odor est aromaticus. Sapor acris, aromaticus, balsamicus, subdulcis.

## KINO.

KINO.

Gummi-resina.

Ignotum genus plantae, quae id producit.

Locus. Habitat in Africa ad ripas fluminis Gambiae.

Forma. Kino est gummi-resina, quae frustis variae molis venit, dura, fragilis, opaca, sublucida, fusca; qua frangitur, splendens.

Propriet. Odor nullus. Sapor satis stypticus, dulcedine quadam novissime accedente. Manducata protinus adstringit, dentibus dein adhaeret, saliva solvitur eamque rubro colore tingit. Igni admota aegre accenditur, haud funditur, sed comburitur cinere relicto. Solvitur tum aqua, tum spiritu vini, iisque rubrum colorem impertit: mixtae solutiones cum vitriolo viridi, fiunt nigrae.

## LACCA.

LACCA.

Resina.

*Croton lacciferum* L.

Locus. Habitat in Ceylona et India.      Arbor.

Forma. Resina plus minusve rubra, dura, fra-

gilis, subdiaphana, plena nodis aut colliculis, multisque foraminibus, quae in parvulas caveas mediae resinae abeunt: haec, dum adhaeret ramusculis, in quibus gignitur, vocatur *Lacca formicarum* aut *in ramis*, optima existimata. Soluta his ramusculis ac oblata in offis variae molis, variaeque formae, quae interdum minus sunt coloratae, vocatur *Lacca in granis*, sine dubio eadem ac prior, nisi quod color iam sit amissus. Dum denique in laminis exhibetur, vocatur *Lacca in laminis*, quae in indicem medicaminum haud recipienda est, quod arte paratur, colore exuto.

Propriet. Nullus odor, nullusque sapor. Manducata dentibus frangitur, sed non mollitur, tingit tamen salivam carneo colore. Flammae admota mollitur, fluit et ardet flamma splendida sine fumo, odore grato: sed protinus ut removetur, durescit illico et magis fragilis fit. In aqua haud solvitur: fervida ipsi adimit colorem puniceum. Nec in fixis oleis nec in destillatis solvitur, vix ea tingens colore flavido. Solvitur in spiritu vini, licet aegrius, ipsique impertit saporem amarum et stypticum: tinctura est rubra. Solvitur fere penitus in oleo tartari per deliquium et in spiritu salis ammoniaci vinoso. *Bucholz.* Haud etiamnum patet, succus sit Lacca ex arbore stillans, aëre coagulatus, aut colligatur insectis, quorum reliquiae in cavitatibus reperiuntur, quaeque forte massam eam ad ramusculos affigunt.



## LADANUM.

## LADANO.

## Resina.

*Cistus creticus* L.

**Locus.** Habitat in Candiae, aliarumque Archipelagi insularum montibus. **Arbustum.**

**Forma.** Resina nigrescens, emplastri duritie, frustis magnis, quae in vesicis apportantur; aut solida, dura, sicca, opaca, fusca aut nigrescens, frustis teretibus aut taleis tortis, quae fracta lucique expositae superficiem monstrant punctis splendentibus refertam.

**Propriet.** Odor subaromaticus, gratus: sapor subamarus, balsamicus. Manducata haec resina in saliva haud solvitur. Flammae admota accenditur, ardetque flamma clara, fumoque suavi. Leni igni apposita, mollescit: aucto funditur, emissio grato odore. Solvitur in spiritu vini rectificato, tanto plus, quanto purior est. Haud solvitur in aqua, cui tamen impertit fragrantiam suavem, maxime cum ea destillata. In nullo oleo solvitur, quamquam ea tingat colore rubro-fusco. Consuecunt admiscere arenam plurimam subtilem, ut pondus augeatur.

## LAPIS CALAMINARIS.

## PEDRA CALAMINAR.

Minera zinci calcinati.

*Zincum Calaminaris* L.

**Locus.** Habitat in Anglia, Silesia, Pannonia, Polonia.

**Forma.** Lapis calaminaris specie terrae seu ochrae magis minusve compactae, subinde solidae et lapidis ad instar durae provenit, interdum mollis

et fragilis terrae more, nonnunquam discedentis in grana, velut arena, saepe in laminis. Plerumque tuberculis et cavitatibus plena, colore cinereo, flavo aut fusco: sparsis nonnunquam particulis lucidis et splendentibus, sed nunquam metallorum more.

**Propriet.** Neque odore, neque sapore insignitur. Acie chalybis pulsata, licet dura sit, haud scintillas edit. Ad ignem flavescit. Caloris admiculo solvitur in acido vitrioli, et fervore in acido nitroso: solutiones evaporatae exhibent crystallos vitrioli zinci et nitri zinci. Tubuli fusorii ope haud funditur, si ferrum habet admixtum: tunc magnetē attrahitur, coloreque gaudet magis fusco. Viridem adipiscitur colorem, dum cum sale microcosmico, viridi-flavum, dum cum borace igni exponitur. Si haec fusa corpora magna copia in solutione adsunt, opaca redduntur, formati zinci floribus albis, qui flavescunt et ardent flamma viridi-coerulea. Ex analysi accurata, quam Bergmannus instituit, colligitur, lapidem calaminarem verum esse calcem zinci puram, mixtam parca calcis ferreae copia, magnaue argillae et terrae siliaceae quantitate.

**LAURUS.**

**LOUREIRO.**

Folia, baccae.

*Laurus nobilis* L.

**Locus.** Habitat in Lusitania, Hispania, Graecia et Oriente. Floret Martio et Aprili. **Arbor.**

**Forma.** Folia alterna, petiolata, lanceolata, plus minusve undulata, dura, coriacea, nervosa,

viridia, utrinque glabra, unum duosve pollices longa, tres vel quinque longa. Baccae cum olivarum fructibus comparandae, ovales, coerulescentes aut nigrae sunt, dum maturae, sublucidae, uno dumtaxat loculo, in quo nucleus bipartibilis residet, qui solidus est, dum siccescit.

Propriet. Odor est aromaticus: sapor acris, aromaticus, subamarus.

LAVANDULA. ALFAZEMA. Calyces et flores.

*Lavandula Spica* L.

Locus. Habitat in locis sabulosis Italiae, Galliae et Hispaniae, colitur in hortis Lusitaniae. Floret Junio et Julio. Fruticulus.

Forma. Flores sunt caefii, bilabiati, calycibus cincti tubulosis, striatis, pubescentibus, apice coerulescentibus, incisfis, quadrifidis.

Propriet. Odor fragrans, fortis, suavis. Sapor aromaticus, subamarus, odoris aemulus. Manducata os parum calefacit.

LICHEN ISLANDICUS. MUSGO ISLANDICO. Herba.

*Lichen islandicus* L.

Locus. Habitat in terra sterili, sicca, rupestri Europae, maxime in Islandia, in borealibus regionibus, nec minus in australibus, nimirum Italia, Gallia meridionali, Helvetia, Germania.

Forma. Est lichen foliaceus, coriaceus, glaber, cinereus, olivaceus: foliola supra convexa, subtus concava, subinde maculis sparsa, quae in colliculos farinosos mutantur, foveolis plena, in

lacinias lineares obtusas margine sinuosas ciliatas fissa.

Propriet. Odor nullus. Sapor subamarus.

LINUM.

LINHACA.

Semina.

*Linum usitatissimum* L.

Locus. Habitat in campis Europae australis, colitur in Lusitania et per omnem terrarum orbem. Floret Maio et Iunio.

Annum.

Forma. Semina sunt ovata, acuta, plana, lucida, paullo ultra lineam longa, olivacea, lurida, intus alba.

Propriet. Odore carent: sapor insipidus, mucilagineus. Semina integra cum aqua fervida dant mucilaginem satis limpidam, quod haud accidit aqua frigida.

MAIORANA.

MANGERONA.

Herba

*Origanum Maiorana* L.

Locus. Colitur in hortis, patria haud cognita. Floret a Maio ad Augustum.

Annua

Forma. Caules recti, quadrangulares, nodosi pubescentes, statim a basi ramosi, ramis alternatim oppositis, solitariis, caules aequantibus. Folia sunt opposita, e nodis caulium nascuntur, subsucculenta, ovalia, obtusa, petiolata, vix pubescentia, striata, margine subundulata.

Propriet. Odor fragrans, fortis, gratus. Sapor aromaticus, subamarus, acris.



## MALUS LIMONIA ACIDA.

LIMÃO AZEDO.

Cortex, succusque fructus.

*Citrus Medica* β.

Locus. Habitat in India orientali. Colitur in Hispania, Lusitania et Brasilia. Floret a Martio ad Iunium. Arbor.

Forma. Fructus est bacca ovalis, utrinque attenuata, lutea.

Propriet. Odor corticis est fragrans, aromaticus, gratus. Sapor aromaticus, vix amarus: succi admodum acidus.

## MALVA VULGARIS.

MALVA.

Folia.

*Malva sylvestris et rotundifolia* L.

Locus. Habitat in locis incultis, ad margines viarum etc. in Lusitania. Floret Maio, Iunio et Iulio. Annua.

Forma. Folia prioris speciei sunt alterna, petiolis elongatis, subrotunda, basi truncata: inferiora septem - superiora quinqueloba, lobis obtusis, serratis; viridia, pubescentia, tres pollices lata. Folia alterius speciei sunt minora, orbicularia, cordata, subquinqueloba, crenata, pallide viridia.

Propriet. Nullus odor, neque sapor: sed satis mucosa est planta.

## MANNA. MANNA. Succus congelatus dulcis.

*Fraxinus Ornus et excelsior* L.

Locus. Habitat in Europa australi, maxime in Calabria et Sicilia. Arbor.

Forma. Manna est succus concretus melleus, referens mel crystallos formans, exalbido-flavi-



cans, quem videmus vel in tubulis et frustis elongatis, molliusculis, fragilibus, quaeque franguntur in granula albidiora; aut in offis variae formae, secum invicem conglutinis, mollibus, viscidis, teneris. Prima forma appellatur *Manna in lacrimis*, optima censetur: altera est *Manna vulgaris*. Praeter has, venum it quoque alia varietas satis mellea, viscida et humida, *Manna calabrina* dicta, quae, etiam si magis purget, est reicienda.

**Propriet.** Nullus odor. Sapor dulcis melleus. Manducata videtur farinosa protinus, dein in saliva solvitur, quò factò sapore insignior est. In aqua bene solvitur, citius in fervida, cuius pondus aequale sufficit. Sed postquam refrixit solutio, crystallorum forma fundum Manna petit. Solvitur quoque in spiritu vini rectificato, ope caloris, sed minime in oleis fixis aut expressis. Flammae admota funditur, spumat, panditur et ardet flamma coerulea, multas scintillas flavas proiciens.

**MARRUBIUM.**

**MARROIOS.**

**Folia.**

*Marrubium vulgare* L.

**Locus.** Habitat ad margines viarum, in locis incultis Lusitaniae. Floret a Maio ad Iulium.

**Perennis.**

**Forma.** Folia sunt ovalia, sed saepe ovata, aut subrotunda, rugosa, utrinque villosa, inaequaliter crenata, incana, pollicaria, petiolis striatis. Caulis erecti, tetragoni, albido tomento obducti, ramosi. Rami oppositi similes caulibus.

Propriet. Odor fragrans, gratus, praecipue  
folia fricantur. Sapor amarus, subacris, per-  
sistens.

MASTIX. ALMECEGA DA INDIA. Resina.  
*Distacia Lentiscus* L.

Locus. Habitat in Chio. Arbor.

Forma. Resina solida in granis aut lacrimis  
ovatis, variae molis, albis, pallidis seu flavicanti-  
bus, pellucidis, superficie saepe opaca, fragilibus:  
qua frangitur, lucet ad vitri instar. Eligenda,  
quae pura est, pellucida, in lacrimis grandibus,  
quaeque dentibus adhaeret, ut cera, quae sicca est  
et facile dentibus mollietur.

Propriet. Odor aromaticus singularis. Man-  
ducata dentibus, in massam coit subrigidam, al-  
bam, cerae albae aemulam, sed quae saliva haud  
solvitur. In aqua haud solvitur, nisi quod imper-  
iat odorem: in spiritu vini maximam partem solvi-  
tur, decima fere parte superstita in vasis fundo.

MATRICARIA. MATRICARIA. Herba florens.  
*Matricaria Parthenium* L.

Locus. Habitat in locis incultis, rupestribus  
Europae, culta in hortis Lusitaniae. Floret per  
totam aestatem. Perennis.

Forma. Caules sunt recti, teretes, striati, gla-  
bri, subramosi, bipedales. Folia alterna, petiola-  
ta, ampla, pinnata, foliolis pinnatifidis, laciniis  
ovatis, oblongis serratis, colore pallide viridi.  
Flores nascuntur e fastigiis caulium ramorumque,  
pedunculati sunt, corymbosi. Discus continet

flosculos hermaphroditos, flavos, tubulosos; radius flosculos femineos albos, lingulatos, oblongos, tridentatos, glabros, supra sulcatos, subtus rugulosos. Omnes comprehenduntur calyce communi hemisphaerico, sulcato, squamis imbricato, margine scariosis, lacero-ciliatis.

Propriet. Odor est fragrans, Chamomillae similis, sed fortior. Sapor subamarus, aromaticus.

MEL.

MEL.

Locus. Habitat in nectariis florum, unde sugitur ab apibus, quae dein in favis depositum servant ad nutrimentum.

Forma. Mel est verum plantarum saccharum, solutum in mucilagine earum, in forma liquida, saepe granis coactum, nonnunquam, praesertim in Brasilia, liquidum olei ad instar, colore albido aut flavo. Eligendum est album, dulce, sine alius saporis vestigio.

Propriet. Sapor est dulcis, aromaticus, sed varius tamen pro diversa plantarum natura, e quibus apes id sugunt: namque interdum et cum amaritudine dulcedo mixta est. Cetero cum saccharo congruit. Odor est peculiaris, simul tamen plantarum aliquid referens, e quibus apes mel collegerunt.

MELILOTUS.

MELIOTO.

Herba florens.

*Trifolium Melilotus officinalis* L.

Locus. Habitat inter segetes et in locis cultis per omnem Europam: colitur quoque in hortis Lusitaniae. Floret per totam aestatem. Annua, biennis.

**Forma.** Caules sunt teretes, glabri, virides, bipedales, ramosi; ramis alternis, angulatis, striatis, glabris. Folia alterna, petiolata, ternata: foliola oblonga, pollicaria, apice truncata, serrata, trinque glabra, supra obscurius, subtus pallidius iridia; lateralalia subfessilia, medium maximum, petiolatum. Flores spicati, lutei: corolla papilionacea, cuius carina brevior est alis: calyx tubulosus, quinquefidus.

**Propriet.** Odor est fragrans, suavis, in planta sicca fortior quam in recenti. Sapor subamarcans.

**MELISSA CITRINA. HERVA CIDREIRA. Herba.**

*Melissa officinalis* L.

**Locus.** Habitat in montibus Europae australis et locis humidis Lusitaniae. Colitur in hortis. Floret a Iunio ad Augustum. Perennis.

**Forma.** Caulis est quadrangulus, articulatus, ramorum pubescens, inferne ramosus, ramis oppositis, alternis, denuo ramosis. Folia alternatim opposita, petiolata, cordata, obtusa, serrata, rugosa, supra viridia, subpubescentia, colliculis plena, subtus pallidiora, foveolis plena, quae cum colliculis paginae superioris congruunt.

**Propriet.** Odor fragrans, corticem citri redolens. Sapor subacris, aromaticus.

**MENTHA OFFICINARUM. HORTELÃ VULGAR.**

Folia.

*Mentha crispata* L.

**Locus.** Habitat in Sibiria. Colitur in hortis.



Lusitaniae, et sine cultura provenit in novalibus. Floret a Iulio ad Septembrem.

Forma. Folia sunt ovali-subrotunda, cordata, pollicaria, subtus pubescentia, supra rugosa, margine dentato. Opposita prodeunt e caulibus rectis, tetragonis, nodosis, ramosis, petiolis brevibus.

Propriet. Odor foliorum tum recentium tum siccorum fragrans, fortis. Sapor aromaticus, calefaciens linguam faucesque.

MENTHA PIPERITA.

HORTELĀ APIMENTADA.  
Folia.

*Mentha piperita* L.

Locus. Habitat in locis humidis Angliae. Colitur in hortis Lusitaniae. Floret a Iulio ad Septembrem.

Forma. Folia sunt ovata, acuta, serrata, ciliata, utrinque pubescentia, inferiora tamen magis villosa et foveolis plena. Longitudo est duorum pollicum, opposita sunt, petiolis brevibus.

Propriet. Odor fragrans, subcamforaceus sapor similis. Manducata vellicant et calefaciunt linguam faucesque, superstitite demum sensu frigoris.

MERCURIUS VIVUS.

AZOGUE.

Metallum

*Hydrargyrum vivum* L.

Locus. Habitat in Germania, Gallia, Hispania, Lusitania et Brasilia. Invenitur in terrae penetralibus quinque formis differentibus: nimirum  
1. *virginea*, effuso quippe inter rupes et mineras  
2. *calcis* forma, per se praecipitati; 3. *salina*



iuncti vel acido vitrioli vel marino; 4. *amalgamatis* cum aliis metallis; 5. sulfuris ope in mineram redacti, unde existit *Cinnabaris*.

**Forma.** Metallum fluidum, sed haud humectans, coloris argentei, splendens.

**Propriet.** Odor nullus, nisi digitis fricetur, tunc enim odorem spirat peculiarem: sapor nullus. Pondere praestat omnia metalla, exceptis auro platinaque: pes cubicus aequat 949 libras: gravitas specifica est 135,681. *Briffon*. Facillime dividitur in globulos, quorum superficies semper est convexa. Nunquam aëre mutatur, neque aqua, sed panditur contrahiturque, calore aëris vel tantillum mutato. Diu tritum, vertitur in pulverem cinereum, *Aethiopis per se* nomine, qui protinus ut calefit, iterum statum recuperat metallicum. Tubuli ope fusorii vertitur in vapores albos, qui ipsum sunt hydrargyrum, admodum divisum, citra ullam mutationem. Igni impositus fervet, liquoris more, diu priusquam incendatur, fumum album spargens, qui et ipsum hydrargyrum constituit, sine ulla mutatione. Candefactus per longum tempus, absque aëris contactu, calcinatus abit in calcem ruberrimam, squamosam, splendentem, dictam *Mercurius praecipitatus per se*. Facillime solvitur in acido nitroso, aegrius in acido vitrioli, nisi id ferveat: haud solvitur in acido marino, nisi prius phlogisto privetur ac reducatur in calcem. Iungitur bene tritum aut fustum cum sulfure, unde nascitur *Aethiops mineralis* et sublimatione *Cinnabaris*. Penetrat et solvit, ope triturationis et su-

sionis, fere omnia metalla, quod connubium *amalgamatis* nomine venit.

MEZEREUM. MEZEREAO. Cortex radice.  
*Daphne Mezereum* L.

Locus. Habitat in Europa australi et in collibus Lusitaniae. Floret Martio et Aprili. Frutex.

Forma. Cortex radice siccae venit in frustis longiusculis mollibus, textu fibrarum tenerrimarum, adeo fortium, ut difficulter frangantur, extus obductus tunica glabra, colore rufescente.

Propriet. Cortex radice siccae nullo odore praeditus est. Saporem fere nullum habet, sed diu in ore servatus, est acris, ardens, diuque in faucibus haeret. Dum recens est, acerrimus esse et fauces fere inflammare consuecit.

MILLEFOLIUM. MILLEFOLIO. Folia et flores.  
*Achillea Millefolium* L.

Locus. Habitat in campis et pratis Europae. Floret a Maio ad Iulium. Perennis.

Forma. Folia sunt sessilia, elongata, amplexicaulia, alterna, bipinnata, opposita, foliolis lanceolatis, dentatis, supra pubescentia, subtus subtoementosa. Flores compositi radiati, albi. Flosculi disci hermaphroditi, tubulosi: radii feminei, lingulati. Calyx communis ovatus, pubescens, imbricatus, squamis ovalibus, concavis, ciliatis.

Propriet. Odor aromaticus, praecipue dum fricantur. Sapor amaricans, aromaticus et acris, perinde in sicca ac in recenti planta: evidentius haec in floribus animadvertuntur.

## MORUS.

## AMORA.

## Fructus.

*Morus nigra* L.

Locus. Habitat in locis maritimis Italiae et Persiae. Colitur in Lusitania. Arbor.

Formae. Fructus est bacca ovalis, obtusa, sanguineo-nigricans, succulenta, lucida, composita plurimis aliis baccis exiguis imbricatis, in receptaculo carnoso, cylindrico.

Propriet. Sapor dulcis, vinosus. Manducati extrahitur succus, residuis in ore pelliculis, receptaculo et seminibus, tingit salivam rubro colore.

## MOSCHUS.

## ALMISCAR.

*Moschus moschiferus* L.

Locus. Invenitur circa umbilicum animalis, in Tataria, Sibiria et China.

Forma. Substantia adiposa, mollis, subliquida, dum recens est. Ut siccescit, grana constituit ferruginea aut nigricantia, aliis nigris et duris mixta, nulla peregrina re accedente. Cingitur vesica pelliculis subrotunda, pilis hirsuta, ovi columbini mole, adeo turgida, ut nunquam aperta fuisse videatur. Optimus est, qui in vesica sua nativa servatur, tenera, pelle alba: aut si seorsim moschus extat, debet esse ferrugineus, amarus, odore fortissimo, si copia quaedam adest; suavissimus, si pauxillum aut cum aliis rebus miscetur.

Propriet. Odor peculiaris, fortis, persistens. Sapor amarus, nauseosus, acriusculus. In ferrum candens iniectus, ardet fumisque penitus avolat, superstitie paucissimo cinere. Solvitur partim aqua,

partim spiritu vini. Iuxta analysin meliorem, continet resinam muco nuptam, extractum amarum et salem quemdam. Rarissime purus obtinetur.

MYRRHA. MYRRHA. Gummi-resina.

Ignotum plantae genus, quae producat.

Locus. Habitat in Arabia ac Abyssinia.

Forma. Myrrha est gummi-resina solida, in frustis variae molis et figurae, subinde nuces excellentibus, coloris obscure rubri, subpellucidis, fragilibus: qua franguntur, sublucidis, maculis aut striis semicircularibus, unguiformibus.

Propriet. Odor est fragrans: sapor amarissimus; acris, subaromaticus. Manducata sensim dentibus adhaeret: maxima pars in saliva solvitur eamque lacteo colore imbuat. Flammae admota, vivide ardet, sed aegre, fumans et scintillans, superfluite carbone cinereo. Digesta in aqua fervida, solvitur penitus, sed protinus ut refrigerat, pars resinosa fundum petit. Solvitur pariter in spiritu vini, tinctura flavido-rubicunda. Nec in oleis fixis solvitur nec in volatilibus.

MYRTUS. MURTA. Folia, bacca.

*Myrtus communis* L.

Locus. Habitat in Europa australi, in nemoribus Lusitaniae, colitur in hortis. Floret a Maio ad Julium.

Forma. Folia sunt ovato-lanceolata, petiolata, acuta, utrinque glabra, subrugosa. Baccae sunt ovaes, ervorum mole, rugulosae, nigrescentes, umbilicatae.



**Propriet.** Odor foliorum siccorum debilis. Sapor aromaticus, gratus: recentium stypticus et amarus. Odor recentium gratus et fragrans. Odor baccarum etiam fragrans, sapor aromaticus, leviter stypticus, dulcis.

# NASTURTIUM AQUATICUM.

AGRIÖES.

Herba recens.

*Sisymbrium Nasturtium* L.

**Locus.** Habitat in fontibus et rivulis Europae, Americae septentrionalis et Lusitaniae. Florét Maio et Iunio. Perennis.

**Forma.** Caules fistulosi, sulcati, succulenti, folia impari-pinnata: foliola subrotunda subcordata.

**Propriet.** Sapor vellicans, subamarus; odor peculiaris, sapor analogus.

# NICOTIANA.

HERVA SANTA.

Folia.

*Nicotiana Tabacum* L.

**Locus.** Habitat in America australi, ubi perennat: colitur et ibidem et in America boreali, et in insulis vicinis, in multis Asiae regionibus, Europaeque et in Lusitania. Floret a Iunio ad Augustum. Annua.

**Forma.** Folia ampla, pedalia et ultra, ovato-lanceolata, acuta, glabra, supra viridi-obscura, subtus pallidiora; nervis costisque exalbido-viridiusculis, pubescentia et viscida. Inferiora subdecurrentia, superiora sessilia, nec decurrentia.

**Propriet.** Odor foetidus, nauseosus: Sapor acris, subamarus. Manducata folia recentia muc



aliquid habere videntur, linguam faucesque parumper vellicant, quam ob causam salivae plurimum in ore confluit. Digitis fricta exsudent substantiam fuscam, glutinosam. Folia sicca flammae admota ardent, prunis iniecta scintillant et detonant nitri ad instar.

**NITRUM.**      **NITRO.**      Sal neuter perfectus.  
*Kali nitratum* s. *Alkali vegetabile nitratum*  
 Bergmann sciagraph.

**Locus.** Invenitur nativum mixtum cum terra argillacea in India orientali, China, Hispania et Brasilia: in cavitatibus rupium Sibiriae: in superficie frustorum cretae ad Rocheguyon, nonnunquam in muris limosis.

**Forma.** Nitrum est sal neuter perfectus, ex acido nitrico et alcali fixo vegetabili compositus, crystallis aut prismatibus elongatis hexaëdris, longitudinaliter sulcatis et in pyramides abeuntibus aut transversim sectis, colore albo, diaphano.

**Propriet.** Nullum habet odorem, saporem salsum, refrigerantem. Aëri expositum haud mutatur. Funditur ad ignem, priusquam accendatur, diu hanc formam servans acidum exhalat nitri, superstita in vasis fundo alcali fixo vegetabili. Prunis impositum aut ferro candenti flamma alba clara, scintillisque et sirepitu deflagrat. In aqua frigida sine negotio, facilius etiamnum in fervida solvitur. Illius tres partes solvunt unam nitri, huius dupla portio sufficit.

**NUX MOSCHATA.**    **NOZ MOSCHADA.**    **Nucleus.**

*Myristica aromatica* Swartz.

*Myristica moschata* Thunb.

**Locus.** Habitat in Moluccis et Brasilia.    **Arbor.**

**Forma.** Nux moschata est nucleus fusco-cine-  
reus, subrotundus, pruni minoris mole, utrinque  
obtusius, longitudinaliter sulcatus, transversim re-  
ticulatus. Parenchyma, dum recens est, carneum  
est adeoque oleosum, ut acu punctum oleum emit-  
tat. Siccum subdurem est facileque cultro scindi-  
tur, intus flavum est, venis fuscis. Nucleus cingi-  
tur cortice duro, fragili, dimidiam lineam crasso,  
ecto iterum pellicula (arillo) pulposa, oleosa, gla-  
bra, dum recens est, sanguinea; dum siccescit,  
aurantiaca, vocata *Macis*, seu *flos nucis mo-*  
*schatae*.

**Propriet.** Odor nucis est fragrans, gratus:  
*Macis* fortior. Sapor est aromaticus, unctuosus,  
acris, saponi congruus; *Macis* magis aromaticus,  
subamarus.

**OLEUM COMMUNE.**

**OLEO COMMUM** s. **AZEITE.**

Oleum fixum vegetabile.

*Olea europaea* L.

**Locus.** Habitat in Europa australi: colitur in  
Lusitania. Floret Maio.    **Arbor.**

**Forma.** Oleum commune est oleum fixum, ex  
olivis expressum, liquidum, pellucidum, pallidum  
aut flavicans.

**Propriet.** Bonum oleum odore caret et saponi-  
e. Congelascit decem gradibus sub puncto con-

gelationis scalae Reaumurianae. Praeterea gaudet omnibus qualitatibus oleorum fixorum vegetabilium.

**OPIUM.** **OPIO.** Extractum gummoso-resinosum.

**Forma.** Opium est extractum guminoso-resinosum, e Papavere somnifero extractum. Advehitur vel lacrimis pallide-flavidis, qua forma rarissimum est maximique pretii; vel frustis subrotundis, planiusculis, ponderosis, extus rufo-nigricantibus, subnitidis, quae foliis siccis obteguntur: intus fractum viridescit aut nigrescit, id quod opium appellatur aut meconium thebaicum. Prius, quod optimum est carique pretii, rarissime obvium est. E posteriori eligendum est uniforme, glabrum, quod digitis contrectatum in massas coëat iisque adhaereat, intus purum sit, sapore satis amaro, acri, quod calefactum nequaquam oleat, flammae admotum ardeat, quod in aqua fere omnino solvatur, solutione rubicunda.

**Propriet.** Odor est foetidus, fortis, ingratus, virosus. Sapor protinus nauseosus, amarus, dein acris. Flammae admotum vivida luce ardet. Digestum et maceratum in aqua, aceto vini, succo limoniorum, vino, spiritu vini solvitur: semper tamen aliquid haud soluti in fundo vasis superest.

**OPOPANAX.** **OPOPANACO.** Gummi-resina.

*Pastinaca Opopanax* L.

**Locus.** Habitat in Italia, Sicilia, Alexandria et Aegypto. Perennis.

**Forma.** Opopanax est gummi-resina solida, fragilis, in lacrimis subrotundis, aut frustis variae formae et molis, flavido-rubicundis extus aut aureis, maculis albis aut pallidis, vel intus subfuscis, albo-maculatis.

**Propriet.** Odor fragrans, subingratus: sapor acris, amarus. Manducata substantia in frusta dentibus vertitur, dein in saliva soluta eam lacteo tingit colore. Flammae admota accenditur, fumumque emittit similem ii, quem gummi ammoniacum pirat. Cum aqua trita pars solvitur, eamque lacteam reddit: sed resinosa pars secedit, dum subidere sinimus. Haec spiritu vini solvitur. Opopanax nec in oleis fixis, nec in destillatis aut essentialibus solvitur, vix ea tingens colore viridilavido.

**ORIGANUM VULGARE.**      **OUREGÃO.**      **Herba.**

*Origanum vulgare* L.

**Locus.** Habitat in montibus Europae, Canadae, Virginiae. Floret Iulio et Augusto. Perennis.

**Forma.** Caulis est quadratus, ruber, pubescens, ramosus, ramis oppositis, tenerioribus caule, altioribus longioribus. Folia nascuntur e nodis caulis, opposita sunt, ovata, petiolata, dimidium pollicem longa, supra glabra, subtus pubescentia, utrinque punctata, margineque ciliata. Flores sunt dispositi in spicis subrotundis, hae vero in paniculis approximatis, bracteis ovatis acutiusculis, uneatis, calycem aequantibus.



**Propriet.** Odor fragrans, fortis, gratus. Sapor acris, aromaticus.

**OVUM.** Ovo. Ovum gallinaceum.

**PAPAVER ALBUM. DORMIDEIRAS.** Capita. Opium.  
*Papaver somniferum* L.

**Locus.** In locis rupestribus Europae australis et campis Asiae fervidioris, quae vera ipsius patria esse videtur. Colitur in Lusitania. Floret Iunio et Iulio. Annua.

**Forma.** Capita aut fructus sunt capsulae globosae, glabrae, operculo radiato coronatae, sub quo decem foramina in circulum disposita sunt, quae in cavitatem conducunt, ope laminularum in decem loculos partitam, plenos seminibus innumeris, satis exiguis, subglobosis, albissimis, aut nigrescentibus seu coerulescentibus. Capita recentia incisa stillant opium. Videatur ea vox.

**Propriet.** Odor foetidus, maxime cum viridia sunt et fricantur. Sapor subamarus, acris. Succum largiuntur lacteum amarum, nauseosum.

**PAREIRA BRAVA. ABUTUA. Radix.**  
*Cissampelos Pareira* L.

**Locus.** Habitat in Brasilia et Africa. Perennis.

**Forma.** Radix sicca est grandis, plus minusve crassa, cylindrica, subtorta, rugosa, nigricans aut cinerea extus, parenchymate lignoso, flavo. Ad axim secta, fibris constat longitudinalibus, planis, crassiusculis, parallelis, approximatis: transversim secta, formata esse videtur circulis seu annulis



concentricis, remotiusculis, quae fibras radiatas habent.

Propriet. Odor nullus. Sapor amarus, subdulcis. Manducata salivam flavo colore tingit.

### PASSULAE MAIORES ET MINORES.

UVAS PASSADAS.

Fructus sicci.

*Vitis vinifera* L.

Locus. Habitat in omnibus quatuor orbis terrarum partibus, climate temperato. Floret Maio.

Frutex.

Forma. Passulae sunt baccae uvarum, seu baccae maturae siccae, ovatae, aliae longiusculae, aliae globosae, rugosae, subdiaphanae, fuscae aut nigrescentes, quae intra pelliculam teneram continent pulpam melleam, ac plerumque binos acinos.

Propriet. Odor nullus. Sapor dulcis, gratus.

### PETROLEUM. PETROLEO. Bitumen liquidum.

*Bitumen Petroleum* L.

Locus. Invenitur intra rupes ac natans in fontibus quibusdam Persiae, Italiae et Galliae.

Forma. Bitumen est liquidum, diaphanum, aquae ad instar limpidum: tunc vocatur *Naphtha*. *Petroleum album*. Flavicans subrufescens appellatur *Petroleum rubrum*, quod est minus liquidum ac diaphanum, quam prius: aut denique est nigrum, spissum, minus liquidum antecedentibus, vocatum *Petroleum nigrum*. Eligendum est primum: quod si deest, secundum.

Propriet. Odor est fortis, penetrans, haud ingratus: sapor acris, amarus, nauseosus. In aqua

Codex medic. Europ. Sect. VI. p. 2.

F

pariter ac in spiritu vini haud solvitur, sed utrique innatat. Iniecta aquae gutta Naphthae, funditur in superficie, velut oleum. In vitello ovi et felle solvitur. Flagrantiae adeo capax est, ut accendatur, protinus ut candens substantia proxima est, sine contactu. Id optime in Naphtha contingit.

## PICHURIM.

## PECHURIM.

## Nucleus.

*Laurus?*

**Locus.** Habitat in Paraguay et ad flumen Maranhon. Arbor.

**Forma.** Pichurim est nucleus ovali-oblongus, pollicaris et maior: ponderosus, utrinque obtusus, hinc convexus, illinc concavo-planus, sulco longitudinali; extus fusco-olivaceus, subrugosus, intus carneo-flavicans, sparsus punctis luteis. Alia varietas Pichurim venalis est, duplo maior priore, rugosa, extus pallidior, intus magis obscura; dura, amara, minus aromatica.

**Propriet.** Odor est fragrans, Sassafras et Nucleis moschatae aemulus. Sapor aromaticus, cum odore congruus. Manducatus nucleus videtur in ore solvi.

## PIPER NIGRUM.

## PIMENTA NEGRA.

## Semina.

*Piper nigrum* L.

**Locus.** Habitat in India orientali et Brasilia.

Frutex.

**Forma.** Piperis semina sunt vix matura, globulosa, pisorum minorum mole, rugosa, nigricantia, parenchymate albo.

Propriet. Odor est aromaticus. Sapor acris, edens, vellicans, persistens.

PIX BURGUNDICA. PEZ DE BORGONHA. Resina. *Pinus Abies et Larix* L.

Locus. Habitat in Europa et America septentrionali. Arbor.

Forma. Pix burgundica est resina solida, fructibus grandioribus, siccis, opacis, fragilibus, quae tanguntur, planiusculis: colore flavido-fusco aut cinereo, extus fusco, sublucidis. Quomodo patetur aut unde nascatur, exploratum nondum habent auctores. Alii enim contendunt, esse mixtam resinam quamdam solidam albamque, quae ex trunco abietis inciso aut forato stillet, cum terebinthina et oleo: alii dicunt, resinam eam fusam et per ignem colatam sordes largiri: alii terebinthinam esse vulgarem fervidam spissescentem: alii demum esse Pinus Laricis resinam, etc.

Propriet. Odor fragrans, balsamicus: sapor thamarus, aromaticus. Flammae admota funditur, accenditur et conflagrat flamma clara, fumoque, superflite carbone levi, atro, parum inquinante.

PLUMBUM. CHUMBO. Metallum imperfectum.

Locus. Invenitur in penetralibus terrae, forma triplici: nimirum: 1. ope sulfuris in mineram ductum ac cum aliis metallis mixtum; 2. acidis phosphori, vitrioli, aëris aut mephitico et arsenicali nuptum; 3. calcis forma; 4. nativum purum

aut virgineum, iuxta nonnullos minerarum scrutatores, quod alii negant.

**Forma.** Metallum virgineum est opacum, molle, flexile, vix ac ne vix quidem sonorum nec elasticum. Digitos inquinat. Colore gaudet cinereo subcoerulefcente, maxime cum recens frangitur.

**Propriet.** Odor est peculiaris, si raditur: sapor nullus. Pes cubicus plumbi fusus pondere aequat 794 libras cum decem unciis, drachmis quatuor, granisque quadraginta quatuor. Gravitata specifica se habet ad aquae gravitatem, ut 1,15:523 ad 10,000. *Briffon*. Malleo pulsatum aut intra duos cylindros panditur in laminas satis teneras. Aëri expositum mutatur, splendida superficie sensim colore cinereo obducitur, post pelliculam obtinet albam, terream, sicut ferrum rubiginem. Igni impositum funditur ea facilitate, adeoque mit calore, ut manum possis immittere, dum funditur sine aestus sensu. Aëris contactus, eo siatu, con tegit plumbum pulvere cinereo, qui, continuat ignis vi, in flavicantem vertitur, dein ruberrimum dictum *Minium*. Haec calx flava igni fortissimè exposita funditur, abitque in squamas lucidas, flavas, semi-vitreas, quae vocantur *Lithargyrum*. Id maiori caloris gradu fustum mutatur in vitrum flavicans, pellucidum. Tubuli fusorii ope ilico funditur, splendet, fervet, fumat, in prunae superficie format circulum flavidum: *fluxum* tingit flav colore: cum plumbi plus additur, fit is albidus plus minusve opacus. In aqua vix ac ne vix quidem mutatur, nisi ea sales habeat. Facilius au



difficilius in omnibus acidis solvitur: solutiones omnes gaudent sapore styptico dulci. Foliis autem minis teneris pansum, vaporibusque aceti vini expositum vertitur in calcem albam, squamosam, quae *Cerussa* dicitur.

**FRUNUM. AMEIXAS. Fructus.**

*Prunus domestica* L.

**Locus.** Habitat in Europa australi.

Arbor hortensis, vulgaris.

**Forma.** Fructus recens est ovatus aut subrotundus, variae molis variique coloris: qui intra cucullam nitidam continet parenchyma carnosum, molle, succulentum, venis mixtis, nucemque asperam, mox oblongo-planam, mox ovatam, margine altero subacuto, altero crasso, sulcato. Inest nucleus amaricans.

**Propriet.** Sapor dulcis, acidiusculo-dulcis.

**PULEGIUM. POEJOS. Herba.**

*Mentha Pulegium* L.

**Locus.** Habitat ad ripas fluviorum, in locis humidis Lusitaniae, Hispaniae, Galliae, Angliae etc. Floret Iulio et Augusto.

Perenne.

**Forma.** Caules teretiusculi, decumbentes, subquadrifidi, pubescentes, ramosi, ramis alternatim oppositis. Folia ovata, obtusa, obsolete denticulata.

**Propriet.** Odor fragrans, fortis. Sapor aromaticus, vellicans, dum manducaveris folia, subemforaceus. Quae quidem qualitates in sicca planta ac in recenti planta observantur.



## PYRETHRUM.

PYRETRO.

Radix.

*Anthemis Pyrethrum* L.

Locus. Habitat in Arabia, Syria, Bohemia, circa Monspelim etc. Perennis.

Forma. Radix est elongata, teres, recta, vix tortuosa, pennae anserinae crassitie, extus longitudinaliter rugosa, fusco-cinerea, fibris capillaribus cincta, parenchymate, dum recens est, albo, subcarneo, dum sicca est, duro, fragili.

Propriet. Nullus odor. Sapor peculiaris protinus acidus videtur, dein satis acris, ardens persistens. Is sensus magis in apice linguae ac in labiis percipitur, magna salivae copia attracta.

QUASSIA. QUASSIA. Radix. Lignum cum cortice  
*Quassia amara* L.

Locus. Habitat in Surinamo, Antillis, S. Crucis insula. Arbor.

Forma. Radix, quae advehitur, est lignosa brachii mole, continet medullam intime iunctam materie, oblecta cortice tenero, aspero, inaequali subinde fisso, albido subflavido. Lignum albidum solidum, durum, rigidum, in frustis variae molitaretibus, aliis brachii mole, aliis digiti, aliis pennae, tectis cortice tenero, aspero, ruguloso, facile secedente, fragili, albido aut pallido, interdum nigro-maculato.

Propriet. Odor nullus. Sapor amarissimus nullo alio admixto.

QUERCUS. CARVALHO. Cortex.

*Quercus Robur* L.

Locus. Habitat per omnem Europam.

Arbor vulgaris.

Forma. Cortex est crassus, sublignosus, colore cinereo, extus longitudinaliter fissus.

Propriet. Odor nullus. Sapor satis stypticus, subamarus.

RAPHANUS RUSTICANUS. RABAO RUSTICO.

Radix recens.

*Cochlearia Armoracia* L.

Locus. Habitat in locis humidis, ad ripas fluviorum Lusitaniae et Europae australis, colitur in hortis. Floret a Julio ad Septembrem. Perennis.

Forma. Radix pollicem et quod excurrit crassa, elongata, carnosae, alba, glabra, rugis transversalibus, subannulatis, remotiusculis: stipata saepe a laterè nodulis subrotundis remotis, e quibus radiculæ prodeunt fibrosæ. Parenchyma album, carnosum, firmum; transversim sectum, margine monstrat annulum tenerum, cuius centrum aut medulla plena est punctis sparsis splendentibus.

Propriet. Odor penetrans. Sapor acris, vellicans, subamarus, dulcis. Manducata linguam cautesque vellicat et calefacit, tussim ciēt, nares irritat, lacrimas provocat: quae sequelae ut promte nascuntur, ita cito evanescent.

RHABBARUM. RUIBARBO. Radix.

*Rheum palmatum* et *undulatum* L.

Locus. Habitat in China, Turcarum regno (sic!) et colitur in Russia. Perennis.

**Forma.** Obviae sunt duae species peculiare huius radice: nimirum: *Rheum chinense* aut *turcicum* et *Rheum sibiricum*. Prioris existant varietates, cum vel magis ponderosa sit radix, vel levior, flavidior, vel rubicundior aut ad fuscum vergens. Vulgatio *chinensis* venit in frustis longiusculis aut rotundatis, glabris, hinc planis illinc convexis, nonnunquam forma unguis equinae, palmum fere latis, ponderosis: parenchymate solido, minus fragili, rubro-variegato, in roseum aut flavum albumve colorem vergente. *Sibiricum* est magis spongiosum, fragile, minoris ponderis, pallidum aut albido-flavicans, eadem forma exterior ac chinense: utriusque frustis foratis, cum fila ad siccandum traiciantur. Eligenda sunt frusta, quorum color flavidus magis in rubrum vergit, quorum caro variegata roseo colori propinqua est, quaeque pondere excellunt.

**Propriet.** Odor peculiaris, blande aromaticus, nauseosus. Sapor subamarus, austerus, aut stypticus. Species, quae optima ducitur, manducata in ore solvitur, tingitque colore croceo linguam, totum os, fauces et salivam: minus bona haud ita solvitur. Quo melior etiam est, eo minus tingit infusum aquosum, eoque minus extracti gummosi largitur.

**RICINUS VULGARIS.**

**MAMONA.**

**Semina.**

*Ricinus communis* L.

**Locus.** Habitat in India et Brasilia: colitur in Lusitania. Floret a Maio ad finem aestatis et ipso autumno.

**Annua.**

**Forma.** Semina sunt ovata, utroque latere plana, putamine fragili, splendido, variegato aut fusco, viridiuscule et flavide maculato, nucleo al-bissimo, centro vacuo, pellicula cincto satis tenera, eiusdem coloris.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor satis dulcis et acris. Manducatorum medulla videtur in saliva solvi amygdalarum more, sed postea acrimonia in faucibus percipitur diuque moratur.

**ROSA PALLIDA s. DAMASCENA. ROSAS PALLIDAS.**  
Petala.

*Rosa centifolia et damascena* L.

**Locus.** Habitat per omnem Europam: colitur in hortis. Floret a Maio ad Augustum. Frutex.

**Forma.** Flores sunt pleni, terminales, pedunculati: petala ovata, obtusa, colore pallide rubro.

**Propriet.** Odor fragrans, gratus. Sapor sub-stypticus.

**ROSA RUBRA. ROSAS VERMELHAS. Petala.**  
*Rosa gallica* L.

**Locus.** Habitat in Europa. Floret a medio Maio ad Augustum. Frutex.

**Forma.** Flores etiam terminales, pedunculati, haud adeo pleni ac priores: petala sessilia, cordata, apice reflexo, lata, nervosa basi, colore incarnato in rubrum vergente.

**Propriet.** Odor fragrans, gratus: sapor stypticus, subamarus. Siccata omnino incarnata sunt.



ROSMARINUS. ALECRIM. Folia. Flores.  
*Rosmarinus officinalis* L.

Locus. Habitat in terris arenosis Galliae, Italiae, Hispaniae, Lusitaniae. Colitur in hortis. Floret Martio. Frutex vulgaris.

Forma. Folia sunt linearia, obtusa, rugulosa, supra viridia, subtus albida. Flores sunt monopetali irregulares, bilabiati, coerulei, calyce pariter bilabiato.

Propriet. Odor fragrans, gratus. Sapor similis, aromaticus, vellicans.

RUBIA TINCTORUM. RUIVA. Radix.  
*Rubia tinctorum* L.

Locus. Habitat in convallibus inter vineas et nemora Lusitaniae, Hispaniae, Galliae etc.

Perennis.

Forma. Radix elongata, teres, ramosa, calami scriptorii crassitie, nodis nonnullis distantibus, extus pallide rubra, saepiusque fusca. Parenchyma sanguineum; medulla vetustiarum radicum nigrescit.

Propriet. Odor nullus. Sapor subamarus, leviter stypticus, ingratus. Manducata salivam rubro tingit colore.

RUTA. ARRUDA. Folia.  
*Ruta graveolens* L.

Locus. Habitat in Hispania, Lusitania. Floret Iunio. Perennis, vulgaris.

Forma. Folia sunt bipinnata, pinnulis oppositis, laciniis elongatis, horizontalibus, lanceolatis,



glabris, subtus punctatis, leviter ferratis, lacinia extima maiore, cuneata.

Propriet. Odor fortis, subfoetidus, sed haud ingratus. Sapor amarus.

SABINA.

SABINA.

Folia.

*Iuniperus Sabina* L.

Locus. Habitat in montibus Galliae, Helvetiae, Hispaniae et Lusitaniae. Frutex.

Forma. E ramis sparsis, teretibus, fuscis, ramosis, squamis marcidis, ramusculi nascuntur foliis linearibus, rigidis, angustis, persistentibus, acutis, oppositis, sessilibus, subimbricatis obtekti.

Propriet. Odor foetidus, fortis. Sapor amarus, acris, fortis.

SACCHARUM.

ASSUCAR.

Sal essentialis.

*Saccharum officinarum* L.

Locus. Habitat in locis inundatis utriusque Indiae. Colitur in locis fertilibus Brasiliae.

Perenne.

Forma. *Saccharum depuratum* est albissimum, solidum, durum, fragile, particulis aut granis crystallinis, lucidis, subdiaphanis compositum. *Saccharum candum* crystallis albis aut flavicantibus constat, quarum prismata aut columnae sunt tetraëdrae, terminatae pyramidibus diëdris, subobtusis, cuneatis. Utraque sacchari species (quibus utimur, praecipue puro) e saccharo crudo, quod vulgo notum est, ope purificationis et crystallisationis secedit: istud (crudum) est extractum

plantae dictae, potest autem extrahi e multis aliis plantis fructibusque, e melle demum apum.

Propriet. Odor nullus. Sapor dulcissimus, gratissimus. Adeo facile citoque solvitur in aqua, ut uncia frigidae aequalem copiam sacchari solvat. Ea solutio, caloris ope et addita maiore aquae copia, fermentat, largiturque et vinum et spiritum vini et acetum. In spiritu vini pariter solvitur, praecipue caloris adminiculo: miscetur oleis essentialibus, eaque reddit in aqua solubilia; impedit lactis coagulum. Funditur ad ignem, accenditur prunis iniectum, turget, spumat et ardet flamma coerulea, spargit fumum odoris peculiaris, grati, superstitute carbone.

SAGAPENUM. SAGAPENO. Gummi-resina.

Ignotum genus plantae, quae largiatur.

Locus. Habitat in Persia aut Alexandria: inde saltem provenit.

Forma. Gummi-resina solida, in frustis aut lacrimis solutis, ceraforum mole, aut maioribus, rubro colore, subdiaphanis et lucidis, homogeneis, cerae ad instar mollibus. Ea forma Sagapeni, quae in lacrimis est, praestat vulgari, sed raro occurrit. Vulgare in massis grandioribus obvium est, quae frustis variis constant, aliis albidis, aliis rubris, aliis viridibus, festucis lignorum et seminibus immixtis: mox durum est et fragile, mox molle ut cera.

Propriet. Odorem habet gummi ammoniaci et asae foetidae intermedium, saporem subamarum,

acrem, persistentem. Manducatum dentibus adhaeret, mollitur, albescit, tandem in saliva solvitur. Igni admotum, facile accenditur, conflagrat flamma et fumo et fuligine, superstita carbone nigro. Resinae plus habet quam gummi.

SAGO. SAGO. Gummi aut amyllum.

*Sagus* s. *Palma farinaria* Rumph. amboin.

Locus. Habitat in locis humidis et paludosis insularum Moluccarum et in Malacca. Arbor.

Forma. Sago exhibet grana subglobosa, aut subangulata, inaequalia, glabra, albida, extus lurida, medulla candida. Fiunt e medulla *Palmae* dictae, fere eodem modo, quo amyllum e tuberibus *Batatas*.

Propriet. Nullum habet odorem, nullum saporem. Dentibus manducatum adhaeret, nec in saliva solvitur. Parum in aqua frigida mollescit nec solvitur: fervida mollit, turgere facit et constituit gelatinam, licet grana formam servant. Frigefcente aqua, gelatina nascitur insipida, mollis: igni iterum imposita magis spissescit, nec funditur. Nec oleis nec spiritu vini solvitur. Per plures annos haud mutata persistunt grana, loco sicco servata: contrarium accidit loco humido.

SAL AMMONIACUS.

SAL AMMONIACO.

Sal neuter perfectus.

*Alkali volatile muriaticum* Bergm.

Locus. Nativus invenitur in cavernis montium ignivomorum, in cavitatibus punicum, in terrae

superficie aut rupibus adhaeret, petrae seu pulveris forma, in Persia etc.

**Forma.** Sal ammoniacus communis est sal neuter perfectus, e connubio acidi marini cum alcali volatili nascens, qui advehitur massis subrotundis, ab altera parte convexis, ab altera concavis, fundo crassioribus, subdiaphanis, dum purus est. Componuntur filis longiusculis, flexilibus ut fila metallica ad certum usque gradum, priusquam rumpant, prismatibusque tetraëdris, quae in pyramides abeunt pariter tetraëdras.

**Propriet.** Sapor acris, vellicans et nauseosus. Solvitur in quintupla aut sextupla portione aquae frigidae, cum qua ingens frigus producit, ac fere in aequali copia aquae fervidae. Crytalli, lenta evaporatione natae pyramides sistunt decaëdras longiusculas, aut prismata octaëdra. Aëri expositus haud mutatur: ad ignem aut tubulum fusorium avolat et sublimatur. Calce admixta in particulas secedit, etiam alcalibus fixis.

## SAL CATHARTICUS AMARUS.

SAL CATHARTICO AMARGO. Sal neuter terreus.

*Natrum fontanum* L.

*Magnesia vitriolata* Bergm.

**Locus.** Nativus invenitur in fontibus pluribus, ut Egerano, Sedlizeni etc., neque minus in terra.

**Forma.** Sal catharticus amarus est sal neuter, e connubio acidi vitriolici cum magnesia natus. Occurrit crytallis exiguis, pellucidis, acuum specie, aut prismatibus tetraëdris, quae in pyramides abeunt diëdras.



**Propriet.** Sapor est frigidus, salitus, amarissimus. Solvitur in bis tanto aquae frigidae et in dimidia parte aquae calidae. Cryſtalli per lentam evaporationem natae prismata formosa constituunt pellucida tetraëdra, pyramidibus pariter tetraëdris terminata. Ad aërem siccum vertitur in farinam albam, ad ignem funditur, post refrigerens coit in massam informem, denique albam fragilemque, post amissam omnem aquam cryſtallis idoneam. Ope alcalium fixi volatilisque ac aquae calcis secedit in elementa.

## SAL COMMUNIS.

## SAL COMMUM.

Sal neuter perfectus.

*Muria marina* L.

*Alkali minerale muriaticum* Bergm.

**Locus.** Invenitur in mari, lacubus salis, in montibus quibusdam, pariter et magnis massis in terrae penetralibus variarum regionum, Poloniae, Hungariae, Angliae, Brasiliae, Angolae etc.

**Forma.** Sal communis est sal neuter perfectus, ex acido marino et alcali minerali compositus, cryſtallis obvis cubicis, variae molis, candidis, pellucidis. Quodsi in intestinis terrae occurrit aut in montibus, *sal gemmae* dictus, est vel in frustis maioribus, satis duris, glaciem referentibus, aut cryſtallos exhibet cubicas, grandes, claras et pellucas.

**Propriet.** Sapor est salis, sed gratus. Ad aërem attrahit humorem, in humido liqueſcit, praecipue si is sal aliquid salis marini terrei conti-



net. Solvitur in tribus partibus cum dimidia aquae frigidae, haud tantum poscit fervidae. Ad ignem crepitat, funditur cum candet, denique avolat sine particularum secessu, neque amittit quidquam, praeter aquam crystallis idoneam. Acidorum vitriolici et nitrosi ope ac alcali vegetabilis caustici secedunt particulae.

SALEB.

SALEB.

Radix.

*Orchis bifolia, coriophora, latifolia, mascula, militaris, Morio, palmata* L.

**Locus.** Habitat in nemoribus pratisque variarum Europae partium, nimirum Lusitaniae, Hispaniae, Galliae, ipsiusque Asiae. Floret a Martio ad Maium.

Perennis.

**Forma.** Radix est bulbosa, mox ovata, mox cordata, palmata, alba, parenchymate pariter albo, subspongioso: sicca extus est cinerea, subrugosa, parenchymate duro, corneo. Radix Saleb, ex Oriente advecta, maior est nostrate, nam pollicem longitudine aequat aut superat, ovata est aut cordata, ovato-oblonga, palmata, glabra, foveolis plena, subpellucida, dura, parenchymate uniformi, viridiusculo, cornu duritie aequans.

**Propriet.** Nullum habet odorem, nisi recens sit, ubi hircum redolet: sapor est insipidus. Manducatum in saliva mucii speciem adipiscitur. In aqua frigida fundum petit, turget, glutinosum fit, neque cum aqua miscetur: attamen drachma una pulveris octo uncias aquae, caloris adminiculo, in gelatinam convertit. Nec in oleis, nec in alcohole solvitur.

N. Perinde est, cuiusnam Orchidis radix funatur, licet optima habeatur, quae e bulbis Orchidis Morionis petitur. Interest tamen et tempus et modus colligendarum radicum et ratio eas praeparandi. Quod tempus attinet, legendae sunt, postquam semina duruerint et cum pedunculus florum narcuerit et siccuerit. Bulbilli anni praeteriti reiciendi sunt, iis duntaxat electis, qui solidi sunt, fragiles, vigore conspicui, quique in aquam projecti fundum petunt. Tunc pellicula, quae obtegit, detrahitur, aut raditur sirigilis ope, postquam liu in aqua frigida morati fuerint: facilius id fit, immixtis in aquam calidam et dein fricatis ope panis asperi. Pellicula detracta, collocantur in fornace mediocriter calido, ut sensim siccescant corneamque obtineant indolem.

## SALVIA.

## SALVA.

## Folia.

*Salvia officinalis* L.

Locus. Habitat in locis cultis et argillosis Lusitaniae, Hispaniae. Colitur in hortis. Floret Aprilis ad Iunium usque.

Perennis.

Forma. Folia sunt opposita, petiolata, ovato-anceolata, obtusa, subpubescentia, supra rugosa, subtus foveolis plena, quae retis speciem prae se ferunt, margine crenato. Superiora petiolis gaudent brevibus, aut sessilia sunt.

Propriet. Odor fragrans, fortis. Sapor aromaticus, subamarus.

**SAMBUCUS.**      **SABUGUEIRO.**      Flores, baccae.

*Sambucus nigra* L.

**Locus.** Habitat in omnibus terrae speciebus Lusitaniae totiusque Europae. Floret Aprili ad Iunium usque.      **Frutex.**

**Forma.** Flores sunt albi, in cyma dispositi convexo-plana, quinquepartita. Corolla est monopetala, rotata, laciniis quinque revolutis: calyx albus, quinquedentatus. Baccae mole pisi pusilli, ovaes, subglobosae, nigrae, lucidae, umbilico stellato, parenchymate succulento, quod tria semina continet.

**Propriet.** Odor florum est fragrans, subfoetidus, nauseosus: baccarum nullus. Sapor florum amaricans, odorem aemulans; baccarum acrisculo-dulcis. Manducatae salivam rubro colore tingunt.

**SANTONICUM, CINA.**      **ALEXANDRIA.**      Semina.  
*Artemisia Contra et iudaica* L.

**Locus.** Habitat in imperio Mogolis, Persia etc.      **Frutex.**

**Forma.** Semina sunt oblonga, exigua, glabra, plus minusve flavida, aut viridiuscula, festucis et paleis ipsius plantae mixta. Eligenda sunt recentia, pura, bene nutrita, odore forti et sapore amaro.

**Propriet.** Odor est fragrans, fortis, subnauseosus. Sapor cum odore congruus, aromaticus, amaricans.

APONARIA. SAPONARIA. Radix, herba.

*aponaria officinalis* L.

Locus. Habitat ad fluvios, in convallibus, nemoribus, locis humidis et arenosis Lusitaniae, Hispaniae etc. Floret per totam aestatem. Perennis.

Forma. Radix est elongata, teres, pennae aut digiti minimi crassitie, nodosa, superne ramosa, radiculis capillaribus munita, cortice crassiusculo, paratu facili, subrubro. Parenchyma album, firmum, fibrosum, medulla teres, annulo albidoincta. Caulis pedalis aut bipedalis, simplex, sed superne ramosus, ramis oppositis, nodosus, interodiis inferioribus compressis, superioribus teretiusculo-quadrangulis. Folia e nodis petiolis brevibus prodeuntia, ovato-lanceolata sunt, acuta, glabra, trinervia, venis sublineata, margine labra.

Propriet. Odor nullus. Sapor radicis dulcis amaricans, mucosus, herbae subamarus.

SARSAPARILA. SALSA-PARRILHA. Radix.

*Smilax Sarsaparila* L.

Locus. Habitat in Peru, Mexico et Brasilia.

Perennis.

Forma. E tubere pollicari nascuntur radices prostratae, elongatae, calami scriptorii crassitie, longitudinaliter sulcatae, flexiles, cuticula tenera subro-cinerea aut fusca: intus albae, farinosae, succae, sublignosae, medulla subfarinosa, alba, compacta.

Propriet. Odor nullus. Sapor amaricans.



Sicca mánducata abit in substantiam farinosam submucosam, parte lignosa superstitē.

SASSAFRAS. SASSAFRAZ. Lignum, cortex.  
*Laurus Sassafras* L.

**Locus.** Habitat in Brasilia: colitur in hortis Europae et regionibus calidioribus Americae borealis. Arbor.

**Forma.** Lignum est leve, parum durum, fragile, colore cinereo subferrugineo aut flavo: cortice extus rugoso, fusco-rubro aut cinereo-fusco; intus ferrugineum est lignum, glabrum, fragile ac in strata tenera secedens.

**Propriet.** Odor fragrans, fortis, gratus; foeniculi aemulus. Sapor aromaticus, subvellicans, dulcis. Corticis odor saporque ligni similes, sed fortiores.

SCAMMONIUM. ESCAMONEA. Gummi-resina.  
*Convolvulus Scammonia* L.

**Locus.** Habitat in Syria, Oriente, Brasilia.

Perennis

**Forma.** Gummi-resina in frustis levibus, cinereis aut fuscis, fragilibus, qua franguntur, lucidis. Eligenda est levis, gummi ad instar clara, colore albido, tenera, ut frangatur facileque vertatur in pulverem, quae fracta in aqua aut saliva solvatur lacteo colore.

**Propriet.** Odor est subfoetidus, nauseosus. Sapor protinus insipidus, mox acriusculus, amarus, nauseosus. Manducata solvitur difficulter in ore, mollitur dentibusque adhaeret. Digito hu



mecto fricata, mox lactea viridiuscula fit: is color in aquam transit, in qua solvitur. Pars resinosa, quae in spiritu vini solvitur, tincturam exhibet pel- lucidam.

SCILLA.                      CEBOLA ALBARRA.                      Radix.  
*Scilla maritima* L.

Locus. Habitat in locis arenosis sabulosis Hi- spaniae et Lusitaniae. Floret Augusto et Septembri.  
Perennis.

Forma. Radix est bulbosa, pyriformis, pugni et quod excedit mole, squamis carnosis, latis, la- teribus attenuatis, succo glutinoso plenis, albidis composita: obteguntur cuticula sicca, tenera, ner- vosa, exterioribus tenerioribus, interioribus basi succulentis. E basi bulbi prodeunt radiculae in- numerae, quae veram sistunt radicem.

Propriet. Odor subnullus. Sapor satis ama- rus, acris, nauseosus, persistens. In sicca serva- tur amaritudo, evanida acrimonia.

SCORDIUM.                      ESCORDIO.                      Herba.  
*Teucrium Scordium* L.

Locus. Habitat in terris et pratis depressis Lu- sitaniae. Floret a Maio ad Augustum. Perennis.

Forma. Caulis suberectus, angulatus, pube- scens aut villosus, satis ramosus; ramis alternatim oppositis, elongatis, simplicibus, longitudine et forma caulis. Folia sunt sessilia, ovali-oblonga, dentata, mollia, villosa aut pubescentia, glauco- viridia.

Propriet. Odor fortis, alliaceus, sed gravior: sapor amarus, persistens.

SENEGA.

SENEGA.

Radix.

*Polygala Senega* L.

Locus. Habitat in Virginia et Pennsylvania.

Perennis.

Forma. Radix est lignosa, dura, fragilis, ramosa, digiti crassitie, tortuosa, nodosa, e tubere informi prodiens, costata, intus alba, cortice crasso, flavo, cuticula cinerea, annulato-rugulosa.

Propriet. Odor peculiaris, subaromaticus. Sapor initio subvellicans, dein aciduli aliquid et acris in faucibus sentitur, quod persistit cum sensu siccitatis.

SENNA.

SENNE DE ALEXANDRIA, OU DE PALTA.

Foliola.

*Cassia lanceolata* Forsk.

Locus. Habitat in Aegypto, Arabia circa Mocham.

Frutex.

Forma. Foliola sunt ovali-lanceolata, acuta, integerrima, pallida, venis nervisque alternantibus. Cum sicca sunt, eligantur recentia, integra, molis mediocris, pura, sine festucis, tactu mollia, colore viridi in flavum vergente: odore satis forti, sapore submucoso, ingrato.

Propriet. Odor subaromaticus, nauseosus. Sapor subamarus, nauseosus, mucosus.

SENNA ITALICA. SENNE DE ITALIA. Foliola.

*Cassia Senna* β. L.

Locus. Habitat in Italia, Gallia et Hispania, ubi colitur. Frutex.

Forma. Foliola sunt ovalia, obtusa aut elliptica, pallide viridia, lateribus inaequalia, venosa.

Propriet. Odor prioris, sed debilior. Sapor etiam amarus, nauseosus, mucosus aut viscosus, cum manducantur.

SERPENTARIA VIRGINIANA.

SERPENTARIA VIRGINIANA.

Radix.

*Aristolochia Serpentaria* L.

Locus. Habitat in Virginia et Carolina.

Perennis.

Forma. Radix est composita radiculis multis fibrosis, fragilibus, tortuosis, intricatis, quae aliis, capillorum crispiorum forma cinguntur, extus fuscois aut ferrugineis, intus pallidis aut flavido-albis.

Propriet. Odor fragrans, fortis, camforam aemulans. Sapor acris, aromaticus, subamarus, vellicans, persistens.

SEVUM. SEBO. Oleum fixum animale coagulatum.

*Sevum ovillum* s. *bovinum*.

Locus. Invenitur in ambitu intestinorum et sub pelle boum, vervecum etc.

Forma. Sevum est oleum fixum, aut adeps coagulatus, colore albo aut flavicante, molle, cuticulis teneris inclusum, quae telam cellularum animalium eorum constituit, ut supra innuimus.

**Propriet.** Nullum habet odorem, saporem unctuosum, insipidum. (Quod ad chemicas attinet qualitates, generatim eadem sunt, quae obtinent in adipe simili: de quibus videantur *Elementa Chemiae*.)

**SIMARUBA.****SIMARUBA.****Cortex.**

*Quassia Simaruba* L.

**Locus.** Habitat in Guiana et aliis Americae regionibus.

**Arbor.**

**Forma.** Cortex est coriaceus, flexilis, fibrosus, lineam crassus; extus cinereo-flavicans, transversim rugosus, colliculis aut verrucis variae formae oblitus, intus vel omnino glaber, vel cuticulis longitudinalibus pallidis tectus.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor amarus, stypticus.

**SINAPI.****MOSTARDA.****Semina.**

*Sinapis nigra* L.

**Locus.** Habitat in campis Europae: colitur in hortis. Floret a Maio ad Iulium.

**Annua.**

**Forma.** Semina sunt parva, subrotunda, obscure ferruginea, subrugulosa.

**Propriet.** Odor vix percipitur. Sapor subamarus, acris, vellicans. Manducata facile comminuuntur, irritant et calefaciunt linguam faucesque, et salivam albidam reddunt.



## SPERMA CETI.

## SPERMACETI.

Oleum fixum animale coagulatum.

*Phyfeter macrocephalus* L.

**Locus.** Invenitur in cavitate cranii variorum Cetaceorum, praecipue speciei dictae.

**Forma.** Sperma ceti aut sebum balaenae est oleum fixum, coagulatum, cerae mole, album, squamulis siccis, mollibus, splendentibus, albis, semipellucidis compositum.

**Propriet.** Odor nullus. Sapor unctuosus. Ad aërem calidum flavescit et rancescit. Igni admotum accenditur et ardet flamma clara, sine fumo nec odore ingrato. In cucurbita igni proxime imposita destillatum, haud aquam acidam largitur, aliorum oleorum fixorum more, quanquam aliis conditionibus cum iis congruat: sed simulac fervere incipit, totum fere transit in conceptaculum, sine relicto carbonis vestigio: repetita destillatione perdit formam coaguli et liquidam assumit. Solvitur in acido vitrioli forti, e quo secedit, adiecta aqua: nihil tamen in acidis nitri aut marino solvitur. Solvitur etiam in aethere et alcohole fervido, e quo fundum petit ut refrigerescit.

## SPIGELIA.

## ESPIGELIA.

## Radix.

*Spigelia marilandica* L.

**Locus.** Habitat in Carolina australi. Perennis.

**Forma.** Radix simplex, inaequalis, multis radiculis longiusculis munita.

**Propriet.** Odor foetidus, similis ii, quem aqua spargit in vase ligneo corrupta.



SPINA CERVINA. ESPINHA CERVINA. Baccae.  
*Rhamnus catharticus* L.

Locus. Habitat in locis humidis Lusitaniae, totiusque Europae. Floret Aprili et Maio. Arbor.

Forma. Bacca est subglobosa, pisi mole, apice planiuscula, umbilici loco tuberculata, glabra, lucida, nigrescens, parenchymate viridiusculo, pulposo, succulento, quod continet quatuor semina ovata, postice convexa, ab antica parte acuta, utrinque compressa, subnitida, fusca.

Propriet. Odor nullus: sapor medius inter dulcem amarumque, protinus nauseosus, dein subsypticus. Manducatae tingunt salivam colore viridi in rubrum vergente.

SPONGIA. ESPONJA. Zoophyton.  
*Spongia officinalis* L.

Locus. Habitat in mari mediterraneo et brasiliensi.

Forma. Spongia est substantia mollis, fibrosa aut stupea, colore magis minusve flavido aut fusco, foraminibus aut oculis plena, quibus humores forbens, turget. Eligenda est subtilissima, levissima, foraminibus exiguis, colore flavido, libera sordibus et concharum frustis, quae saepe continet.

Propriet. Nullum habet odorem, neque saporem. Est satis elastica.

STANNUM. ESTANHO. Metallum imperfectum.

Locus. Invenitur in terrae penetralibus, varia forma: nimirum: 1. nativum aut virgineum; 2. calcis forma, variae figurae ac variorum colo-

rum; 3. minima copia cupri, ope sulfuris in mineram redactum.

Forma. Metallum est blandum, paullo durius quam plumbum, album, argenteo splendore, flexile; dum flectitur, crepitat.

Propriet. Odor nullus, sed calefactum aut frictum, spargit odorem peculiarem: sapor est ingratus. Gravitas specifica est 7 ad 7,45. Fusi est 729,14. *Briffon*. Pes cubicus pendit fere 510 pond. Satis aptum est, sub malleo cudi ac pandi, in fila quoque duci potest, quorum unum, decimam pollicis partem diametro aequans sustinet 49 libras cum octo unciiis sine ruptura. Ad aërem sensim splendorem amittit: cum impurum est, superficies obtegitur strato cinereo, quod calx est stanni, producta acido aëreo aut mephitico atmosphaerae. Igni lento impositum funditur adeo facile, ut ideo fusu facillimum omnium habeatur metallorum. Fusum in vase aperto, quae aëre tangitur, superficies pulvere tegitur cinereo: is calx est, *cinis stanni* dicta, quae cum diutius ignem passa fuerit, albescit, *cinis stanni albus* vocata: is demum, ope ignis violentissimi vertitur in vitrum, rubini aut hyacinthi specie. Fusum denique stannum igne forti, quo candet, ardet flamma alba, satis clara, fumoque avolat, qui collectus calcem sistit albidam, in acubus, nomine *florum stanni*. Aqua pura haud mutatur, sed perdit splendorem: communis aqua, sales continens, id arrodit. Acida mineralia solvunt stannum varia vi, pro singulorum indole. Acidum vitrioli, caloris adminiculo,

solvit id, sine fervore; sed, dum solvitur, spargit vapores suffocativos, qui *gaz sulfureum* sistunt. Acidum nitrosum solvit id tanta vi tantoque fervore, ut ipso momento metallum praecipitetur forma calcis albae, evolutis simul vaporibus rubris. Acidum marinum solvit fervore et odore admodum foetido. Aqua regia aut acidum nitroso-marinum solvit id vehementer et calore orto violento. Acetum vini et acida vegetabilia corrosa superficie vertunt in calcem. Nubitur sulfuri, facileque iungitur omnibus metallis ac semimetallis, quorum aptitudinem sub malleo pandi minuit, facitque fere omnia, praecipue cuprum, duriora et magis sonora.

STORAX.      ESTORAQUE.      Balsamum solidum.  
*Styrax officinalis* L.

Locus. Habitat in Gallia provinciali, in Italia et Oriente.      Arbor.

Forma. Balsamum in granis aut lacrimis purissimis, subdiaphanis, albidis aut pallidis, pisi minoris mole, quae statim funduntur, ut digitis contrectantur: aut in frustis glutinosis, facile fuis, quae particulas albas continent, flavidas, oleosas, purissimas, variae molis et figurae: aut denique massa fusca, rubicunda, levi, digitis comminuenda et cum comprimitur in massas colligenda, quae particulis squamosis, albidis lucidis, ac festucis arenaeque miscetur. Prior species est *Storax in lacrimis* aut *granis*, quae in museis tantummodo occurrit, carissimi pretii: secunda vocatur *Calamita* aut *Gabalita*, quae et ingentis pretii est:

tertia demum est *Storax vulgaris*, quae in officinis pro Calamita venditur.

**Propriet.** Odor est fragrantissimus, suavissimus: sapor aromaticus, gratus. Solvitur in spiritu vini iuxta ac in aqua, cui impertit fragrantiam: quapropter Chemici nonnulli Gummi-resinis adnumerant, alii ab his segregant, inter Balsama numerantes, ob salem acidum, benzoico similem, quem sublimatione obtinemus. *Storax vulgaris* saporem habet subamaricantem. Manducata comminuitur statim in pulverem, deinde vero in massas colligitur, sine adhaesione ad dentes: postremo in saliva solvitur, quam colore tingit lacteo subrubicundo. Accensa ardet flamma alba sublurida, fumo aromatico, superfluite paucissimo cinere. Igni in vase clauso imposita funditur duntaxat pars resinosa. Nec solvitur in oleis fixis, nec ea tingit; olea destillata, in quibus haud solvitur, tingit colore aureo.

**SUCCINUM.****ALAMBRE.****Bitumen.**

*Succinum electricum* L.

**Locus.** Invenitur ad litora maris baltici et in terrae penetralibus ad ipsa litora aliisque locis.

**Forma.** Bitumen est solidum, in frustis variae molis, plus minusve flavum, ut et album, diaphanum aut opacum, fragile. Eliguntur frusta speciosa, dura, clara et pellucida, alba aut flava, sine sordibus.

**Propriet.** Odor nullus, nec sapor. Manibus frictum aut secum ipsum, vim electricam obtinet, attractis paleis festucisque, simul odorem spirat



gratum, praecipue fufum. Id autem contingit ad gr. 550 therm. Fahrenh. At tunc perdit pelluciditatem. Prunis iniectum, ardet flamma pallida, fumo edito albo fpiffo, fuaveolente. Nec in aqua nec in fpiritu vini folvitur: cum hic eft rectificatifsimus, fit rubicundus. Solvitur in acido vitrioli, cui colorem rubrum impertit; ex eo autem aquae ope praecipitatur.

## SULFUR.

## ENXOPRE.

*Sulfur nativum*, vel Phlogifton minerale acido vitrioli iunctum. *Cronstedt*.

Locus. Invenitur: 1. *nativum*, in fruftis folutis variae figurae, quae venas rupibus interiectas formant, aut in parvis fruftis, quae rupes calcareas circa montes ignivomos occupant: nunc crystallis pallidis transparentibus aut femipellucidis octogonis feu rhomboideis in caveis quarzi: iam forma acicularum natantium in fuperficie aquarum mineralium calidarum, aut circa montes ignivomos; 2. terrae argillaceae mixtum; 3. arcte iunctum terrae calcareae, ut *hepar sulfuris*; 4. ferro argillaeque nuptum, unde extrahitur fublimatione sulfur ufitatum, de quo fermo eft; 5. metallis iunctum, quae in mineras reducit.

Forma. Sulfur ufitatum aut venale eft corpus folidum, ficcum, durum, fed admodum fragile, colore flavo, tubulis aut fruftis levibus, quae manibus compreffa, franguntur.

Propriet. Odor nullus. Sapor fere infipidus. Rafum acquirit vim attrahendi, feu electricam.



Igni impositum in vase clauso, mollitur et funditur, colore flavo in viridem aut rubrum mutato, odore sparso foetido et suffocante. Igne aucto pulvis flavus sublimatur, nomine *florum sulfuris*. Calesfactum sulfur ad aërem aut admotum corpori candenti, ilico accenditur, ardet flamma coerulea, stipata vaporibus albis, foetidis et suffocantibus, qui constituunt *acidum sulfuricum volatile*. In aqua haud solvitur, nisi ope longae triturationis ipsi impertiat vim quamdam: nec in spiritu vini, nisi obvii sint vapores utriusque. In oleis, caloris auxilio solvitur, spissiora reddit et colorem saturiorem. Nubitur alcalibus fixis, tum via humida, tum sicca. Secedit in elementa ope acidi nitrosi fortis, pariter et pars quaedam in acido vitriolico, et in marino dephlogisticato, altera parte in ipsis acidis soluta. Iungitur variis terrarum speciebus, maxime calcareis et similiter omnibus metallis.

## TAMARINDUS.

## TAMARINDOS.

## Fructus.

*Tamarindus indica* L.

Loc. Habitat in utraque India, in Arabia et Aegypto. Arbor.

Forma. Fructus est legumen elongatum, utroque latere compressum, subarcuatum, qua semina atent, turgidum, loculis uno aut tribus, totidemque seminibus compressis, angulatis, lucidis: cortice duplici, externe sicco, fragili, interne membraceo: inter hos iacet pulpa mollis, rubicunda, quae dein nigrescit. Attamen in officinis prostat

solummodo haec pulpa mixta fibris longiusculis et feminibus.

Propriet. Odor est subvinosus: sapor satis acidus, gratus.

TARAXACUM. DENTE DE LEÃO. Radix.  
*Leontodon Taraxacum* L.

Locus. Habitat in pratis et ad vias Lusitaniae totiusque Europae. Floret Aprili ad Iulium.

Perennis, vulgaris.

Forma. Radix est cylindrica, fusca, rugosa, rugis transversalibus, annularibus: digiti minimi crassitie, palmi longitudine; subramosa; munita utrinque serie simplici fibrarum capillarium. Parenchyma est carnosum, laminis variis formatum, aut pelliculis imbricatis: medulla rigida, transversim secta, centrum habet circellis aut annulis concentricis compositum.

Propriet. Odor nullus. Sapor amarus, cum aliqua dulcedine initio. Protinus ut evellitur, stillat succum spissum, candidum, cremori lactis similem, amarum.

TARTARUS CRUDUS. TARTARO.  
Sal essentialis acidus.

*Tartarus vini* L.

Locus. Invenitur in vasis, quorum fundum petit, dum sensim vinum fermentat.

Forma. Tartarus est sal essentialis acidus, nuptus alcali vegetabili et oleo, in laminis irregularibus, quae mox compactae subdiaphanae sunt, stratis dispositae, crystallis exiguis splendidis refertae

exalbidae aut rubescentes; mox haud compactae, impurae, opacae, quae facile fatiscunt. Alter vocatur *Tartarus albus*, optimus; alter *Tartarus ruber*.

**Propriet.** Sapor est acido-vinosus. Ad ignem apertum vertitur in alcali vegetabile. In aqua difficulter solvitur: namque frigidae uncia una solvit duntaxat grana quatuor, sed postquam purgatus est, aqua fervida, quae vigelles quater pondus ipsius superat, omnino eum recipit.

## TEREBINTHINA VENETA.

TEREBINTHINA FINA.

Resina liquida.

*Pinus Larix* L.

**Locus.** Habitat in montibus Europae australis, in Sibiria etc. Arbor.

**Forma.** Terebinthina est resina mellis more liquida aut syrupi spissi, pellucida, clara, albida aut pallido-flavicans, satis glutinosa, quae in fila admodum longa ducitur.

**Propriet.** Odor est fragrans, balsamicus. Sapor amarus, aromatico-balsamicus, subacris. In alcohole penitus solvitur, sine ignis auxilio; in aquam haud recipitur, nisi adminiculo vitelli ovi aut mucilaginis, quo facto nascitur mixtio lactea. Destillata balneo Mariae, oleum largitur volatile satis clarum et graveolens, et ad calorem aquae bullientis exhibet oleum gravius, quo facto superest *Terebinthina cocta* seu *Colophonia*.

N. Haec est Terebinthina usitatio in officinis. Optima est terebinthina (balsamum) canadensis:

Codex medic. Europ. Sect. VI. p. 2.

II

sequitur argentoratensis, post veneta, de qua hic sermo est, novissime terebinthina communis, quae vilis est.

## TESTAE OSTREORUM.

CONCHIAS DE OSTRAS.

*Ostrea edulis* L.

Locus. Habitat in oceano et Tago fluvio.

Forma. Duae conchae sunt inaequales, altera plana, altera convexa, utraque hactenus iuncta, ut formam subrotundam, sulcatam, striatam, squamosam referant.

Propriet. Nullum habent odorem, nec saporem: cum acidis effervescent, igne violento in calcem mutantur.

## THYMUS.

TOMILHO.

Herba.

*Thymus vulgaris* L.

Locus. Habitat in terris arenosis, rupestribus Lusitaniae, Europae australis et Orientis: colitur in hortis. Floret a Iunio ad Augustum.

Frutex vulgaris.

Forma. Thymus est fruticulus ramosissimus, erectus, ramis oppositis, obsolete quadrangulis, pubescentibus, foliis oppositis, petiolatis, ovato-oblongis, revolutis, obtusis, punctatis, nitidis aut pubescentibus.

Propriet. Odor fragrans, fortis, gratus. Sapor aromaticus, subamarus, vellicans.

## TORMENTILLA.

TORMENTILLA.

Radix.

*Tormentilla erecta* L.

Locus. Habitat in pratis sterilibus, nemoribus



et terris subhumidis Lusitaniae, Hispaniae etc. Floret a Iunio ad Augustum. Perennis, vulgaris.

Forma. Radix est subcylindrica, tortuosa, nodosa, superne crassior, saepe subrotunda, extus fusca, intus rubra.

Propriet. Odor nullus: sapor stypticus, subaromaticus.

FRAGACANTHA. ALCATIRA. Gummi.

*Astragalus Tragacantha* L.

Locus. Habitat in Europa australi et Oriente.

Frutex.

Forma. Gummi in frustis, quae funiculos toros aut grana subrotunda, albida aut pallida, subliaphana, levia, lucida et fragilia referunt. Est species eius gummi, vocata *Tragacantha in specie bassorensis*, cuius frusta sunt colorata et sordida, igitur reiicienda.

Propriet. Odor nullus. Sapor insipidus. Manucata comminuitur et penitus solvitur. Solvitur, ut aliae gummi species, in aqua, sed haec maiorem poscit copiam, cum durior sit aliis.

TRIFOLIUM FIBRINUM. TREVO D'AGUA. Folia.

*Menyanthes trifoliata* L.

Locus. Habitat in paludibus et locis uliginosis totius Europae. Floret Iunio et Iulio. Perennis.

Forma. Omnia folia sunt radicalia, petiolata, ternata. Foliola ovata, obtusa, utrinque glabra, venosa, subundulata, aequalia, bipollicaria: terminalia sunt oblonga. Petioli teretes, striati, basi



vaginantes. Surgit e radice pedunculus nudus, glaber, teres, erectus, foliis longior, floribus subternis, monopetalis, infundibuliformibus, intus barbatis, laciniis lanceolatis, acutis.

Propriet. Odor haud evidens. Sapor amarissimus.

TRITICUM. TRIGO. Semina. Amylum.

*Triticum aestivum et hybernium* L.

Locus. Patriam exploratam nondum habemus: sed colitur per omnem terrarum orbem. Annuum.

Forma. Semina sunt ovato-oblonga, utrinque obtusa, hinc convexa, illinc sulcata, cuticula flavicante, medulla farinosa, alba. Amylum, quod vera tritici faecula est, ope fermentationis nata, obvenit in frustis siccis, angulatis, irregularibus, candidissimis, quae facile digitis comminuuntur, crepitant, dum fricantur.

Propriet. Odor nullus. Sapor seminum insipidus: manducata videntur viscosa, glutinis more. Amylum pariter insipidum est. Cum in aquam frigidam aut tepidam coniicitur, haud depfitur, neque solvitur. Agitatum autem tandem abit in pul-tem lacteam: cum autem in aqua bullit, aut bul-liente aqua iniecta depfitur, in gelatinam mol-lem, claram, admodum glutinosam mutatur. Nec in alcohole, nec in acidis solvitur.

TUS. INCENSO. Gummi-resina.

*Juniperus lycia et turifera* L.

Locus. Habitat in Africa, Aethiopia, Arabia.

Arbor.

**Forma.** Est gummi-resina alba, lutea aut flavicans; in lacrimis et granis ovatis, oblongis, variae molis, solutis aut ad se invicem agglutinated, glabris, subopacis, fragilibus: quae franguntur, planiusculis. Eligenda est, quae in granis occurrit aut lacrimis formosis, limpida; colore albo subflavicante; fragilibus, aroma olentibus, maxime si flammae admoventur; sapore amaro, quaeque salivam reddunt albam.

**Propriet.** Odor est aromaticus, suavis, balsamicus: sapor subamarus, aromaticus. Manducatum tus comminuitur, mollitur, dentibus adhaeret, albescit, in saliva solvitur, quam lacteo colore imbuunt. Flammae admotum accenditur, sed nec mollitur nec funditur: ardet candelae ad instar, flamma clara, sparso odore aromatico, balsamico, superflite denique carbone sicco, nigrescente. In aqua tritum partim solvitur, solutione lactea: pariter et in spiritu vini, quae tinctura flavicans est et pellucida. In oleis destillatis aut essentialibus haud omnino solvitur: sed molitum olea saturiori colore tingit. Denique in oleis fixis nec solvitur nec ea tingit, licet in iis molliatur.

**UVA URSI.**

**UVA DE URSO.**

**Folia.**

*Arbutus Uva ursi* L.

**Locus.** Habitat in locis rupestribus umbrosisque montium Europae, et in Pyrenaeis hispanicis. Floret vere.

**Frutex.**

**Forma.** Folia sunt ovali-oblonga, apice dilatata, obtusa, integerrima, coriacea, dum recentia

sunt, colore obscure viridi, pallidiori, cum sicca sunt, sublucida, supra rugulosa, subtus venosa.

Propriet. Odor nullus. Sapor stypticus, subamarus, sed gratus.

VALERIANA.

VALERIANA,

Radix.

*Valeriana officinalis* L.

Locus. Habitat in locis humidis depressisque iuxta ac in editis, siccis, montanis Europae. Floret a Maio ad Iulium.

Perennis.

Forma. Radix est alba, cylindrica, nodis annulatis ciliatis referta, inferne in fibras filiformes, albas abit. Parenchyma radice est subcarnosum, album, medulla insigni margine undulata.

Propriet. Odor fragrans, sed ingratus et foetidus. Sapor subdulcis, amarus. In sicca radice uterque magis conspicuus est.

VERONICA.

VERONICA.

Herba.

*Veronica officinalis* L.

Locus. Habitat in terris incultis Europae. Floret Maio et Iunio.

Perennis.

Forma. Caulis est diffusus, teres, simplex, pilosus, nodis instructus, e quibus folia prodeunt sessilia, villosa, serrata, pallide-viridia, inferiora cuneata, superiora ovali-oblonga, obtusa, paullo maiora inferioribus, remotiora.

Propriet. Odor radice siccae nullus. Sapor subamarus, adstringens.

## VINUM ALBUM ET RUBRUM.

## VINHO BRANCO E TINTO.

**Forma.** Vinum est liquor aquosus, pellucidus, colore rubro aut albo, e musti fermentatione natus.

**Propriet.** Odor est fragrans, spirituosus: sapor subvellicans, dulcis aut acidulus. Solvit extracta, resinas et metalla nonnulla. Destillatum vix fervet vinum, largitur liquorem clarum, subopacum, lacteum et flagrantiae capacem, saporis ardentis et morsicantis, odoris fortis suavisque, qui *spiritus ardens* vulgo vocatur. Is autem magis minusve spirituosus est, pro ratione modi et qualitate vini, quod destillatur. Est autem vere compositus aqua, alcohole et pauxillo olei, quod ipsi, dum destillatur, pelluciditatem adimit, dein tingens eum colore flavo. Qui coloris eius expers est, quod maiorem alcoholis copiam habet, vocatur *spiritus vini fortior*. Vinum, quod superest in cucurbita, adempto alcohole omni, obscurum habet colorem saporemque acido-stypticum, crysallos continet multas tartareas, in particulas omnino secessit, neque restitui possunt priores qualitates, nisi alcohol addatur, quo orbatum est. Evaporatum id vinum, in extractum vertitur, e quo extrahitur, ope alcoholis, pars colorans, intacto tartaro. Haec tinctura evaporata ad siccitatem, reliquias habet flagrantiae capaces, aqua solubiles. Ex omnibus colligitur, vinum componi aqua, principiis alcoholis, tartari, pigmenti et aromatis, quod igne perit vel mutatur.



## VITRIOLUM ALBUM.

VITRIOLO BRANCO.

Sal neuter metallicus.

*Vitriolum album* L.*Zincum vitriolatum* Bergm.

**Locus.** Subinde occurrit nativum in crystallis capillaribus aut stalactitis, in Pannonia, aut pulveris in zinci fodinis, etiam in fontibus mineralibus solutum. Illud autem, quo vulgo utimur, est artificiale.

**Forma.** Vitriolum album est sal neuter metallicus, e connubio acidi vitriolici cum zinco ortus, obvius in massis grandibus conicis, qualibus saccharum depuratum venit. Crystallis constat rhomboideis, parvis, irregularibus, albis, quae cum formam solidam adeptae sunt, prismata constituunt tetraëdra, pyramidibus duabus tetraëdris terminata.

**Propriet.** Sapor est stypticus, nauseosus. Ad ignem perdit acidi partem: ad tubulum fusorium turget mox et fervet, dein quiescit, zinco formam metallicam recuperante, flammam dat splendidam, avolantibus floribus aut floccis albis. Solvitur in aquae copia, quae paullo superat duplum pondus: ex ea solutione ope alcalium et terrarum, pulvis albidus fundum petit, qui vera est *zinci calx*.

## VITRIOLUM COERULEUM.

VITRIOLO DE CO-

BRE s. CAPARROSA AZUL. Sal neuter metallicus.

*Vitriolum cyprinum* L.*Cyprum vitriolatum* Bergm.

**Locus.** Invenitur in fodinis cupri, crystallorum, stalactitis, pulveris forma, in aqua etiam so-



lutum, in Pannonia, Suecia, Hibernia etc. Id vero, quo vulgo utimur, est arte factum.

Forma. Vitriolum coeruleum est sal neuter metallicus, e connubio acidi vitriolici cum cupro ortus, crystallis rhomboideis, longiusculis, coeruleis obviis.

Propriet. Sapor est admodum stypticus, nauseosus. Frictus ad ferrum politum humidumque strias rubras relinquit. Ad ignem celeriter funditur, perdita aqua crystallis idonea, vertitur in pulverem albido-flavicantem, denique penitus secedit in elementa, cum ignis vis maxime aucta est. Ad tubulum fusorium statim tumescit cum strepitu et fervore, tunc quiescit, metallo saepe splendorem recuperante, praesertim in carbone, relictas scoriae informi, quae boracis adminiculo solvitur: haec enim substantia aptissima est ad connubium cum hoc metallo. Solvitur in quater tanto aquae: e qua solutione cuprum praecipitatur ope alcalium fixorum, forma pulveris coerulei, qui, postquam siccuerit, viridis fit; ope alcali volatilis pulvis exalbidus subcoeruleus fundum petit, qui siccescens colorem obscure coeruleum acquirit.

### VITRIOLUM VIRIDE.

VITRIOLO DE FERRO

I. CAPARROSA VERDE.

Sal neuter metallicus.

*Vitriolum Martis L.*

*Ferrum vitriolatum Bergman.*

Locus. Invenitur in metallifodinis et superficie terrae, variis formis: nempe, crystallis, stactite, filis sericeis, fragilibus; pulvere: massis subrotundis et solutum in aquis martialibus.

**Forma.** Vitriolum viride est sal neuter metallicus, e connubio acidi vitriolici cum ferro natus, obvius in crystallis aut prismatibus rhomboideis, pellucidis, smaragdinis.

**Propriet.** Sapor admodum stypticus. Ad aërem paullulum flavescit ferrugineque obtegitur. Igne lento aut ad solem fatiscit in pulverem flavidum, qui demum albescit. Sed ad fortiorem ignem perdit acidum rubrumque adipiscitur colorem. In dupla portione frigidae aquae solvitur: e qua solutione ferrum praecipitatur ope alcalium fixorum, forma pulveris albidi viridescentis; ope alcali volatilis in pulverem cinereo-viridem; ac ope substantiarum vegetabilium stypticarum in pulverem nigrum.

ZINCUM.

ZINCO.

Semimetallum.

*Zincum mineralisatum L.*

**Locus.** Invenitur variis formis, variaque indole, mox nativum, Cronstedtio teste, ad Schneeberg, et Bomareo in ducatu Limburgensi; in mineram opè acidi aërei et sulfuris reductum et in forma calcis. v. *Lapis calaminaris.*

**Forma.** Zincum est semimetallum albo-coeruleescens, splendens, maxime qua frangitur, laminis compositum aut facieculis imbricatis, quas interdum aciculae perforare videntur.

**Propriet.** Nullum habet odorem, nec saporem. Gravitas specifica fusi est 71,908. *Brissou.* Malleo pulsatum parumper mollitur, nequicquam vero panditur. Aëri expositum splendorem amittit:

ad ignem haud prius in calcem abit, quam fufum, fed obfcurius fit. In vafe claufo fufum fublimatur citra particularum feceffum; attamen aëris contactu in calcem fuperficies cineream vertitur. Aucto denique igne hactenus, ut zincum candefcat, accenditur fubito et flamma clara, coeruleo-viridi ardet, avolante calce floccis aut aciculis fubtiliffimis et candidiffimis, quibus nomen *florum zinci* aut *lanæ philofophicæ* impertitur: ea fubftantia demum igne fortiffimo mutatur in vitrum flavidum. Cum iis floccis alia fubftantia fublimatur, laminas conftituens aut tubulos cortici arborum fimiles; quæ ipfa eft metalli calx impura, *tutia* officinis dicta. Mediocriter durum eft et ponderofum, colore obfcurum, exterius inaequale, intus glabrum et flavicans. Nonnulla eft fubcoerulea, pro ratione admixti zinci metallici. Solvitur zincum in acido diluto vitrioli, fortiter effervefcens, calore, foetore et fumo flagrantiae capaci editis: haec folutio evaporata et in cryftallos verfa, appellatur *Vitriolum zinci* feu *album*. Pariter folvitur in acido nitrofo, fummo fervore, calore et fumo rubicundo: quæ folutio, protinus fubviridis et turbida, dein clarefcit et aquae ad inftar pellucida eft. In acido marino fervore minori folvitur, fed foetore et fumo flagrantiae capaci: folutio eft clara. In acido nitrofo-marino feu aqua regia folvitur cum fervore et aestu, folutione flava. In aceto vini parum folvitur, clara folutione. In fulfure nec folvitur, fed cum eo mifcetur. Cum nonnullis metallis iungitur, e quo connubio nafcitur orichalcum.

## ZINGIBER COMMUNE s. ALBUM.

GENGIBRE.

Radix.

*Amomum Zingiber* L.

**Locus.** Habitat in India orientali, praesertim in montibus circa Gengi, unde nomen duxisse videtur: crescit quoque in Malabaria, Ceylona, China; colitur in Antillis et Brasilia. Perennis.

**Forma.** Radix recens est tuberosa, nodosa, annulata, extus alba, cinerea aut flavicans, rugosa, ramosa, cuticula tenerrima vestita. Parenchyma est carnosum, flavum, quod transversim sectum aequale videtur, annulo centrali. Radicem siccam habemus in frustis longiusculis, ramosis aut furcatis, subcompressis, ovato-nodosis, cinereo-rubicundis, parenchymate albo, maculis flavidis consperso, nodis fragili, et fibroso, qua frangitur.

**Propriet.** Odor fragrans. Sapor vellicans, acris, aromaticus.

---

P A R S II.

DE

MEDICAMENTIS PRAEPARATIS

ET

COMPOSITIS.



THE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY OF THE  
NAVY  
WASHINGTON, D. C.  
JAN 10 1892

RECEIVED  
JAN 10 1892  
NAVY DEPT  
WASHINGTON

---

## ACETUM ANTISEPTICUM.

v. *Acetum aromaticum.*

## ACETUM AROMATICUM

℞ *Acetum quatuor latronum* ℞ *Acetum anti-septicum.*

℞ Summitatum Rorismarini,  
Foliorum Salviae, singulorum uncias quatuor,  
Florum Lavandulae uncias duas,  
Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas,  
Aceti vini librās octo.

Macerentur per quatrimum. Expressa coque, post  
cola per chartam emporeticam, servetur in vase  
clauso.

## ACETUM COLCHICI

fit eodem modo quo Acetum Lavandulae.

## ACETUM LAVANDULAE.

℞ Florum Lavandulae recens siccatorum libram  
unam,

Aceti communis libras sex.

Macerentur per sex dies, coquantur, addita  
Spiritus vini libra dimidia. M.

## ACETUM PLUMBI

℞ *Acetum Saturni* ℞ *Extractum Saturni*.

℞ Lithargyri uncias quatuor,

Aceti vini libras duas.

Ebulliant, donec superfit sesquilibra, in vase fictili, continuo agitando. Parum temporis quiescat, demum decantetur aut coquatur.

## ACETUM QUATUOR LATRONUM.

v. *Acetum aromaticum*.

## ACETUM ROSARUM

et RUTAE

eodem modo conficiuntur ac Acetum Lavandulae.

## ACETUM SAMBUCI

pariter.

## ACETUM SATURNI.

v. *Acetum Plumbi*.

## ACETUM SCILLITICUM

eodem modo conficitur ac Acetum Lavandulae.

## ACIDUM MARINUM ℞ MURIATICUM

℞ *Spiritus salis marini vel communis*.

℞ Salis communis pulverati libras duas,

Oléi vitrioli et

Aquae fontanae, singulorum libram unam.

Mixta sensim cauteque aqua cum oleo coniiciantur super salem cucurbitae vitreae aut fictili immissum. Applicato ad cucurbitam excipulo grandi tubulato, ut possit aperiri subinde, luto obductis iuncturis,

destilletur balneo Mariae, donec nullum acidum amplius egrediatur.

### ACIDUM NITROSUM

℥. *Spiritus nitri fumans.*

℞ Nitri pulverati libras tres,  
Olei vitrioli libram unam.

Nitro cucurbitae fictili aut vitreae immisso, sensim ac vaporibus curiose vitatis, addatur oleum vitrioli: dein destillatio continuatur ut Acidi marini.

### ACIDUM NITROSUM ALCOHOLISATUM

℥. *Spiritus nitri dulcis.*

℞ Acidi nitrosi libram unam,  
Alcoholis libras tres.

Alcoholi infuso in vas vitreum amplum, mersum in vas amplius aqua frigida plenum, adiungatur paulatim acidum, continua agitatione. Vas leviter obtectum quiescat loco frigidiusculo per sex aut octo dies. Tum totus liquor destilletur e cucurbita vitrea, balneo arenae, excipulo vitreo, frigore ope aquae frigidae aut nivis excitato.

### ACIDUM NITROSUM DILUTUM

℥. *Spiritus nitri tenuis* ℥. *Aqua fortis.*

℞ Acidi nitrosi et  
Aquae fontanae, singulorum partes aequales.  
Misceantur.

### ACIDUM VITRIOLI ALCOHOLISATUM

℥. *Spiritus vitrioli dulcis* ℥. *Liquor anodynus mineralis.*

℞ Olei vitrioli albi,

Alcoholis, singulorum libram unam.  
Acidum sensim alcoholi cucurbitae immisso instilletur, adiuncto excipulo tubulato, calore mediocri destilletur, donec vapores sulfurei apparuerint.

### ACIDUM VITRIOLI AROMATICUM

*℥. Elixir acidum vitrioli.*

℞ Alcoholis libras duas,

Olei vitrioli uncias sex.

Acidum sensim alcoholi instilletur: digeratur mixtio levissimo calore, in vase clauso, per triduum. Tum addantur

Cinnamomi subtilis sesquiuncia,

Radicis Zingiberis uncia una.

Digerantur eodem modo per sex dies, post colentur per chartam emporeticam.

### ACIDUM VITRIOLI DILUTUM

*℥. Spiritus vitrioli.*

℞ Olei vitrioli albi unciam dimidiam,

Aquae destillatae libras duas.

Misceantur.

### AETHER VITRIOLI.

℞ Acidi vitrioli alcoholisati libras duas,

Alcali vegetabilis probe siccati unciam unam.

Mixta destillentur leni calore ad uncias quatuordecim.

### AETHIOPS ANTIMONIALIS.

℞ Mercurii depurati sesquiunciam,

Sulfuris antimonii praecipitati unciam unam.



Triturentur in mortario vitreo, donec globuli mercurii evanuerint.

### AETHIOPS MINERALIS.

℞ Mercurii depurati,  
Sulfuris pulverati, singulorum unciam unam.  
Triturentur in mortario vitreo aut lapideo, donec globuli extincti fuerint.

### ALCALI AMMONIACUM AQUOSUM

f. *Spiritus salis ammoniaci.*

℞ Salis ammoniaci depurati,  
Alcali vegetabilis, singulorum libram unam,  
Aquae fontanae libras duas.  
Mixtis salibus et in cucurbita vitrea positis infundatur aqua ac destilletur balneo Mariae ad siccitatem.

### ALCALI AMMONIACUM VOLATILE

f. *Sal volatile salis ammoniaci.*

℞ Salis ammoniaci pulverati libram unam,  
Cretae praeparatae et pulveratae libras duas.  
Mixta sublimentur.

### ALCALI MINERALE VITRIOLATUM

f. *Sal catharticus* f. *Sal Glauberi.*

℞ Residui e destillato acido marino libras duas.  
Calcinetur in vase aperto, igne violento, donec superfluum acidum amissum fuerit: ebulliat parum-  
per in aquae libris duabus et dimidia, coquatur et  
in crystallos secedere iubeatur.

## ALCALI VEGETABILE

f. *Sal tartari.*

℞ Faecum vini aut Tartari crudi quantum libet.  
Calcinetur in crucibulo aut alio vase capaci et aperto, donec fumum spargere desierit et conversa sit massa in substantiam albam, aut saltem cineream. Solvatur in aquae fervidae quantitate sufficienti, coletur, evaporetur ad siccitatem et servetur in vase clauso.

## ALCALI VEGETABILE TARTARISATUM

f. *Tartarus solubilis* f. *Tartarus tartarizatus.*

℞ Alkali vegetabilis libram unam,

Aquae libras octo.

Solvatur sal in aqua bulliente, sensim addatur

Cremoris tartari subtiliter pulverati quantum sufficit ad saturationem.

Coletur et in crystallos abire iubeatur.

## ALCALI VEGETABILE CUM ACETO

f. *Terra foliata Tartari* f. *Tartarus regeneratus* f. *Sal diureticus.*

℞ Alkali vegetabilis libram unam,

Aceti vini libras quatuor aut quinque.

Ebulliant igne lento, in vase fictili vitrea substantia haud obducto, donec nascatur pellicula. Dum alcali excedere cognoscitur, addatur denuo acetum, donec saturetur. Tum liquor coletur, evaporetur ad siccitatem. Solutus in aqua denuo coletur, iterum ad siccitatem evaporetur, servetur denique in vase clauso.

## ALCALI VEGETABILE VITRIOLATUM

℞ *Tartarus vitriolatus* ℞ *Sal polychrestus*.

Olei vitrioli diluti cum aequali pondere aquae,  
quantum libet,

Alcali vegetabilis in dupla ponderis quantitate  
aquae soluti, quantum sufficit ad saturatio-  
nem.

Absoluto fervore in vase amplo vitreo, coletur per  
chartam et crysalli formentur.

## ALCALI VOLATILE FLUIDUM

℞ *Spiritus salis ammoniaci causticus*.

℞ Salis ammoniaci pulverati libram unam,  
Calcis extinctae libras tres.

Mixta invicem in mortario vitreo, statim mittantur  
in cucurbitam vitream aut fictilem, addita aquae  
communis libra una. Admoto excipulo amplo tu-  
bulato, probeque luto obducto, destilletur.

## ALCOHOL

℞ *Spiritus vini rectificatus*.

℞ Spiritus vini libras duodecim.

Destilletur igne miti tertia pars.

## ALUMEN USTUM.

In olla fictili aut ferrea collocatum ignescat, donec  
spongiosum fiat et spumam edere cesset.

## ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

v. *Calx antimonii*.

## ANTIMONIUM MURIATUM

ſ. *Causticum antimoniale* ſ. *Butyrum Antimonii*.

℞ Antimonii vitrificati pulverati libram unam,  
Salis communis probe ficcati libras duas.

Exacte mixta mittantur in cucurbitam vitream, sen-  
ſim addita

Olei vitrioli libra una.

Deſtilletur balneo arenae, excipulo idoneo, cu-  
rando ut fundatur id quod colligitur et coit in col-  
lo cucurbitae, admota pruna.

## ANTIMONIUM PRAEPARATUM.

℞ Antimonii crudi quantum libet.

Piſtum in mortario ferreo in pulverem vertatur  
Dein ſuper lapide laevigetur et in pollen ſubtiliſſi-  
mum mutetur, affuſa aquae copia ſufficiente. Huic  
pollini poteſt infundi aquae ingens copia, ut peni-  
tus eluatur, decantata dein aqua, ſiccatur et loco  
tepidō ſervatur.

## ANTIMONIUM TARTARISATUM

ſ. *Tartarus antimonialis* ſ. *Tartarus emeticus*  
ſ. *Tartarus ſtibiatus*.

℞ Antimonii vitrificati pulverati uncias quatuor,  
Cremoris Tartari libram unam,  
Aquae libras octo.

Ebulliant per quadrantem horae in vaſe apto, co-  
letur liquor calidus, evaporetur et in cryſtallos ab-  
ire iubeatur.

## ANTIMONIUM VITRIFICATUM

f. *Vitrum Antimonii.*

℞ Antimonii pulverati uncias quatuor.

Ponatur in vas fictile nec altum nec massa vitrea obductum ad ignem mitem, sensim auctum, continuo agitando spathula ferrea, nec in grumos coëat, donec vapores nulli vel visui vel olfactui obvii sint. Hac massa impletur olla ad duas et tribus partibus. Operculo probe clauso imposito ad ignem moderatum collocetur, qui sensim adeo auctetur, ut massa fundatur, fusa autem in lapidem frigidum coniicitur.

## AQUA ALUMINOSA

f. *Aqua styptica.*

℞ Aluminis,

Vitrioli albi, singulorum unciam dimidiam,

Aquae fontanae fervidae libras duas cum dimidia.

Solutio in vase vitreo facta coletur.

## AQUA CALCIS.

℞ Calcis vivae recentis libram unam,

Aquae fontanae libras octo.

Aqua paullatim infundatur: ebullitione finita, calce praecipitata, coletur et servetur in vasis clausis.

## AQUA CALCIS COMPOSITA.

℞ Ligni Sassafras rasi uncias duas,

Nucis moschatae pulveratae drachmas tres,

Radici Glycyrrhizae concisae unciam unam,

Aquae calcis libras quatuor.



Macerentur per nychthemeron in vase clauso, dein colentur.

### AQUA CALCIS CUM CHINA.

℞ Chinae pulveratae uncias duas,  
Calcis vivae unciam unam,  
Aquae calcis uncias duas cum dimidia.  
Triturata sedulo China cum calce, paullatim aqua additur. Macerata per nychthemeron coletur.

### AQUA CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi subtilis libram unam,  
Aquae fontanae libras duodecim.  
Macerata per nychthemeron destillentur octo duntaxat librae.

### AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

v. *Spiritus Cinnamomi.*

### AQUA CUPRI AMMONIACI

f. *Aqua sapphirina* f. *Vitrioli coerulea.*

℞ Aquae calcis libram unam,  
Salis ammoniaci drachmam unam,  
Aeruginis grana sex.

Mixta coquantur per nychthemeron.

### AQUA FLORUM AURANTIORUM.

℞ Petalorum floris Aurantium libras sex,  
Aquae fontanae quantum sufficit ad vitandum empyreuma.  
Destillentur octo librae.

AQUA FLORUM ROSARUM  
— SAMBUCI

simili modo parantur ac Aqua florum Aurantiorum.

## AQUA FORTIS.

v. *Acidum nitrosum dilutum.*

## AQUA HORDEI.

v. *Decoctum Hordei.*

## AQUA LAXATIVA.

v. *Infusum Sennae tartarifatum.*

## AQUA LUCAE.

v. *Spiritus Ammoniaci cum Succino.*

## AQUA MELISSAE.

v. *Spiritus Melissae compositus.*

AQUA MENTHAE CRISPAE ET PIPERITAE  
eodem modo conficiuntur ac Aqua florum Aurantiorum.

## AQUA PHAGADAENICA.

℞ Mercurii muriati scrupulum unum,  
Salis ammoniaci scrupulum dimidium,  
Aquae destillatae librâ unam.  
Misceantur.

## AQUA REGINAE HUNGARIAE.

— v. *Spiritus Rorismarini.*

## AQUA SAPPHIRINA.

v. *Aqua Cupri ammoniaci.*

## AQUA SATURNINA

f. *Aqua vegeto-mineralis.*

℞ Salis Plumbi unciam dimidiam,  
Aceti vini uncias quatuor,  
Aquae destillatae libras duas.  
Misceantur.

## AQUA STYPTICA.

v. *Aqua aluminis composita.*

## AQUA VEGETO-MINERALIS.

v. *Aqua saturnina.*

## AQUA VIENNENSIS

f. *Infusum Sennae tartarificatum.*

## AQUA VITRIOLI ALBA s. VITRIOLI ZINCI.

℞ Vitrioli Zinci drachmam unam,  
Aquae destillatae libram unam.  
Misceantur.

## AQUA VITRIOLICA COERULEA,

v. *Aqua Cupri ammoniaci.*

## BALSAMUM ANODYNUM.

v. *Linimentum Saponis cum Opio.*

## BALSAMUM ARCAEI.

v. *Unguentum Elemi.*

## BALSAMUM CATHOLICUM.

v. *Tinctura Benzoës composita.*

## BALSAMUM SAPONACEUM.

v. *Linimentum Saponis,*

## BALSAMUM TRAUMATICUM s. VULNERARIUM.

v. *Tinctura Benzoës composita.*

## BOLUS PRAEPARATUS.

v. *Antimonium praeparatum.*

## BUTYRUM ANTIMONII.

v. *Antimonium muriatum.*

## BUTYRUM CACAO.

v. *Oleum expressum Cacao.*

## CALOMELANOS

f. *Mercurius dulcis.*

℞ Mercurii muriati libram unam,  
Mercurii depurati uncias novem.

Trituratis in mortario vitreo adstillentur aliquot guttae aquae. Continuetur trituration, donec globuli mercurii exstinguantur: tunc sublimetur. Sublimatum trituretur denuo et repetatur sublimatio. Denique in pulverem redigatur, aqua tepida lavetur, donec saporem omnem amiserit, siccumque servetur.

## CALX ALBA MERCURII.

v. *Mercurius praecipitatus albus.*

## CALX ANTIMONII

f. *Antimonium diaphoreticum.*

℞ Antimonii crudi pulverati libram unam,  
Nitri pulverati libras tres.

Mixta paullatim immittantur ollae ante candenti.

Detonatione absoluta, per horam dimidiam ad ignem stet. Cum refrixerit massa, in pulverem vertatur et fervetur.

### CALX CINEREA MERCURII.

℞ Mercurii,

Acidi nitrosi diluti, singulorum libram unam. Misceatur, ut solvatur mercurius. Solutioni affundatur aquae destillatae libra una; denique conii-ciatur in superficiem alcali ammoniaci aquosi quantum sufficit, ut liquor insipidus fiat, praecipitata simul calce mercurii, lavanda demum aliquoties aqua destillata et siccanda.

### CALX MERCURII VITRIOLATA

ℓ. *Turbith minerale* ℓ. *Mercurius praecipitatus flavus.*

℞ Mercurii puri uncias quatuor,

Olei vitrioli uncias octo.

Destilletur balneo arenae e cucurbita vitrea, donec nihil superfit praeter calcem albam omnino siccam. Ea in pulverem subtilem conversa aqua tepida misceatur. Pulvis flavus statim praecipitatus, lavetur, donec saporem omnem amiserit et siccus fervetur.

### CALX ZINCI

ℓ. *Flores Zinci.*

Olla ampla in fornace duobus lateribus coctilibus ita imponatur, ut paullum inclinata orificium vertat ad os fornacis. Huic ollae immittitur zinci comminuti libra una atque ope ignis aucti fundi-



tur zincum, ut simul olla operta candeat. Tum aperitur ea: quo facto zincum edet flammam splendens, cum floccis levibus, albis, qui cochleari ferreo e superficie zinci et parietibus ollae demuntur: pergatur demendo eos, dum formantur, quod continget, donec consumtum fuerit zincum.

### CATAPLASMA CANTHARIDUM

f. *Vesicatoria* f. *Massa caustica*.

℞ Cantharidum pulveratarum,  
Farinae triticeae, singularum unciam dimidiam,  
Aceti vini quantum sufficit, ut e mixtis fiat cataplasma crudum.

### CATAPLASMA EMOLLIENS

f. *Cataplasma Medullae panis*.

### CATAPLASMA LINI CUM GALBANO

f. *Cataplasma maturativum*.

℞ Farinae Seminum Lini uncias quatuor,  
Galbani vitello ovi subacti unciam unam,  
Pulpae Ceparum sub cineribus calidis assarum unciam dimidiam,  
Olei communis quantum sufficit.  
Mixta contendantur, igneque lento in cataplasma mutantur.

### CATAPLASMA MATURATIVUM.

v. *Cataplasma seminum Lini cum Galbano*.

## CATAPLASMA MEDULLAE PANIS

f. *Cataplasma emolliens.*

℞ Medullae panis triticei lacte macerati, aut decocto simplici radicis Althaeae libram dimidiam,

Vitellos ovi tres,

Farinae Seminum Lini quantum sufficit.

Misceantur, fiat igne lento Cataplasma.

CATAPLASMA MEDULLAE PANIS CUM  
CICUTAf. *Cataplasma resolvens.*

℞ Medullae panis triticei uncias sex,  
Foliorum Cicutae pulveratorum uncias quatuor,  
Aquae fontanae sesquilibram.

Coquantur ad molem idoneam.

## CATAPLASMA RESOLVENS.

v. *Cataplasma Medullae panis cum Cicuta.*

## CATAPLASMA SINAPIS.

℞ Sinapis pulveratae,  
Medullae panis f. Fermenti, singulorum libram dimidiam,  
Aceti vini, quantum sufficit, ut mixta fiant Cataplasma.

## CATAPLASMA VESICATORIUM.

v. *Cataplasma Cantharidum.*

## CAUSTICUM ANTIMONIALE.

v. *Antimonium muriatum.*

## CAUSTICUM LUNARE.

v. *Nitrum Argenti.*

## CERATUM ALBUM.

v. *Ceratum Spermatis Ceti.*

## CERATUM CALAMINARIS.

℞ Lapidis calaminaris praeparati,  
Cerae flavae, singulorum libram dimidiam,  
Olei libram unam.

Fundatur oleum cum cera. Cum frigescere coeperit, addatur lapis calaminaris continua agitatione.

## CERATUM PLUMBI

℞ *Ceratum Saturni* ℞ *Pomatum Saturni.*

℞ Aceti plumbi uncias duas cum dimidia,  
Cerae albae uncias quatuor,  
Olei uncias novem.

Fundatur oleum cum cera. Cum frigescere coeperit, sensim affundatur acetum plumbi, agitando donec refrixerit.

## CERATUM PLUMBI CAMFORATUM

℞ *Ceratum Saturni camforatum.*

Cum Ceratum prius fere refrixerit, addantur Camforae in oleo subactae scrupuli duo.

## CERATUM PLUMBI CUM SAPONE

℞ *Ceratum Saturni cum Sapone.*

Cum cera in Cerato simplici fundi coeperit, addantur Saponis albi unciae tres.

## CERATUM SPERMATIS CETI

℞ *Ceratum album* ℞ *Unguentum Cerae*.

℞ Spermatis Ceti unciam dimidiam,

Cerae albae uncias duas,

Olei communis uncias quatuor.

Fusa refrigerant.

## CONCHAE OSTREARUM PRAEPARATAE.

v. *Antimonium praeparatum*.

## CONFECTIO CORDIALIS.

v. *Electuarium aromaticum*.

## CONFECTIO IAPONICA.

v. *Electuarium Catechu*.

## CONSERVA CORTICIS AURANTIORUM

eodem modo paratur ac Conserva Menthae.

## CONSERVA CYNOSBATI

## FISTULAE

eodem modo parantur ac Conserva Prunorum.

## CONSERVA MENTHAE.

Pinfantur folia Menthae caulibus orba et petiolis in mortario lapideo pistillo ligneo. Pasta facta traiciatur per cribrum et misceatur cum duplo pondere sacchari albi pulverati.

## CONSERVA OXALIDIS

eodem modo paratur ac Conserva Rosarum.

## CONSERVA PRUNORUM.

℞ Pulpa Prunorum libram unam,

Sacchari albi pulverati libras duas:  
Exacte misceantur.

### CONSERVA ROSARUM.

℞ Rosarum rubrarum petalorum pulveratorum  
uncias tres,

Aquae destillatae Rosarum uncias octo.

Macerentur per sex horas: dein adde, continua  
gitatione,

Sacchari albi pulverati sesquilibram.

### CONSERVA TAMARINDORUM

odem modo paratur ac Conserva Prunorum:

### CORALLIUM PRAEPARATUM.

v. *Antimonium praeparatum.*

### CREMOR AUT CRYSTALLI TARTARI.

Faecum vini aut Tartari crudi aqua tepida ali-  
quoties lavati; dein pulverati quantum libet.

bulliat cum aqua sufficiente ad solutionem, cole-  
tr, evaporetur, ut crystalli formentur.

### CROCUS FERRI.

v. *Ferrum praeparatum.*

### CUPRUM AMMONIACUM.

℞ Vitrioli cupri uncias duas,

Alcali ammoniaci volatilis uncias tres:

Terantur invicem in mortario vitreo, donec, fer-  
vre cessante, in massam abierint uniformem rubi-  
andam. Protinus in charta emporetica, dein



blando calore siccescat, servanda in vase vitreo embolo vitreo.

### DECOCTUM ALBUM.

v. *Decoctum Cornu Cervi.*

### DECOCTUM ALTHAEAE.

℞ Radicis Althaeae concisae uncias sex,

Aquae communis libras octo,

Radicis Glycyrrhizae rasae uncias duas.

Ebulliat Althaea, donec decoctum quatuor libras pendat. Ad finem additur Glycyrrhiza, dein refrigerescere iubeatur.

### DECOCTUM ANTIFEBRILE.

v. *Decoctum Chinae compositum.*

### DECOCTUM CATECHU.

℞ Catechu leviter pulverati drachmas duas,

Aquae fontanae uncias sexdecim.

Ebulliat, donec supersit libra una. Frigescent adde

Spiritus Cinnamomi uncias duas.

Misce.

### DECOCTUM CHINAE COMPOSITUM

f. *Decoctum antifebrile.*

℞ Chinae flavae pulveratae,

Serpentariae virginianae, singularum uncia dimidiam,

Aquae communis sesquilibram.

Ebulliat, donec supersit libra una. Vas clausum quiescat, donec refrigerit. Colato adde

Spiritus Cinnamomi uncias duas.

## DECOCTUM GUAIIACI COMPOSITUM

f. *Decoctum Lignorum.*

℞ Ligni Guaiaci rasi uncias tres,

Aquae fontanae libras sex.

Ebulliat, donec librae quatuor supersint. Ad finem addantur

Ligni Sassafras rasi uncia una,

Glycyrrhizae concisae unciae duae.

Digestioni committatur per duas horas, post coletur.

## DECOCTUM HORDEI

f. *Aqua Hordei.*

℞ Hordei aristis privati uncias tres,

Aquae fontanae libras quatuor.

Ebulliat, donec dimidia pars supersit. Coletur.

## DECOCTUM LIGNORUM.

v. *Decoctum Guaiaci compositum.*

## DECOCTUM SARSAPARILAE.

℞ Radicis Sarsaparilae concisae uncias sex,

Aquae communis libras decem.

Digeratur per duas horas. Educta radix comminuatur, coquatur eadem aqua, donec dimidia supersit pars, denique coletur.

## DECOCTUM SARSAPARILAE COMPOSITUM.

Addantur decocto simplici sub finem cōctionis

Corticis Mezerei uncia dimidia,

Glycyrrhizae rase unciae tres.

Digerantur denuo per horae spatium.

## ELECTUARIUM AROMATICUM

f. *Confectio cordialis.*

- ℞ Pulveris aromatici uncias quatuor,  
Conservae corticis Aurantiorum uncias sex,  
Syrupi corticis Aurantiorum quantum sufficit.  
M. f. electuarium.

## ELECTUARIUM CATECHU

f. *Confectio iaponica.*

- ℞ Catechu pulverati uncias quatuor,  
Kino pulverati uncias tres,  
Pulveris aromatici uncias duas,  
Opium in vino soluti sesquidrachmam,  
Syrupi communis mellei quantum sufficit ut  
mixta fiant electuarium.

## ELECTUARIUM FISTULAE.

- ℞ Pulpae Fistulae libram dimidiam,  
Mannae uncias duas,  
Pulpae Tamarindorum sesquiunciam,  
Syrupi communis uncias sex.

Misceatur mænna cum syrupo in mortario: bene  
subactis addantur pulpae. Evaporetur ad ignem  
blandum, donec idonea moles nascatur.

## ELECTUARIUM LENITIVUM.

v. *Electuarium Sennae.*

## ELECTUARIUM OPIATUM

f. *Theriaca.*

- ℞ Pulveris aromatici uncias sex,  
Radice Serpentariae virginianae pulveratae un-  
cias tres,

Opii in vino solati drachmas tres,  
Mellis despumati quantum sufficit. M.

### ELECTUARIUM SENNAE

℞ *Electuarium lenitivum.*

℞ Foliorum Sennae pulveratorum uncias octo,  
Seminum Anisi pulveratorum uncias quatuor,  
Pulpae Prunorum libras duas,  
Syrupi communis quantum sufficit. M.

### ELIXIR ACIDUM VITRIOLI.

v. *Acidum vitriolicum aromaticum.*

### ELIXIR GUAIACINUM VOLATILE.

v. *Tinctura Guaiaci ammoniacalis.*

### ELIXIR PAREGORICUM.

v. *Tinctura Opii camforata.*

### ELIXIR PROPRIETATIS.

v. *Tinctura Aloës composita.*

### ELIXIR SALUTIS.

v. *Tinctura Sennae composita.*

### ELIXIR STOMACHICUM.

v. *Tinctura Gentianae composita.*

### EMPLASTRUM ADHAESIVUM.

v. *Emplastrum commune cum resina.*

### EMPLASTRUM CANTHARIDUM

℞ *Emplastrum vesicatorium.*

℞ Cerae flavae libras duas,  
Resinae,

Axungiae porcinae, singularum libram unam,  
Olei uncias octo,  
Cantharidum subtiliter pulveratarum sesqui-  
libram.

Cantharidibus protinus oleo subactis addantur  
aliae species ad ignem lentum fusae, continua agi-  
tatione, donec frigescant.

### EMPLASTRUM CICUTAE.

℞ Aceti vini fortis uncias sexdecim,  
Gummi ammoniaci uncias octo.

Solutum gummi in aceto et colato per pannum laxo  
textum addatur

Succi Cicutae spissi libra una.

Evaporetur ad ignem blandum, continua agitatio-  
ne, donec acquirat idoneam molem.

### EMPLASTRUM COMMUNE

f. *diachylon minus.*

℞ Lithargyri pulverati libras quinque,  
Olei libras octo.

Cum Aquae quantitate sufficienti ebulliat, donec  
molem emplastri acquisiverit.

### EMPLASTRUM COMMUNE GUMMATUM

f. *diachylon gummatum.*

℞ Emplastri communis libras duas,  
Gummi ammoniaci colati uncias sex,  
Cerae flavae uncias tres.

Fundantur et misceantur ad ignem lentum.



## EMPLASTRUM COMMUNE CUM RESINA

*l. Emplastrum adhaesivum.*

℞ Emplastri communis libras tres,  
Resinae uncias sex.

Fundantur et misceantur ad ignem lentum.

## EMPLASTRUM DIACHYLON MINUS.

*v. Emplastrum commune.*

## EMPLASTRUM DIACHYLON GUMMATUM.

*v. Emplastrum commune gummatum.*

## EMPLASTRUM HYOSCYAMI

eodem modo paratur ac Emplastrum Cicutae.

## EMPLASTRUM LADANI

*l. Emplastrum stomachicum.*

℞ Ladani uncias tres,  
Turis unciam unam.

Liquatis lenissimo calore, remotis ab igne addantur

Olei Nucis moschatae expressi,

Balsami peruviani,

Cinnamomi optimi pulverati, singulorum uncia dimidia.

Probe misceantur. Emplastrum in vase clauso servetur.

## EMPLASTRUM MERCURIALE.

℞ Emplastri Cicutae uncias sexdecim,  
Mercurii Terebinthina exstincti unciam unam.  
Misceantur.

## EMPLASTRUM SAPONIS.

℞ Emplastri communis libram unam,  
Saponis albi uncias quatuor.

Liquefiant, misceantur igne leni.

## EMPLASTRUM STOMACHICUM.

v. *Emplastrum Ladani.*

## EMPLASTRUM VESICATORIUM.

v. *Emplastrum Cantharidum.*

## EMULSIO ARABICA.

℞ Emulsionis communis libram unam,  
Mucilaginis Gummi arabici sesquiunciam.  
Misceantur.

## EMULSIO CAMFORATA.

℞ Camforae cum Spiritus vini guttis aliquot tritae  
drachmam dimidiam,  
Mucilaginis gummi arabici drachmas tres,  
Emulsionis communis uncias octo.

Camfora prius cum mucilagine misceatur, dein  
emulsio affundatur.

## EMULSIO COMMUNIS

f. *Lac Amygdalarum.*

℞ Amygdalarum dulcium decorticatarum unciam  
unam,

Aquae fontanae libram unam,  
Sacchari albi unciam dimidiam.

Amygdalae cum saccharo probe pistae reducantur  
in pulvem, sensim affusa aqua, dein colentur, ex-  
primendo per colum.

## ESSENTIA ANTIMONIALIS HUXHAMI.

v. *Vinum Antimonii.*

## ESSENTIA ANTISEPTICA HUXHAMI.

v. *Tinctura Chinae composita.*

## EXTRACTUM ABSYNTHII

eodem modo paratur ac Extractum Glycyrrhizae.

## EXTRACTUM ACONITI.

v. *Succus spissus.*

## EXTRACTUM ARNICAE

eodem modo paratur ac Extractum Glycyrrhizae.

## EXTRACTUM CARDUI BENEDICTI

eodem modo paratur ac Extractum Glycyrrhizae.

## EXTRACTUM CATHARTICUM.

v. *Extractum Colocynthidum compositum.*

## EXTRACTUM CHINAE

eodem modo paratur ac Extractum Jalappae.

## EXTRACTUM CICUTAE.

v. *Succus spissus.*

## EXTRACTUM COLOCYNTHIDUM COMPOSITUM.

f. *Extractum catharticum.*

℞ Colocynthidum sine seminibus drachmas sex,  
Spiritus ardentis libram unam.

Digerantur in vase clauso per biduum: expressa  
colentur: additis

Aloës succotrinae pulveratae sesquiunciam,  
Scammonii pulverati unciam dimidiam.

Evaporetur, continuo pinfendo, ad idoneam mole-  
lem, sub finem adde

Seminum Cardamomi minoris pulveratorum  
drachmam unam.

### EXTRACTUM FUMARIAE.

v. *Succus spissus.*

### EXTRACTUM GENTIANAE

eodem modo paratur ac Extractum Glycyrrhizae.

### EXTRACTUM GLYCYRRHIZAE.

℞ Radicis Glycyrrhizae probe concisae libram  
unam,

Aquae communis libras sex.

Cocta, bene expressa coletur. Liquor quieti tra-  
detur, ut faeces fundum petant: decantatus eva-  
poretur in balneo Mariae ad idoneam spissitu-  
dinem.

### EXTRACTUM GUAIACI

eodem modo paratur ac Extractum Jalappae.

### EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI

eodem modo paratur ac Extractum Glycyrrhizae.

### EXTRACTUM HYOSCYAMI.

v. *Succus spissus.*

### EXTRACTUM JALAPPAE.

℞ Radicis Jalappae pulveratae libram unam,  
Alcoholis libras quatuor.



Digesta per quatrimum, liquor clarus effundatur. Residuum coquatur in aquae decem libris, donec supersint duae librae. Id decoctum coletur, evaporetur, tinctura destilletur, donec molem mellis acquirat. Tunc addatur liquor, evaporetur, agitatione continua, ad idoneam extracti durioris spissitudinem.

#### EXTRACTUM MARRUBII

eodem modo paratur ac Extractum Glycyrrhizae.

#### EXTRACTUM OPII GUMMOSUM.

℞ Opii pulverati quantum libet.

Trito in mortario lapideo, sensim aqua frigida affundatur, donec bene coloratus sit liquor. Quieti committitur, postquam fundum petierit, liquor effunditur, residuo iterum affunditur aqua frigida, liquore postea effuso, donec coloris sit expers. Mixti liquores omnes colantur, evaporantur ad idoneam spissitudinem.

#### EXTRACTUM QUASSIAE

eodem modo paratur ac Extractum Glycyrrhizae.

#### EXTRACTUM RHABARBARI

eodem modo paratur ac Extractum Jalappae.

#### EXTRACTUM SATURNI.

v. *Acetum plumbi.*

#### EXTRACTUM TARAXACI.

v. *Succus spissus.*

E radice eodem modo paratur ac Extractum Glycyrrhizae.



## EXTRACTUM THEBAICUM.

v. *Opium depuratum.*

## FERRUM AMMONIACALE

f. *Flores salis ammoniaci martiales.*

℞ Salis ammoniaci sicci pulverati uncias sexdecim,  
 Ferri limati a rubigine liberi unciam unam.

Mixta et trita immittantur lagenae sublimationi aptae ad dimidiam partem plenae, aut vasi fictili vitrea massa haud obducto, cui alterum obverso situ ita superponitur, ut iuncturae luto probe claudantur. Ignis adeo fortis accenditur, ut vasis fundus candescat. Post quinque sive sex horas flores sublimati invenientur. Pluma pennae separentur, servantur in vase clauso.

## FERRUM PRAEPARATUM

f. *Crocus ferri* f. *Rubigo.*

Ferrum limatum aëri expositum aqua humectetur, donec omne in rubiginem versum sit. Pistum cribretur et servetur.

## FERRUM TARTARISATUM

f. *Mars solubilis* f. *Tartarus martialis solubilis*

℞ Ferri limati a rubigine liberi libram unam,

CrySTALLORUM Tartari pulveratarum libras duas  
 Mixta cum aqua destillata in massam spissam reducuntur, quae in vase fictili amplo per octo dies aëri exponitur. Siccata dein in balneo arenae in pulverem subtilem vertatur et servetur.

## FERRUM VITRIOLATUM

f. *Sal martis* f. *Sal ferri* f. *Vitriolum ferri*.

℞ Ferri limati,

Olei vitrioli, singulorum uncias octo,

Aquae destillatae libras tres.

Mittantur in vas vitreum. Fervore finito, arenae calidae per aliquod tempus imponatur. Tum filtrata massa et evaporata crystalli concreſcent.

## FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

v. *Ferrum ammoniacale*.

## FLORES ZINCI.

v. *Calx zinci*.

## GELATINA CORNU CERVI.

℞ Cornu cervi rasi lavati unciam dimidiam,

Aquae fontanae libras septem.

Ebulliat igne leni in vase clauſo, donec guttulae aliquot extractae, poſtquam refrixerint, gelatinae molem oſtendant. Coletur, dum calet, addatur

Sacchari albi pulverati uncias duas,

Vini albi generoſi,

Succi Limoniorum acidi, ſingulorum unciam dimidiam.

## GELATINA LICHENIS ISLANDICI.

℞ Lichenis islandici uncias tres,

Aquae libras quatuor.

Ebulliat, donec dimidia pars ſuperſit, exprimentis coletur, evaporetur ad gelatinae molem.

## GELATINA SAGO.

℞ Sago pulverati drachmam unam,  
Aquae communis uncias octo.

Ebulliat ad ignem lenem, continua agitatione, ad idoneam molem, addatur sacchari q. s. ad gratum saporem.

## GELATINA SALEP

eodem modo paratur ac Gelatina Sago.

## GUMMI AMMONIACUM DEPURATUM.

℞ Gummi ammoniaci libras duas.

Missum in sacculum e panno laxo texto aqua fervida molliatur. Appendatur sacculus in vase fictili, ita ut fundum vasis haud attingat. Clausum vas per aliquod tempus balneo Mariae committitur, ut gummi liquefactum per colum traici possit, relictis sordibus.

Eodem modo depurantur et Gummi-resinae omnes.

## INFUSUM AMARUM.

v. *Infusum Gentianae compositum.*

## INFUSUM CHINAE FRIGIDUM.

℞ Chinae flavae pulveratae unciam unam,  
Aquae fontanae sesquibram.

Maceretur per nycthemeron in lagenâ, saepius agitando, dein coletur per chartam.

## INFUSUM GENTIANAE COMPOSITUM

s. *Infusum amarum.*

℞ Radicis Gentianae concisae unciam dimidiam,

Flavedinis corticis Aurantiorum drachmas duas,  
Aquae fervidae libram unam.

Digeratur per horae spatium, post liquor coletur.

### INFUSUM QUASSIAE FRIGIDUM

eodem modo paratur ac Infusum Chinae, Ligni  
Quassiae rasi drachmis tribus infusa aquae libra  
una.

### INFUSUM RHABARBARI.

℞ Rhabarbari pulverati unciam dimidiam,  
Aquae fervidae uncias octo.

Digeratur per horas duas: colato adde  
Spiritus Cinnamomi unciam unam.

### INFUSUM SENNAE SIMPLEX.

℞ Foliorum Sennae sesquiunciam,  
Anisi stellati obiter pulverati drachmam unam,  
Aquae fervidae uncias sexdecim.

Digerantur per horam unam in vase clauso, post-  
quam refrixerint, colentur.

### INFUSUM SENNAE TARTARISATUM

*℥. Aqua laxativa ℥. viennensis.*

℞ Foliorum Sennae drachmas tres,  
Cremoris Tartari pulverati drachmam unam,  
Anisi stellati pulverati drachmam dimidiam,  
Aquae fervidae uncias sex.

Digerantur per horam: colatis adde  
Mannae electae uncias duas.

Solutio ad lenem ignem facta defaecetur, iterum-  
que coletur.

## INFUSUM TAMARINDORUM COMPOSITUM.

℞ Pulpae Tamarindorum,  
Mannae electae, singularum sesquiunciam,  
Flavedinis Corticis Aurantiorum drachmas  
duas,

Aquae fervidae uncias octo.

Missa in lagenam, saepius agitetur, donec pulpa  
mannaque solutae sint, tunc coletur.

## IULAPIA.

v. *Mixturae.*

## KERMES MINERALE.

v. *Sulfur praecipitatum Antimonii.*

## LAC AMMONIACUM.

℞ Gummi ammoniaci depurati drachmas duas,  
Aquae destillatae libram dimidiam.

Exacte triturentur, donec gummi solutum sit.

## LAC AMYGDALARUM.

v. *Emulsio communis.*

## LAPIS CALAMINARIS PRAEPARATUS.

Eadem procedendi ratio, qua Antimonium praeparatur, calcinato protinus lapide.

## LAPIS INFERNALIS.

v. *Nitrum argenti.*

## LAPIS OPHTHALMICUS.

v. *Vitriolum camforatum.*

## LAUDANUM LIQUIDUM.

v. *Tinctura Opii.*



## LAUDANUM OPIATUM.

*v. Opium depuratum.*

## LINIMENTUM AMMONIACUM s. VOLATILE.

℞ Alkali ammoniaci aquosi unciam dimidiam,  
Olei communis sesquiunciam,  
Mixta in vase clauso saepius agitentur.

## LINIMENTUM ANODYNUM.

*v. Linimentum Saponis cum Opio.*

## LINIMENTUM CAMFORATUM.

℞ Camforae uncias duas,  
Alkali ammoniaci aquosi uncias sex,  
Spiritus Lavandulae uncias sexdecim.  
Mixtis alcali et spiritu, destillentur unciae sexdecim ad ignem lenem: in ea mixtura autem solvatur Camfora.

## LINIMENTUM OPIATUM.

*v. Linimentum Saponis cum opio.*

## LINIMENTUM SAPONIS

*ℓ. Linimentum saponaceum ℓ. Balsamum saponaceum.*

℞ Saponis albi uncias tres,  
Camforae unciam unam,  
Spiritus vini uncias sexdecim.

Maceretur sapo in spiritu vini, donec solutus sit: quo facto Camfora addatur.

## LINIMENTUM SAPONIS CUM OPIO

℞ *Linimentum anodynum* ℞ *Linimentum opiatum* ℞ *Balsamum anodynum*.

Fit, additis ad Linimentum saponis simplex drachmis sex Opii depurati, maceratisque simul cum sapone.

## LINIMENTUM VOLATILE.

℞ *Linimentum ammoniacum*.

## LIQUOR AMMONIACALIS CUM ACETO

℞ *Spiritus Mindereri*.

℞ Alkali ammoniaci volatilis unciam unam,  
Aceti vini quantum sufficit, ut saturetur alkali.

## LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

℞ *Acidum vitriolicum alcoholisatum*.

## LIQUOR MYRRHAE

℞ *Oleum Myrrhae per deliquium*.

℞ Myrrhae pulveratae drachmas duas,  
Hydromeli unciam dimidiam.

Exacte triturentur, ut fiat solutio.

## LIQUOR SALIS TARTARI.

℞ *Lixivium Alkali vegetabilis*.

## LIXIVIUM ALCALI VEGETABILIS

℞ *Liquor salis Tartari* ℞ *Oleum Tartari per deliquium*.

℞ Alkali vegetabilis unciam unam,  
Aquae destillatae uncias tres.

Solutum filtretur.

## LIXIVIUM CAUSTICUM.

v. *Lixivium Sodae crudae cum Calce.*

## LIXIVIUM SODAE CRUDAE CUM CALCE

f. *Lixivium causticum.*

℞ Calcis vivae libras duas,  
Sodae crudae libras quatuor,  
Aquae libras triginta duas.

Ferveant per aliquod tempus in vase fictili vitrea massa haud obducto. Colatus liquor per chartam emporeticam, iterum igni admotus evaporetur, donec eius uncia una cum tribus drachmis impleat vas capax unciae dimidiae aquae purae.

N. Omnia instrumenta, quibus utimur ad hanc praeparationem, haud metallica sunt, sed lignea, fictilia aut vitrea.

## MAGNESIA ALBA

f. *Magnesia Epsomensis.*

℞ Salis amari,

Alcali vegetabilis, singulorum libras duas.

Uterque sal solvatur seorsim in dupla aquae fervidae quantitate. Colati liquores misceantur, additis aquae fervidae libris sexdecim. Ebulliat etiamnum per aliquod tempus, agitando saepe spathula lignea. Remota ab igne quieti tradantur, donec calor decreverit. Coletur calida mixtio per pannum linteum: terra autem alba, in colo superstes, lavetur aqua calida, donec saporem omnem amiserit. Siccata servetur.

## MAGNESIA ALBA CALCINATA.

Magnesia ollae immissa ponitur ad ignem violentum, et per duas horas candens, post vero in clausis vasis vitreis servatur.

## MAGNESIA EPSOMENSIS.

v. *Magnesia alba.*

## MARS SOLUBILIS.

v. *Ferrum tartarifatum.*

## MASSA CAUSTICA.

v. *Cataplasma Cantharidum.*

## MEL ROSATUM.

℞ Petalorum siccorum Rosae rubrae libram dimidiam,

Aquae fervidae libras tres.

Macerata per duodecim horas colentur, adiunctis Mellis puri libris sex.

## MERCURIUS ACETATUS

℥. *Sal Mercurii acetosus.*

℞ Mercurii depurati libram unam;

Acidi nitrosi diluti libras duas.

Digeratur per nychthemeron lagenae vitreae immissum in balneo arenae. Calx mercurii praecipitetur opē lixivii alcali vegetabilis, quantum sufficit. Quod fundum petiit, lavetur aqua multa, siccetur ad calorem mediocrem. Quo facto

℞ Calcis huius Mercurii libram unam,

Aceti vini quantum sufficit ad solvendam calcem.



Solutio in vase vitreo facta coletur per chartam emporeticam. Evaporetur, donec pellicula appareat; et crystalli concrecant: quae separatae et siccatae in vase clauso servandae sunt.

### MERCURIUS DEPURATUS.

Mercurii quantum libet collocetur in cucurbita ferrea aut fictili, ad ventrem usque operienda in balneo arenae, rostro ultra dimidiam partem immerso in excipulum aqua plenum. Destilletur, donec nullus mercurius amplius exierit.

### MERCURIUS DULCIS.

v. *Calomelanos.*

### MERCURIUS MURIATUS

f. *Mercurius sublimatus corrosivus.*

℞ Mercurii depurati,

Olei vitrioli, singulorum libras duas.

Mixta in vase vitreo idoneo ac in balneo arenae effervescent, donec massa penitus siccuerit. Tum admisceatur Salis marini sicci pulverati libris tribus et dimidia in mortario vitreo. Ea mixtio immissa in lagenam sublimatoriam balneo arenae immersam, sublimetur, aucto sensim igne. Quod sublimatum est, separetur a scoriis et servetur.

### MERCURIUS MURIATUS PRAECIPITATUS.

℞ Mercurii depurati uncias octo, aut paullo plus,

Acidi nitrosi diluti uncias octo.

Misceantur in lagena collo alto, leviter clausa, vaporibus vitatis. Hora elapsa collocetur lagena in



balneo arenae, aucto sensim igne per quatuor horas, donec versus finem huius temporis ferveat leniter per horae quadrantem, agitando vas aliquoties per idem tempus. Tunc infundantur aquae fervidae librae octo, in quibus solutae sunt Salis marini unciae quatuor cum dimidia, quantocius omnia miscendo. Quieti committatur: postquam fundum petierit, affundatur liquor. Pulvis superstes iterum iterumque aqua eluatur fervida, ut demum saporem omnem amittat. Siccatus servetur.

Ut saturetur acidum penitus, expedit, mercurii paullo plus addere, quam sufficit ad acidum solvendum.

### MERCURIUS NITRATUS RUBER

f. *Praecipitatum rubrum* f. *Pulvis Ioannis* f. *Pulvis Ioannis de Vigo* f. *Pulvis Vigonis*.

℞ Mercurii depurati,  
Acidi Nitri, singulorum libram unam,  
Acidi muriatici drachmam unam.

Mixta in vase vitreo, ut mercurius solvatur, collocentur in balneo arenae. Ignis augeatur, donec crystalli concreverint, seu squamae ruberrimae micantes. Protinus ut is color apparuerit, remonentur ab igne, quoniam longior mora splendorem adimit, quo partim praestantia medicamenti aestimatur.

### MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS

f. *Calx alba Mercurii*.

℞ Mercurii muriati,  
Salis ammoniaci, singulorum libram dimidiam.

Solvatur protinus sal ammoniacus, dein mercurius muriatus in aquae destillatae quantum sufficit. Solutione absoluta, addatur Lixivii alcali vegetabilis, quantum poscitur, ut pulvis albus omnino fundum petat, qui aqua destillata elutus, donec saporem amiserit omnem, siccatus servetur.

**MERCURIUS PRAECIPITATUS FLAVUS.**

v. *Calx Mercurii vitriolata.*

**MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER.**

v. *Mercurius nitratus ruber.*

**MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.**

v. *Mercurius muriatus.*

**MERCURIUS SUBLIMATUS DULCIS.**

v. *Calomelanos.*

**MIXTURA CAMFORATA**

f. *Iulapium Camforae.*

℞ Camforae pulveratae ope guttularum aliquot

Alcoholis drachmam unam,

Mucilaginis Gummi arabici,

Sacchari puri singularum unciam dimidiam.

Probe triturtis adde

Aquae fervidae uncias sexdecim.

**MIXTURA CAMFORATA CUM ACETO.**

f. *Iulapium Camforae acetosum.*

Fit, addita mixturae praecedenti, aquae loco, eadem copia aceti vini.

## MIXTURA MERCURII GUMMOSA

℞ *Solutio Mercurii gummosa Plenckii.*

- ℞ Mercurii depurati drachmam unam,  
Mucilaginis Tragacanthae unciam dimidiam,  
Syrupi communis unciam unam,  
Aquae destillatae uncias octo.

Teratur mercurius cum mucilagine in mortario vi-  
treo aut lapideo, donec globuli evanuerint: post  
addatur syrupus, novissime aqua.

## MIXTURA MOSCHATA

℞ *Tulapium moschatum.*

- ℞ Moschi scrupulos duos,  
Sacchari albi,  
Gummi arabici pulverati, singulorum drach-  
mam unam,  
Aquae destillatae Rosarum uncias sex.

Teratur moschus cum saccharo, dein cum gummi,  
postremo sensim affundatur aqua.

## MIXTURA SALINA COMPOSITA

℞ *Mixtura salina Macbridii.*

- ℞ Succi Limoniorum acidorum unciam unam,  
Alcali vegetabilis quantum sufficit ad saturan-  
dum,  
Aquae Menthae uncias septem,  
Antimonii tartarifati granum unicum,  
Syrupi simplicis unciam dimidiam.

Misceantur.

## MIXTURA SALINA SIMPLEX.

- ℞ Alcali vegetabilis drachmam unam,

Succi Limoniorum acidorum quantum sufficit  
ad saturandum,  
Aquae fontanae uncias quinque,  
Syrupi simplicis unciam dimidiam.  
Misceantur.

## MUCILAGO CYDONIORUM.

℞ Seminum Cydoniorum drachmas duas,  
Aquae uncias sex.  
Ebulliant leniter, donec aqua viscida fuerit: tum  
coletur expressus per pannum linteum liquor.

## MUCILAGO GUMMI ARABICI.

℞ Gummi arabici pulverati uncias quatuor,  
Aquae fervidae uncias sex.  
Tritum coletur exprimendo.

## MUCILAGO TRAGACANTHAE.

℞ Tragacanthae pulveratae unciam unam.  
Maceretur per nychthemeron in Aquae unciis octo.  
Probe tritурата coletur, per pannum laxę textum  
fortiter exprimendo.

## NITRUM ARGENTI

ℓ. *Causticum lunare* ℓ. *Lapis infernalis*.  
℞ Argenti puri limati uncias quatuor,  
Acidi nitrosi diluti uncias octo,  
Aquae destillatae uncias quatuor.  
Solvatur in lagena, igne leni. Evaporetur in vase  
ad id apto ad siccitatem. Sicca substantia funda-  
tur in olla, fusa in formas ferreas calidas seboque



unctas effundatur: dein servetur in vasis vitreis probe clausis.

### NITRUM DEPURATUM.

℞ Nitri vulgaris libras duas.

Solvatur in Aquae quantum sufficit, coletur, ut crystalli concrevant.

N. Eodem modo et alii sales neutri depurantur.

### OLEUM AMYGDALARUM.

Sumatur Amygdalarum haud tostiarum quantum libet: fricentur intra pannum asperum, ut pulvis ruber secedat. Pinsantur in mortario ferreo aut lapideo, puls mittatur in pannum textu valido, quo facto torculari frigidae exprimantur.

### OLEUM BACCARUM IUNIPERI.

v. *Oleum Cinnamomi.*

### OLEUM BACCARUM LAURI.

v. *Oleum spissatum Cacao.*

### OLEUM CACAO SPISSATUM.

s. *Butyrum Cacao.*

Torreantur nuclei Cacao tot, quot lubet, ut cortices facilius secedant. Pinsantur nuclei in mortario ferreo, pistillo ferreo, calido utroque, ut in pulvem convertantur aut pastam. Ferveat haec per dimidiam horam in octupla ponderis portione aquae: postquam refrixerit, cochleari detrahatur substantia oleosa innatans. Residuum iterum iterumque



ebulliat cum aqua recenti, oleumque innatans simili modo separetur.

Ut oleum depuretur et ab omni humore adiuncto liberetur, in balneo Mariae liquefactum coletur effundendum in lagenam elongatam angustamque, immerfam aquae fere fervidae, ut oleum per aliquod tempus liquidum sinat sordes et humorem fundum petere. Postquam refrixit, lagena frangatur, oleumque spissatum, separatum a residuo fervetur.

Eodem modo, licet omittatur tostio, *Oleum baccarum Lauri* paratur.

#### OLEUM CAMFORATUM.

℞ Olei vulgaris uncias duas,  
Camforae unciam dimidiam,  
Trita misceantur.

#### OLEUM CARYOPHYLLORUM

eodem modo paratur ac

#### OLEUM CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi optimi pulverati libras duas,  
Aquae fontanae quantum sufficit, ut Cinnamomum possit in ea natare.

Maceretur per nychthemeron, destilletur, donec nullum oleum amplius eliciatur, quod idoneo modo separatur.

#### OLEUM LAVANDULAE

eodem modo paratur ac *Oleum Cinnamomi*.

## OLEUM LINI.

℞ *Seminum Lini* libras duas.

Pinsantur in mortario lapideo, ut in pulvem abeant. Haec pandatur super cribrum, crucibulo magno obtectum, quod imponatur vasi aequae amplo, aqua fervida semiplenum, quae per quadrantem horae eo caloris gradu fervetur, ut puls bene mollescat. Haec panno obvoluta inter duas laminas ferreas mediocriter calidas ponatur, ut oleum exprimatur.

## OLEUM MENTHAE

eodem modo paratur ac *Oleum Cinnamomi*.

## OLEUM MYRRHAE PER DELIQUIUM.

v. *Liquor Myrrhae*.

## OLEUM NUCIS MOSCHATAE

eodem modo conficitur ac *Oleum Lini*, nisi quod *Nux* radatur, priusquam pinsitur.

## OLEUM RICINI

eodem modo paratur ac *Oleum Amygdalarum*, cortice exteriori seminum prius detracto, ut cuticula alba parenchymati proxima sola supersit.

## OLEUM SUCCINI.

℞ *Succini* pulverati,

*Arenae* purae et probe elutae partes aequales.

Mixta mittantur in cucurbitam vitream, quae ad medium ventrem impleatur. Admoto excipulo amplo, destilletur balneo arenae, aucto paullatim igne, initio leni. Protinus destilletur liquor acidus,

dein oleum, postremo sublimetur sal oleo tinctus.  
Et oleum et sal seorsim eliciantur.

### OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

℞ Olei Succini libram unam.

Ter destilletur.

### OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

v. *Lixivium Alkali vegetabilis.*

### OLEUM TEREBINTHINAE

ℓ. *Spiritus Terebinthinae.*

℞ Terebinthinae electae libras quinque,  
Aquae libras sex.

Destilletur: postquam refrixerit, oleum separetur.

### OPIUM DEPURATUM

ℓ. *Extractum Thebaicum* ℓ. *Laudanum opiatum.*

℞ Opii concisi et comminuti libram unam,  
Spiritus vini libras duodecim.

Digeratur in vase clauso ad ignem lenem, succusso vase saepius, ut opium solutum servetur. Coletur per chartam emporeticam, tinctura destilletur ad idoneam extracti molem.

N. Opium depuratum partim durum esse debet, pulveratuque facile, partim mollius, ut pilulae parari possint.

### OXYMEL AERUGINIS

ℓ. *Unguentum aegyptiacum.*

℞ Aeruginis pulveratae unciam unam,  
Aceti vini uncias septem.

Soluta per pannum colentur, dein additis

Mellis despumati unciiis quatuordecim,  
ferveant ad idoneam molem.

### OXYMEL SCILLITICUM.

℞ Aceti scillitici libras duas,  
Mellis despumati libras tres.

Coquantur in vase apto ad syrupi molem.

### OXYMEL SIMPLEX.

℞ Mellis despumati libras duas,  
Aceti vini libram unam.

Ebulliant in vase apto ad idoneam molem.

### PILULAE AETHIOPICAE.

℞ Aethiopis antimonialis unciam unam,  
Extracti Guaiaci pulverati unciam dimidiam.  
Cum Mellis q. s. formetur Massa pilularum.

### PILULAE ALOËTICAE.

℞ Aloës succotrinae pulveratae unciam unam,  
Extracti Gentianae unciam dimidiam,  
Saponis hispanici drachmas duas.

Teratur protinus Aloë cum Sapone: addatur dein  
extractum, tunc cum Syrupi simplicis q. s. forme-  
tur Massa pilularum.

### PILULAE ALTERANTES PLUMERII

*s. Pilulae Calomelanos' antimoniales.*

℞ Calomelanos,  
Sulfuris praecipitati Antimonii, singulorum  
drachmas sex,  
Extracti Glycyrrhizae unciam dimidiam.

Sulfur et Calomelanos triturentur diu in mortario vitreo vel lapideo, donec pulvis evadat subtilissimus. Tunc extracto adiuncto contundatur hactenus, ut pulvis aequaliter distribuatur. Tum ope Mucilaginis Gummi arabici q. f. fiat Massa pilularum.

### PILULAE COCCHII

sunt Extractum Colocynthidum compositum, quod in pilulas formatur, dum poscuntur.

### PILULAE COERULEAE.

v. *Pilulae Cupri ammoniaci.*

### PILULAE COMMUNES

f. *Pilulae Ruffi.*

℞ Aloës succotrinae uncias duas,

Myrrhae,

Croci, singulorum unciam unam.

Pulverata omnia misceantur, et cum Syrupi simplicis q. f. formetur Massa pilularum.

### PILULAE CUPRI AMMONIACI

f. *Pilulae coeruleae.*

℞ Cupri ammoniaci grana sexdecim,

Medullae panis scrupulos quatuor,

Alcali ammoniaci aquosi quantum sufficit, ut

fiat Massa, in triginta duas pilulas aequales dividenda.

### PILULAE FERRI COMPOSITAE.

℞ Ferri praeparati unciam unam,

Myrrhae pulveratae unciam dimidiam,

Pulveris aromatici drachmas duas.



Misceantur, et cum Syrupi communis q. s. formetur Massa pilularum.

### PILULAE GUMMOSAE.

℞ Aſae foetidae,  
Galbani,  
Myrrhae, ſingulorum unciam unam.

Misceantur et cum Syrupo ſimplici formetur Massa pilularum.

### PILULAE MERCURIALES.

℞ Mercurii depurati,  
Extracti mollis Glycyrrhizae, ſingulorum drachmas duas.

Triturentur, donec globuli extincti fuerint: quo facto addatur

Glycyrrhizae pulveratae drachma una.

Formetur massa.

### PILULAE MERCURII MURIATI s. SUBLIMATI CORROSIVI.

℞ Mercurii muriati,  
Salis ammoniaci depurati, ſingulorum ſcrupulum unum,

Aquae deſtillatae quantum ſufficit, ut ſales ſolvantur,

Radiciſ Althaeae pulveratae ſcrupulos ſedecim,  
Mellis drachmas duas.

Miſce, ſiant pilulae, ponderis granorum trium.

### PILULAE RUFFI.

v. *Pilulae communes.*

## PILULAE SCILLITICAE.

℞ Scillae maritimae subtiliter pulveratae,  
Gummi ammoniaci,  
Cardamomi minoris pulverati, singulorum un-  
ciam dimidiam.

Misce, fiat cum Syrupi simplicis q. s. Massa pilula-  
rum.

## PILULAE SUBLIMATI CORROSIVI.

v. *Pilulae Mercurii muriati.*

## POMATUM ALBISSIMUM.

℞ Cerae albae,  
Spermatis Ceti, singulorum drachmam dimi-  
diam,

Olei Amygdalarum dulcium unciam unam.

Liquefiant in vase fictili vitrea massa obducto, at-  
que in balneo Mariae aut cineribus calidis: liqua-  
ta infundantur mortario lapideo, agitando conti-  
nuo ope pistilli lignei, ut grumi omnes evanescant.  
Bene subactis adde

Aquae destillatae Rosarum drachmas sex,  
otumque trituretur assiduo tantisper, donec spe-  
ciem cremoris lactis ferat.

## POMATUM MERCURIALE.

v. *Unguentum mercuriale.*

## POMATUM SATURNI.

v. *Ceratum Saturni.*

## PRAECIPITATUM ALBUM.

v. *Mercurius praecipitatus albus.*

## PRAECIPITATUM FLAVUM.

v. *Calx Mercurii vitriolata.*

## PRAECIPITATUM RUBRUM.

v. *Mercurius nitratus ruber.*

## PULPA FISTULAE

eodem more conficitur ac Pulpa Prunorum, pulsatis prius leguminibus ad futuram, ut eo melius semina et pulpa eximantur. Soluta haec in aqua feruida coletur et evaporetur.

## PULPA PRUNORUM.

℞ Prunorum siccatorum quantum libet.

Ebulliant aqua, donec ferbuerint. Nuclei extracti comminuti traiciantur per cribrum capillaceum, iterumque hoc fiat. Evaporetur balneo Mariae, ad molem mellis.

## PULPA TAMARINDORUM

eodem modo paratur.

## PULVIS ALUMINIS CUM KINO

ℓ. *Pulvis stypticus.*

℞ Aluminis crudi sesquiunciam,

Kino drachmas tres.

Mixta exacte triturentur.

## PULVIS ANTIMONIALIS

ℓ. *Pulvis Jamesii.*

℞ Antimonii obiter pulverati,

Cornu Cervi rasi singulorum libras duas.

Mixta ponantur in vas amplum ferreum, candens

continuo agitentur, donec acquirant colorem cinereo-fuscum. Postquam refrikerit massa pulveretur ac coniiciatur in ollam opertam alia olla in-versa eiusdem ambitus, in cuius fundo foramen parvum sit, utriusque iuncturae probe luto obducantur. Igni admota, is hactenus sensim augeatur, ut utraque olla candescat, quo gradu ignis servetur per horas duas. Materia frigefacta in pulverem subtilem vertatur.

N. Pulvis curiose paratus, est albus.

#### PULVIS ARI COMPOSITUS.

℞ Radicis Ari recens siccatae drachmas duas,  
 — Calami aromatici drachmas tres,  
 Alkali vegetabilis vitriolati scrupulum unum:  
 Pulverata et trita misceantur.

#### PULVIS AROMATICUS.

℞ Pichurim,  
 Seminum Cardamomi minoris, singulorum un-  
 ciam unam,  
 Cinnamomi electi unciam dimidiam:  
 Pulverata misceantur.

#### PULVIS CERUSSAE COMPOSITUS.

ℓ. *Trochisci albi Rhazis.*

℞ Cerussae uncias quinque,  
 Tragacanthae uncias duas cum dimidia:  
 Pulverata misceantur.

#### PULVIS CORNACCHINI.

v. *Pulvis Scammonii compositus.*

## PULVIS DOVERI.

v. *Pulvis Ipecacuanhae cum Opio.*

## PULVIS JAMESII.

v. *Pulvis antimonialis.*

## PULVIS IOANNIS DE VIGO.

v. *Mercurius nitratus ruber.*

## PULVIS IPECACUANHAE CUM OPIO

f. *Pulvis Doveri f. sudoriferus.*

℞ Ipecacuanhae,

Opium puri duri singulorum drachmam unam,

Alcali vegetabilis vitriolati unciam unam.

Pulverata seorsim, misceantur, curiosissima terantur.

## PULVIS MYRRHAE COMPOSITUS

f. *Trochisci de Myrrha.*

℞ Myrrhae,

Sabinae,

Resinae siccarum,

Castorei, singulorum unciam unam.

Pulverata misceantur.

## PULVIS SCAMMONII COMPOSITUS

f. *Pulvis Cornacchini reformatus.*

℞ Scammonii,

CrySTALLORUM Tartari, singulorum uncias duas.

Mixta curiose triturentur.

## PULVIS STYPTICUS.

v. *Pulvis Aluminis cum Kino.*



## PULVIS SUDORIFERUS.

v. *Pulvis Ipecacuanhae cum Opio.*

## PULVIS TRAGACANTHAE COMPOSITUS.

℞ Tragacanthae,  
Gummi arabici,  
Amyli, singulorum sesquiunciam,  
Sacchari albi uncias tres.

Pulverata mixta triturentur.

## PULVIS VIGONIS.

v. *Mercurius nitratus ruber.*

## RESINA IALAPPAE.

℞ Radicis Ialappae pulveratae libram unam,  
Alcoholis quantum sufficit, ut pulvis obtegatur,  
Maceretur per triduum in lagenâ clausâ. Coletur  
per chartam, in residuum denuo stilletur Alcohol,  
maceretur et coletur: repetatur tantisper, dum Al-  
cohol tingitur. Tincturae mixtae destillentur, do-  
nec dimidia pars superfuerit. Residuo aqua frigi-  
da affunditur, ut resina praecipitetur, quae siccata  
servetur.

## RHABARBARUM TOSTUM.

Radix Rhabarbari pulverata in vase fictili, vitrea  
massa haud obducto, amplo et plano, aut super la-  
minam ferream torreatur ad ignem lenem, conti-  
nuo agitando, donec colorem fuscum adipiscatur.

## ROOB MORORUM.

℞ Succi Mororum quantum libet.  
Evaporetur ad ignem lenem in vase fictili, vitrea

massa haud obducto, donec in molem mellis abierit.

SACCHARUM SATURNI.

v. *Sal Plumbi.*

SAL AMMONIACUS DEPURATUS.

v. *Nitrum depuratum.*

SAL CATHARTICUS.

v. *Alcali minerale vitriolatum.*

SAL DIURETICUS.

v. *Alcali vegetabile cum aceto.*

SAL FERRI.

v. *Ferrum vitriolatum.*

SAL FERRI TARTARISATUS.

v. *Ferrum tartarifatum.*

SAL GLAUBERI.

v. *Alcali minerale vitriolatum.*

SAL MARTIS.

v. *Ferrum vitriolatum.*

SAL MERCURII ACETOSI.

v. *Mercurius acetatus.*

SAL PLUMBI

f. *Sal Saturni* f. *Saccharum Saturni.*

℞ Cerussae libram unam,

Aceti vini destillati libras quindecim.

Ebulliat, donec acetum dulcescat. Colatum, evaporatum quieti tradatur, ut crystalli formentur.

### SAL POLYCHRESTUS.

v. *Alcali vegetabile vitriolatum.*

### SAL SATURNI.

v. *Sal Plumbi.*

### SAL SUCCINI.

v. *Oleum Succini.*

### SAL TARTARI.

v. *Alcali vegetabile.*

### SAL VOLATILE SALIS AMMONIACI.

v. *Alcali ammoniacum volatile.*

### SAPO ACIDUS.

R $\acute{x}$  Olei puri uncias quatuor,

Olei vitrioli uncias duas cum dimidia.

Oleo prius in mortarium vitreum infuso superstillatur paullatim acidum: cessando parumper post singula stillicidia, continuo agitur ope pistilli vitrei. Mixtione absoluta stet in digestionem per nycthemeron, ut connubium eo arctius fiat.

N. Acidi excessus moderandus aut prohibendus est duplici modo: 1. saponem ad aërem humidum collocato, ut acidum solvatur in liquore limido, in saponis superficie natante; 2. aut aqua destillata fervente in saponem coniecta, ut hic liquefactus superficiem aquae petat. Tunc liquor fri-

gefactus decantatur. Quodsi forte etiamnum acidum liberum superfuerit, repetitur ea operatio.

### SAPO ALCALINUS s. HISPANICUS.

℞ Lixiyi Sodae crudae cum calce libram unam,  
Olei Olivarum vel Amygdalarum libras duas.  
Mixta in vase apto agitentur spatula lignea, donec albescat mixtio. Quieti committitur per octo dies, ut arctissime iungantur.

### SEBUM PRAEPARATUM.

Sebum concisum ad ignem lenem liquefiat, tum coletur, ut pelliculae secedant.

N. Eodem modo depurantur alii adipēs aut axungiae animales.

### SERUM LACTIS ALUMINOSUM.

℞ Lactis caprini aut vaccini libras duas,  
Aluminis crudi pulverati unciam dimidiam.  
Ebulliat, ut lac coaguletur, tum coletur.

### SERUM LACTIS CLARIFICATUM.

℞ Lactis caprini aut vaccini libras duas.  
In vase argenteo aut fictili, massa vitrea haud obducto, calefiat in cineribus calidis. Addantur dein coaguli vitellini grana octodecim soluta in aquae unciis duabus. Spatula eburnea agitentur, ut bene misceantur. Cum lac coagulatum fuerit, coletur: cuius liquoris colati unciis quatuor, postquam refrixerint, addatur

Cremoris Tartari grana quindecim,  
Albumen ovi unius.

Probe agitata admisceantur residuo, omne autem ebulliat, donec limpidus fuerit liquor, post coletur per pannum.

### SERUM LACTIS CUM SINAPI.

℞ Lactis caprini aut vaccini libras duas,  
Semen Sinapis pistorum unciam unam.  
Ebulliat, donec coïverit, tum coletur.

### SERUM LACTIS VINOSUM.

℞ Seri lactis clarificati libras duas,  
Vini albi generosi libram dimidiam.  
Misceantur.

### SOLUTIO MERCURII GUMMOSA.

v. *Mixtura.*

### SPIRITUS AMMONIACI COMPOSITUS

f. *Spiritus volatilis aromaticus* f. *Spiritus oleosus aromaticus Sylvii.*

℞ Alkali volatilis fluidi libras duas,  
Olei essentialis corticis Limoniorum,  
— nucis moschatae, singulorum  
drachmas duas.

Misceantur.

### SPIRITUS AMMONIACI CUM SUCCINO

f. *Aqua Lucae.*

℞ Alcoholis unciam unam,  
Alkali volatilis fluidi uncias quatuor,  
Olei Succini rectificati scrupulum unum,  
Saponis hispanici duri grana decem.



Macerentur et sapo et oleum in alcohole, donec soluta sint. Tum alcali addatur, misceantur agitata in vase clauso.

### SPIRITUS CINNAMOMI

f. *Aqua Cinnamomi spirituosæ.*

℞ Cinnamomi optimi concisi libram unam,  
Aquæ ardentis libras decem.

Maceretur per biduum in vase clauso, addantur aquæ fontanae librae quatuor, destillentur librae decem.

### SPIRITUS COCHLEARIAE.

℞ Foliorum recentium Cochleariae libras sex,  
Alcoholis libras tres.

Maceretur per duodecim horas, destillentur librae tres.

### SPIRITUS LAVANDULAE.

℞ Summitatum floridarum Lavandulae sesquibram,

Spiritus vini aquosi libras decem.

Maceretur per duodecim horas, destillentur librae quinque.

### SPIRITUS LAVANDULAE COMPOSITUS.

v. *Tinctura Lavandulae composita.*

### SPIRITUS MELISSAE

eodem modo paratur ac Spiritus Lavandulae.

SPIRITUS MELISSAE COMPOSITUS

f. *Aqua Melissae.*

℞ Foliorum recentium Melissae libras duas,  
Flavedinis corticis Limoniorum uncias quatuor,  
Cinnamomi electi pulverati uncias duas,  
Nucis moschatae rasae unciam unam,  
Caryophyllorum aromaticorum pistorum drach-  
mas duas,  
Spiritus vini libras decem.  
Macerentur in vase clauso per triduum, tum desil-  
lentur librae quinque.

SPIRITUS FOLIORUM SICCORUM MENTHAE  
CRISPAE ET PIPERITAE

eodem modo paratur ac Spiritus Lavandulae.

SPIRITUS MINDERERI.

v. *Liquor ammoniacalis cum Aceto vini.*

SPIRITUS NITRI DULCIS.

v. *Acidum nitrosum alcoholisatum.*

SPIRITUS NITRI FUMANS.

v. *Acidum nitrosum.*

SPIRITUS NITRI TENUIS.

v. *Acidum nitrosum dilutum.*

SPIRITUS OLEOSUS AROMATICUS.

v. *Spiritus Ammoniaci compositus.*

## SPIRITUS RORISMARINI

f. *Aquae Reginae Hungariae.*

℞ Summitatum florentium Rorismarini libras duas  
et dimidiam,

Spiritus vini aquosi libras decem.

Macerentur per duodecim horas, tum destillentur  
librae quinque.

## SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

v. *Alcali ammoniacum aquosum.*

## SPIRITUS SALIS AMMONIACI CAUSTICI.

v. *Alcali volatile fluidum.*

## SPIRITUS SALIS MARINI.

v. *Acidum marinum.*

## SPIRITUS TEREBINTHINAE.

v. *Oleum Terebinthinae.*

## SPIRITUS VINI CAMFORATI.

℞ Camforae unciam unam,

Spiritus vini libram unam,

Mixa triturentur, donec solvatur Camfora.

N. Maior copia solvatur, si expedire videtur.

## SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

v. *Alcohol.*

## SPIRITUS VITRIOLI.

v. *Acidum Vitrioli dilutum.*

## SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

v. *Acidum Vitrioli alcoholisatum.*

## SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS.

v. *Spiritus Ammoniaci compositus.*

## SPONGIA CALCINATA s. USTA.

A fordibus pura et concisa comburatur in vase ferreo clauso, donec nigra fiat et fragilis: tum pulverata fervetur.

## SPONGIA CERATA s. PRAEPARATA.

Spongia eluta et a lapillis concharumque frustulis purgata concidatur in ligulas planas trium aut quatuor linearum crassitie. Mergeantur in ceram albam aut flavam liquidam, tunc torculari supponantur, donec cera refrikerint, eoque modo servantur.

## SUCCUS ACONITI SPISSATUS

eodem modo paratur, quo Succus Fumariae.

## SUCCUS CICUTAE SPISSATUS

f. *Extractum Cicutae Störckii.*

℞ Succi foliorum Cicutae quantum libet.

Evaporetur igne leni ad mellis molem. Refrigerato addatur, continua agitatione, foliorum eiusdem plantae pulveratorum quinta ponderis succi pars. Caveatur, ne evaporatio ulterius procedat, quam ut pars supersit, quoniam pulveris copia congruere debet.

## SUCCUS COCHLEARIAE COMPOSITUS.

f. *Succus antiscorbuticus.*

℞ Succi Cochleariae,

- Nasturtii aquatici, singulorum libras duas,
- Aurantiorum acidorum uncias viginti.

Misceantur, ut faeces fundum petant. Liquor tum decantetur et coletur.

### SUCCUS FUMARIAE SPISSATUS

℥. *Extractum Fumariae.*

℞ Succi Fumariae recens expressi quantum libet.  
Evaporetur in balneo Mariae ad idoneam molem.

### SUCCUS HYOSCYAMI ET TARAXACI.

Extracta eorum aliarumque plantarum recentium eodem modo ac Fumariae succus parantur.

### SULFUR ANTIMONII PRAECIPITATUM

℥. *Sulfur auratum Antimonii* ℥. *Kermes mine-  
rale.*

℞ Lixivii Sodae crudae cum Calce libras quatuor,  
Aquae fontanae libras tres,  
Antimonii pulverati libras duas.

Ebulliant in vase apto ad ignem lenem per tres ho-  
ras, continua agitatione ope spatulae ferreae, ad-  
dita aquae maiore copia, si opus fuerit. Coletur  
liquor fervidus per pannum linteum duplicem;  
lique etiamnum calido sensim affundatur Acidi vi-  
trioli diluti, quantum sufficit ad complendam praeci-  
pitationem. Pulvis praecipitatus eluatur aqua  
calida iterum iterumque, donec saporem omnem  
amiserit, cribroque impositus siccetur et servetur.

### SYRUPUS ACETI VINI.

℞ Aceti vini boni libras duas,  
Sacchari depurati pulverati libras quatuor.  
Misceantur in vase vitreo ad lenissimum calorem.



## SYRUPUS ALLII.

℞ Bulborum Allii recentium concisorum libram unam,

Aquae fervidae libras duas.

Macerentur per horae spatium in vase clauso: colatis adde

Sacchari albi pulverati libras duas.

## SYRUPUS ALTHAEAE.

℞ Radicis Althaeae concisae et comminutae libram unam,

Aquae libras decem cum dimidia.

Ebulliat, donec dimidia pars supersit. Exprimendo coletur et quieti tradatur, ut faeces fundum pentant. Tum decantetur et addantur

Sacchari depurati librae quatuor.

Ebulliat, donec idoneam acquisiverit molem.

## SYRUPUS AMYGDALARUM.

℞ Amygdalarum dulcium decorticatarum libram unam,

— amararum drachmas duas.

Pinstantur in mortario lapideo ope pistilli lignei, donec massam constituent subtilem. Affundantur sensim

Decocti Hordei librae duae.

Coletur fortiter exprimendo: post admisceatur Sacchari depurati pulverati quantum sufficit ad Syrupi molem.

## SYRUPUS BALSAMI PERUVIANI

*f. Syrupus balsamicus.*

℞ Tincturae Balsami peruviani unciam unam,  
Syrupi communis tepidi libras duas.

Sensim misceantur: spiritus evaporetur in balneo Mariae.

## SYRUPUS COLCHICI.

℞ Aceti Colchici uncias sexdecim,  
Sacchari depurati uncias viginti sex.

Probe mixta ebulliant per aliquod tempus in vase fictili, massa vitrea haud obducto, ad idoneam molem.

## SYRUPUS COMMUNIS s. SIMPLEX.

Solvatur Sacchari depurati in aqua, quantum sufficit ad syrupi molem.

## SYRUPUS CORTICIS AURANTIORUM s. CITRORUM s. LIMONIORUM.

℞ Flavedinis Corticis v. g. Aurantiorum recentium  
libram dimidiam,

Aquae fervidae libras tres.

Digeratur in vase clauso per nychthemeron. Colato adde Sacchari depurati pulverati quantum poscitur ad idoneam molem.

## SYRUPUS DIACODII.

*v. Syrupus Papaveris.*

## SYRUPUS LIMONIORUM ACIDORUM.

℞ Succi Limoniorum acidorum depurati libras  
duas,

Sacchari depurati pulverati uncias quinquaginta.

Mixta fiant Syrupus.

### SYRUPUS MECONII.

v. *Syrupus Papaveris.*

### SYRUPUS PAPAVERIS

f. *Syrupus Diacodii* f. *Meconii.*

℞ Capsularum Papaveris cassarum libras duas,  
Aquae fervidae libras viginti quatuor.

Maceratae per duodecim horas ebulliant, donec tertia pars supersit. Dum fervent expressae colentur, iterum colentur, donec dimidia pars supersit: repetatur colatio denuo. Tum addantur

Sacchari depurati librae quatuor.

Mixta ebulliant ad idoneam molem.

### SYRUPUS RHABARBARI.

℞ Infusi Rhabarbari libram unam,

Sacchari depurati libras duas.

Misceantur.

### SYRUPUS SIMPLEX.

v. *Syrupus communis.*

### SYRUPUS SPINAE CERVINAE.

℞ Succı baccarum Spinae cervinae maturarum  
recens depurati libras quatuor,

Sacchari puri libras duas.

Coquatur ad idoneam molem.

## SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞ Zingiberis pulverati uncias quatuor,

Aquae fervidae libras quatuor.

Macerentur per sex horas. Colato adde Sacchari depurati quantum sufficit ad syrupum constituendum.

## TARTARUS ANTIMONIALIS.

## — EMETICUS.

v. *Antimonium tartarifatum.*

## TARTARUS MARTIALIS SOLUBILIS.

v. *Ferrum tartarifatum.*

## TARTARUS REGENERATUS.

v. *Alcali vegetabile cum aceto vini.*

## TARTARUS SOLUBILIS.

v. *Alcali vegetabile tartarifatum.*

## TARTARUS STIBIATUS.

v. *Antimonium tartarifatum.*

## TARTARUS VITRIOLATUS.

v. *Alcali vegetabile vitriolatum.*

## TERRA FOLIATA TARTARI.

v. *Alcali vegetabile cum aceto vini.*

## THERIACA.

v. *Electuarium opiatum.*



## TINCTURA ALOËS COMPOSITA

f. *Elixir proprietatis.*

- ℞ Tincturae Myrrhae libras duas,  
Croci,  
Aloës succotrinae, singulorum uncias tres.  
Macerata per octo dies colentur.

## TINCTURA AMARA.

v. *Tinctura Gentianae composita.*

## TINCTURA AROMATICA

f. *Tinctura Cinnamomi composita.*

- ℞ Pulveris aromatici sesquiunciam,  
Radiciſ Angelicae unciam dimidiam,  
Seminum Pimenti drachmas duas,  
Spiritus vini libras duas cum dimidia.  
Macerata per octo dies colentur.

## TINCTURA BALSAMI PERUVIANI.

- ℞ Balsami peruviani uncias quatuor,  
Alcoholis libram unam.  
Maceretur, donec balsamum sit solutum.

## TINCTURA BENZOËS COMPOSITA

f. *Balsamum catholicum, traumaticum et vulnerarium.*

- ℞ Benzoës uncias tres,  
Balsami peruviani uncias duas,  
Aloës succotrinae unciam dimidiam,  
Alcoholis libras duas cum dimidia.  
Macerata per octo dies colentur.



## TINCTURA CANTHARIDUM.

- ℞ Cantharidum pulveratarum drachmas tres,  
Spiritus vini libras duas.  
Macerata per tres dies colentur.

## TINCTURA CASTOREI.

- ℞ Castorei unciam unam,  
Spiritus vini uncias sexdecim.  
Macerata per octo dies colentur.

## TINCTURA CASTOREI COMPOSITA

f. *Tinctura foetida.*

- ℞ Castorei unciam unam,  
Asae foetidae unciam dimidiam,  
Alcali volatilis fluidi uncias tres,  
Alcoholis uncias novem.  
Macerata per sex dies colentur.

## TINCTURA CHINAE COMPOSITA

f. *Essentia antiseptica Huxhami.*

- ℞ Chinae rubrae pulveratae uncias duas,  
Corticis flavi et siccati Aurantiorum sesquiunciam,  
Radiciis Serpentinae Virginianae drachmas duas,  
Spiritus vini uncias viginti.  
Macerata per sex dies colentur.

## TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA.

v. *Tinctura amara.*

## TINCTURA COLOMBO.

- ℞ Radicis Colombo pulveratae uncias duas cum  
dimidia,

Spiritus vini libras duas cum dimidia.  
Macerata per octo dies colentur.

### TINCTURA FOETIDA.

v. *Tinctura Castorei composita.*

### TINCTURA GENTIANAE COMPOSITA

℞ *Tinctura amara* ℞ *Elixir stomachicum.*

℞ Radicis Gentianae pulveratae uncias duas,  
Pulveris aromatici unciam unam,  
Spiritus vini libras duas cum dimidia.  
Macerata per quatuor dies colentur.

### TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

v. *Tinctura Myrrhae composita.*

### TINCTURA GUAIIACI

℞ *Elixir guaiacinum.*

℞ Extracti Guaiaci libram unam,  
Alcoholis libras duas cum dimidia.  
Maceratum per octo dies coletur.

### TINCTURA GUAIIACI AMMONIACALIS

℞ *Elixir guaiacinum volatile.*

℞ Extracti Guaiaci uncias quatuor,  
Spiritus ammoniaci compositi libras duas.  
Maceratum per tres dies coletur.

### TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞ Radicis Hellebori nigri uncias quatuor,  
Spiritus vini libras duas cum dimidia.  
Macerata per octo dies coletur.

## TINCTURA IALAPPÆ.

℞ Radicis Ialappæ pulveratæ uncias quatuor,  
Spiritus vini libram unam.

Macerata per octo dies coletur.

## TINCTURA KINO.

℞ Kino pulverati uncias duas,  
Spiritus vini sesquilibram.

Maceratum per octo dies coletur.

## TINCTURA LACCÆ COMPOSITA.

℞ Laccæ pulveratæ unciam unam,  
Myrrhæ drachmas tres,  
Spiritus Cochleariæ libras duas.

Macerata per octo dies colentur.

## TINCTURA MYRRHÆ.

℞ Myrrhæ uncias tres,  
Spiritus vini libras duas.

Macerata per octo dies coletur.

## TINCTURA MYRRHÆ COMPOSITA

f. *Tinctura gingivalis balsamica.*

℞ Myrrhæ,  
Catechu, singulorum unciam unam,  
Tincturæ balsami peruviani drachmam unam,  
Spiritus Cochleariæ,  
Alcoholis, singulorum uncias quatuor.

Macerata per quatuor dies colentur.

## TINCTURA OPII

f. *Tinctura thebaica* f. *Laudanum liquidum*.

℞ Opii depurati drachmam unam,

Alcoholis libram unam,

Aquae destillatae libras duas.

Macerentur, ut opium solutum sit: post per chartam emporeticam coletur.

## TINCTURA OPII CAMFORATA

f. *Elixir pargoricum*.

℞ Opii depurati pulverati drachmam unam,

Camforae scrupulos duos,

Spiritus ammoniaci compositi uncias quatuor,

Alcoholis libram unam.

Macerata per quatuor dies in lagena clausa colentur.

## TINCTURA RHABARBARI.

℞ Rhabarbari uncias duas,

Semen Cardamomi minoris unciam dimidiam,

Spiritus vini libras duas cum dimidia.

Macerata per octo dies colentur.

## TINCTURA RHABARBARI COMPOSITA

s. AMARA.

℞ Tincturae Rhabarbari sesquilibram,

Tincturae Gentianae compositae semilibram.

Misceantur.

## TINCTURA SACRA.

v. *Vinum aloëticum*.



## TINCTURA SENNAE COMPOSITA

f. *Elixir Salutis.*

- ℞ Foliorum Sennae uncias duas,  
Radiciſ Jalappae unciam unam,  
Aniſi ſtellati drachmas duas,  
Spiritus vini libras tres cum dimidia.  
Macerentur per octo dies, tum colatis adde  
Sacchari depurati pulverati uncias quatuor.

## TINCTURA THEBAICA.

v. *Tinctura Opii.*

## TINCTURA VALERIANAE VOLATILIS.

- ℞ Radiciſ Valerianae ſylveſtris uncias quatuor,  
Spiritus ammoniaci compoſiti libras duas cum  
dimidia.  
Macerata per octo dies in lagena clauſa coletur.

## TROCHISCI ALBI RHAZIS.

v. *Pulvis Ceruſſae compoſitus.*

## TROCHISCI BECCHICI ALBI.

v. *Pulvis Tragacanthae compoſitus.*

## TROCHISCI BECCHICI NIGRI

f. *Trochiſci Glycyrrhizae.*

- ℞ Extracti Glycyrrhizae,  
Gummi arabici, ſingulorum uncias quatuor,  
Sacchari depurati pulverati uncias octo.  
Solvantur in aquae fervidae quantum ſufficit: co-  
lata evaporentur igne leni, donec maſſa apta ſit  
ad trochiſcos.



## TROCHISCI GLYCYRRHIZAE CUM OPIO.

℞ Opii depurati drachmas duas,

Tincturae Balsami peruviani unciam dimidiam.

Mixta terantur, donec Opium solutum sit. Post addantur

Syrupi communis unciae octo,

Extracti Glycyrrhizae aqua fervida molliti unciae quinque.

Curiose pergatur agitando, addantur paullatim

Gummi arabici pulverati unciae quinque.

Fiant trochisci ponderis granorum decem, siccantur.

## TROCHISCI MAGNESIAE.

℞ Magnesiae albae calcinatae uncias sex,

Sacchari depurati uncias tres,

Pichurim drachmam dimidiam.

Mixta pulverata formentur trochisci cum Tragacanthae quantum suffecerit.

## TROCHISCI MYRRHAE.

v. *Pulvis Myrrhae compositus.*

## TURBITH MINERALE.

v. *Calx Mercurii vitriolata.*

## TUTIA PRAEPARATA.

v. *Antimonium praeparatum.*

## UNGUENTUM AEGYPTIACUM.

v. *Unguentum aeruginis.*

## UNGUENTUM ALBUM.

v. *Unguentum Cerussae.*

## UNGUENTUM ALBUM CAMFORATUM.

v. *Unguentum Cerussae camforatum.*

## UNGUENTUM BASILICUM FLAVUM.

v. *Unguentum resinae flavae.*

## UNGUENTUM CANTHARIDUM.

℞ Cantharidum pulveratarum uncias duas,  
Aquaе uncias octo.

Macerata per duodecim horas exprimendo colentur. Ii liquori adde

Unguenti resinae flavae uncias octo.

Evaporentur continuo agitando, ut humor consumatur.

## UNGUENTUM CERAЕ.

v. *Ceratum Spermatidis Ceti.*

## UNGUENTUM CERUSSAE

f. *Unguentum album.*

℞ Cerussae,

Cerae albae, singularum uncias novem,

Olei libras tres.

Liquefiat cera in oleo ad ignem mitem. Remotis ab igne paullatim Cerussa addatur, continuo agitando, donec refrigescat.

## UNGUENTUM CERUSSAE CAMFORATUM.

Adiuncto ad quamvis unguenti Cerussae unciam scrupulo dimidio Camforae in olei guttulis aliquot solutae, paratur.

## UNGUENTUM ELEMI

*℥. Balsamum Arcae.*

- ℞ Resinae Elemi libram unam,  
Terebinthinae uncias decem,  
Sebi praeparati libras duas,  
Olei uncias duas.

Mixta liquefacta colentur, tum refrigescant.

## UNGUENTUM LAPIDIS CALAMINARIS.

*v. Ceratum.*

## UNGUENTUM MERCURIALE.

- ℞ Mercurii,  
Sebi praeparati, singulorum unciam unam,  
Axungiae porcinae sine sale uncias tres.  
Terantur in mortario lapideo ope pistilli lignei, donec globuli mercuriales evanuerint.

## UNGUENTUM MUNDIFICATIVUM.

*v. Unguentum rosatum compositum.*

## UNGUENTUM NERVINUM.

- ℞ Sebi praeparati uncias octo,  
Olei baccarum Lauri libram unam,  
— Terebinthinae sesquiunciam.  
Liquefacto sebo, ab igne remoto addantur olea et misceantur, donec refrigescant.

## UNGUENTUM RESINAE FLAVAE

*℥. Unguentum basilicum flavum.*

- ℞ Resinae flavae,  
Cerae flavae,  
Olei, singulorum libram unam.

Liquefacta ad ignem mitem colentur et refrigerant.

### UNGUENTUM ROSATUM.

℞ Axungiae porcinae praeparatae libras duas,  
Aquae rosarum uncias tres.

Triturentur in mortario lapideo, ut probe misceantur. Dein liquefiat mixtio ad ignem lenissimum, ut aqua secedat, fundo petito.

### UNGUENTUM ROSATUM COMPOSITUM

f. *Unguentum mundificativum.*

℞ Unguenti rosati unciam unam,  
Mercurii praecipitati albi drachmam unam,  
Olei Lavandulae scrupulum unum.

Misceantur.

### UNGUENTUM SATURNI,

v. *Ceratum Plumbi.*

### UNGUENTUM SPERMATIS CETI.

v. *Ceratum.*

### UNGUENTUM SULFURIS.

℞ Unguenti rosati libram dimidiam,  
Sulfuris subtiliter pulverati uncias quatuor,  
Misceantur.

### UNGUENTUM TUTIAE.

℞ Axungiae porcinae praeparatae uncias quatuor,  
Cerae albae drachmam unam,  
Tutiae praeparatae unciam unam,

Liquefactis cerae et axungiae ad ignem blandum, remotis inde addatur tutia, continuo agitando, donec refrigescat.

## VINUM ALOËTICUM

℞ *Tinctura sacra.*

℞ Aloës succotrinae pulveratae uncias quatuor,  
Cinnamomi optimi pulverati semilibram,  
Vini albi generosi libras quatuor,  
Spiritus vini uncias sexdecim.

Macerentur per dies decem, saepius succusso vase, dein colentur.

## VINUM AMARUM.

v. *Vinum Chinae compositum.*

## VINUM ANTIMONII

℞ *Essentia antimonialis Huxhami* ℞ *Vinum emeticum.*

℞ Antimonii vitrificati pulverati unciam unam,  
Vini albi generosi libras duas.

Macerata per dies duodecim colentur.

## VINUM CHALYBEATUM.

v. *Vinum Ferri.*

## VINUM CHINAE COMPOSITUM

℞ *Vinum amarum.*

℞ Chinae rubrae pulveratae uncias duas,  
Radicis Gentianae unciam unam,  
Flavedinis Corticis Aurantiorum sicci drachmas duas,



Vini albi generosi libras duas,  
Spiritus vini uncias quatuor.  
Macerata per octo dies colentur.

## VINUM DIGITALIS.

℞ Foliorum Digitalis siccatorum unciam unam,  
Vini albi generosi libras duas.  
Macerata per quatuor dies colentur.

## VINUM EMETICUM.

v. *Vinum Antimonii.*

## VINUM FERRI

f. *Vinum chalybeatum.*

℞ Ferri limati uncias duas,  
Vini albi generosi libras tres.  
Macerata per quindecim dies, saepe agitando, post  
colentur.

## VINUM IPECACUANHAE.

℞ Radicis Ipecacuanhae uncias duas,  
Vini albi generosi libras duas cum dimidia.  
Macerata per sex dies colentur.

## VINUM NICOTIANAE.

℞ Foliorum Nicotianae siccatorum unciam unam,  
Vini albi generosi libram unam.  
Macerata per quatuor dies colentur.

## VINUM RHABARBARI.

℞ Rhabarbari uncias duas,  
Cinnamomi electi drachmam unam,  
Vini albi generosi sesquilibram.  
Macerata per octo dies colentur.

## VINUM SCILLITICUM

eodem modo paratur ac Vinum Digitalis.

## VITRIOLUM CAMFORATUM

ſ. *Lapis divinus* ſ. *ophthalmicus*.

℞ Vitrioli Cupri,

Nitri,

Aluminis crudi, ſingulorum uncias quatuor,

Camforae pulveratae drachmam unam.

Fundantur ſales pulverati in vaſe fictili, maſſa vitrea haud obducto: fuſis adde camforam: pandatur maſſa uniformis ſuper lapidem frigidum, ut refrigerſcat: ſic ſervetur.

## VITRIOLUM FERRI.

v. *Ferrum vitriolatum*.

## VITRUM ANTIMONII.

v. *Antimónium vitrificatum*.

---

---

**HALAE**  
**FORMIS FRIDERICI GRUNERTI.**

---

